

Risultati SSI – spiegazioni sulle finestre pop-up

Questo paragrafo descrive brevemente i diversi valori che appaiono nelle finestre pop-up. Le informazioni possono variare secondo il tipo di intervento. Le lettere a-i (vedi legenda in basso) corrispondono a un determinato parametro. Gli esempi nella tabella sono fittizi.

a) Tasso di infezione aggiustato	x% (95% IC) [3.5% (0.3 – 2.9)]		
b) Tasso di infezione grezzo	n / N, x% (95% IC) [4/200, 2%, (0.1 – 2.1)]		
c) Tipo di infezione	Superficiale: n, x% [1, 0.5%]	Profonda: n, x% [2, 1%]	Organo/cavità: n, x% [1, 0.5%]
d) Categoria NNIS	0: n, x% [1/180, 0.5%, (0 – 1.1)]	1: n, x% [2/10, 20%, (0.3 – 35.8)]	2: n, x% [1/10, 10%, (0 – 1.1)] 3: n, x% [0/0, 0%, (0 – 0)]
e) Classe di contaminazione	II: n, x% [2, 2.8%]	III: n, x% [1, 3.3%]	IV: n, x% [1, 10%]
f) Tecnica chirurgica	Laparoscopia o minimamente invasiva: n, x% [1, 5%]		Laparotomia: n, x% [3, 15%]
g) Tasso di prof. AB ≤ 1 ora prima OP (classe di contam. II)	x% [78%]		
h) Tasso di follow-up conclusi	x% [95%]		
i) Valutazione qualità del rilevamento	Numero di validazioni x	Prima validazione: Data x/50, x̄ [34/50, 38.9]	Ultima validazione: Data x/50, x̄ [36/50, 39.2]

- a) Tasso di infezione aggiustato secondo l'indice NNIS e intervallo di confidenza del 95%
- b) Tasso di infezione grezzo: n = numero di infezioni, N = numero di interventi, infezioni in percentuale, intervallo di confidenza del 95%
- c) Tasso di infezione grezzo per tipo di infezione: superficiali, profonde e organo/cavità: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo. Dal 1° ottobre 2021, nella chirurgia ortopedica (ginocchio e anca) vengono rilevate solo le infezioni nell'organo/nella cavità (infezioni associate alle protesi).
- d) Tasso di infezione grezzo categorie NNIS 0-3: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo
- e) Tasso di infezione grezzo con classe di contaminazione II, III o IV: n = numero di infezioni, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo. Questo valore viene pubblicato per l'appendicectomia, la colecistectomia e la chirurgia del colon.
- f) Tasso di infezione grezzo secondo la tecnica chirurgica: n = numero di infezioni dopo laparoscopia o laparotomia, infezioni in percentuale in relazione al tasso di infezione grezzo
- g) Tasso percentuale di profilassi antibiotiche somministrate tempestivamente (entro un'ora dall'incisione) per la rispettiva classe di contaminazione (I-IV), eccezione: intervento di ernia e colecistectomia
- h) Tasso di follow-up conclusi,
- i) Numero e risultato della validazione in loco della qualità della rilevazione per il primo e l'ultimo serie di validazione con la relativa data (viene svolta separatamente dal periodo di misurazione): x = punteggio ottenuto dall'ospedale, da 0 (scarso) a 50 (eccellente); $\bar{x}$ = mediana in Svizzera