
Rapporto comparativo nazionale Psichiatria ospedaliera per adulti

Misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti
Indicatori "peso dei sintomi" e "misure restrittive della libertà"

Periodo di rilevamento (dimissione): 1° gennaio – 31 dicembre 2014

01 dicembre 2015 / versione 1.1

Reparto valutazione della Clinica psichiatrica universitaria di Basilea UPK
E-mail: ANQ-Benchmark@upkbs.ch

UPK **Universitäre
Psychiatrische Kliniken**
Basel

Impressum

Titolo	Rapporto comparativo nazionale: psichiatria ospedaliera adulti - misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti (indicatori "peso dei sintomi" e "misure restrittive della libertà")
Anno	01 dicembre 2015 (v 1.1)
Autori	Dott. Bernhard Bührlen, responsabile progetto, Clinica psichiatrica universitaria di Basilea UPK Simone McKernan, MSc, UPK Basilea Katerina Laxdal, UPK Basilea
Collaborazione	Comitato dell'ANQ per la qualità Psichiatria: dr. med. Hélène Beutler, Direttore medico presso i servizi psichiatrici universitari di Berna, in rappresentanza della SGKJPP prof. dr. med. Achim Haug, Gruppo Clenia e Università di Zurigo, in rappresentanza dell'ASMP Peter Hösly, Direttore Sanatorium Kilchberg, in rappresentanza dell'ASDCP prof. dr. med. Yasser Khazaal, Direttore medico HUG, in rappresentanza della plateforme romande dr. med. Nathalie Koch, CHUV e in rappresentanza della plateforme romande dr. med. René Kühne, Helsana dr. med. Thomas Meier, Primario St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, St. Pirmin-sberg, Pfäfers, membro di Comitato dell'ANQ e dell'ASMP Aline Schuwey, Direttrice cure Hôpital du Valais, in rappresentanza di SMHC e KPP Marita Verbalì, Responsabile settore Psichiatria, Direzione della sanità Zurigo
Committente rappresentato da	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ, dott.ssa Johanna Friedli, responsabile Psichiatria
Copyright	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ Segretariato Thunstrasse 17, Casella postale 370 3000 Berna 6 Clinica psichiatrica universitaria UPK Qualität und Prozesse/Evaluation Wilhelm Klein-Strasse 27 4012 Basilea

Indice

Impressum.....	2
Indice.....	3
1 Riassunto.....	4
1.1 Obiettivo e scopo	4
1.2 Risultati	4
1.3 Commento.....	5
2 Introduzione	6
3 Confronti tra cliniche sulla qualità dei risultati.....	7
3.1 Peso dei sintomi.....	7
3.2 Misure restrittive della libertà.....	12
3.3 Confronti annuali della qualità dei risultati.....	16
4 Qualità dei dati.....	21
4.1 HoNOS	21
4.2 BSCL.....	21
4.3 Misure restrittive della libertà.....	21
4.4 Confronti annuali della qualità dei dati	25
5 Descrizione prova a campione e <i>case-mix</i>.....	28
5.1 Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento	29
5.2 Età all'ammissione.....	30
5.3 Sesso	30
5.4 Diagnosi principale.....	30
5.5 Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL).....	31
5.6 Ricovero a scopo di assistenza	32
5.7 Nazionalità.....	32
5.8 Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa	33
5.9 Stato civile	33
5.10 Occupazione prima dell'ammissione	34
5.11 Luogo di soggiorno prima dell'ammissione	34
5.12 Classe.....	35
5.13 Istanza ricoverante	35
5.14 Durata della degenza.....	36
5.15 Degenze di breve durata.....	37
5.16 Casi esclusi (HoNOS).....	37
5.17 Casi esclusi (BSCL)	37
5.18 Casi esclusi (misure restrittive della libertà)	38
6 Metodi.....	39
6.1 Procedura.....	39
6.2 Analisi variabili confondenti	40
6.3 Aggiustamento secondo il rischio per i confronti tra cliniche.....	41
6.4 Significatività delle differenze tra valore della clinica e valore normale.....	42
Annesso.....	43
A1. Informazioni generali in riguardo alla fornitura dati.....	44
A2. Risultato delle misure	110
A3. Qualità dati.....	128
A4. Ausilli alla lettura	137
A5. Glossario.....	142
A6. Bibliografia	145

1 Riassunto

1.1 Obiettivo e scopo

L'ANQ si occupa di misurazioni della qualità nel settore stazionario di cliniche e ospedali svizzeri. Nel quadro del contratto nazionale di qualità, gli ospedali e le cliniche aderenti sono tenuti a partecipare a tali misurazioni.

Le cliniche psichiatriche rilevano dal 1° luglio 2012 dati sulla qualità indicati dall'ANQ, oltre a quelli sociodemografici (dati di base e dati supplementari psichiatria) definiti dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'annuale rapporto comparativo nazionale consente a pazienti, enti finanziatori, fornitori di prestazioni e opinione pubblica di operare un confronto tra cliniche sulla scorta dei risultati seguenti:

- peso dei sintomi e relativo cambiamento durante la degenza, dal punto di vista del personale di cura (HoNOS¹) e del paziente (BSCL²);
- frequenza delle misure restrittive della libertà (EFM/MRL³);
- soddisfazione dei pazienti: al momento, viene ancora rilevata dalle cliniche con strumenti individuali. L'ANQ ha avviato un progetto pilota per valutare un questionario nazionale breve che possa essere utilizzato in modo complementare e che consenta di effettuare confronti.

Sulla base di questo rapporto, per la prima volta vengono pubblicati separatamente e in modo trasparente risultati nazionali sul peso dei sintomi. È stata così raggiunta una tappa decisiva, in quanto ora per questo indicatore sono soddisfatte le direttive della Legge sull'assicurazione malattie (LAMal), la quale costituisce il fondamento per le misurazioni nazionali dell'ANQ, le analisi comparative e la pubblicazione trasparente dei risultati.

Il rapporto è stato redatto secondo la versione rielaborata del concetto di analisi,⁴ che per quanto possibile considera i riscontri della consultazione svoltasi nel 2014 tra i partner dell'ANQ.

Le cliniche ricevono a scadenza semestrale un riscontro sulla qualità dei dati rilevati, il quale contiene informazioni sulla completezza dei set di dati parziali e sull'analizzabilità in vista di confronti tra cliniche, nonché indicazioni sulle possibilità di miglioramento.

1.2 Risultati

1.2.1 Qualità dei dati migliorata

Nel 2014, 64 cliniche su 65 hanno rilevato dati nella psichiatria ospedaliera per adulti. L'analisi comprendeva il periodo dall'inizio della misurazione (1° luglio 2012) alla dimissione (1° gennaio – 31 dicembre 2014). Rispetto al 2012 e al 2013, si riscontra un ulteriore miglioramento della qualità dei dati: l'85% delle cliniche (55 su 65) ha raggiunto il tasso fissato dall'ANQ (80%) per i dati analizzabili, rispettivamente i *drop-out* legittimi con l'HoNOS, e il 95% delle cliniche ha raggiunto il tasso fissato dall'ANQ (40%) per i dati analizzabili, rispettivamente i *drop-out* legittimi con la BSCL. In media, il 97% delle misure restrittive della libertà è stato rilevato correttamente.

¹ Strumento di misurazione HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales), vedi http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20140128_HoNOS-konzentrierter-Ratingbogen_IT.pdf

² BSCL (Brief Symptom Checklist), vedi http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/120611_Info-Instrument_BSCL_IT_v2.pdf

³ EFM (strumento di rilevamento misure restrittive della libertà), vedi http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20141120_Instrument-EFM_IT_v3.pdf

⁴ Vedi http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20150228_Auswertungskonzept_EP_IT_Version_4.0_final_def.pdf

1.2.2 Confronti equi possibili

Affinché sia possibile procedere a confronti trasparenti ed equi tra le cliniche, i risultati vengono “ripuliti” prima della pubblicazione. Il cosiddetto aggiustamento secondo il rischio considera l’influenza di fattori fissi sui quali le cliniche non possono intervenire, come la composizione del collettivo di pazienti in cura (*case-mix*). Dai risultati aggiustati secondo il rischio si evince quanto segue:

- il valore differenziale HoNOS (la portata del cambiamento del peso dei sintomi dal punto di vista del personale di cura) di oltre un terzo delle cliniche (26) diverge in modo statisticamente significativo verso l’alto rispetto al valore medio di tutte le cliniche;
- dal punto di vista dei pazienti, un quinto delle cliniche (14) ha ottenuto un risultato (valore differenziale BSCL) che diverge in modo statisticamente significativo verso l’alto rispetto al valore medio complessivo;
- poco più della metà delle cliniche (20) presenta un tasso notevolmente inferiore di pazienti con almeno una misura restrittiva della libertà rispetto alla media di tutte le cliniche che hanno adottato tali misure.

Il metodo dell’aggiustamento secondo il rischio è complesso e, di conseguenza, pur essendo comunemente utilizzato per ottenere confronti quanto più possibile equi, è sovente criticato. Per questo motivo, l’ANQ ha incaricato un gruppo di esperti di condurre una discussione sul metodo in collaborazione con l’istituto di analisi allo scopo di perfezionare la procedura e di renderla più accettabile ai partner dell’ANQ grazie a risultati meglio comprensibili.

Non è ancora stato possibile attuare un’analisi dei risultati secondo le variabili di struttura così come auspicato da molte cliniche. L’ANQ ha creato anche in questo caso un gruppo di esperti chiamato ad approfondire opportunità e limiti di variabili di struttura riconosciute a livello svizzero.

1.3 Commento

Per quanto riguarda il peso dei sintomi, si constata che la media dei risultati è cresciuta di nuovo (vedi capitolo 3.3.4 Valori medi complessivi non aggiustati di tutte le cliniche). Trattandosi del terzo anno di misurazioni, è lecito supporre che si tratti di una tendenza positiva. Sia dal punto di vista del personale di cura, sia da quello dei pazienti, le cure psichiatriche sono dunque riuscite a ridurre sempre più il peso dei sintomi nel corso della degenza. Ciò dimostra che è stato avviato un processo positivo, al quale le misurazioni della qualità dell’ANQ forniscono impulsi importanti e preziosi. Una squadra di esperti sta rielaborando le formazioni sull’*inter-rater reliability* dello strumento HoNOS. Dal secondo semestre 2015, verranno offerti corsi differenziati per valutatori esperti e alle prime armi, il che garantirà anche in futuro un rilevamento unitario.

I dati sulle misure restrittive della libertà abbracciano invece due anni di rilevamento. Come ci si attendeva, il tasso di casi rilevati è aumentato, grazie anche alle formazioni e, in parte, al coinvolgimento di un giurista e allo svolgimento di una perizia del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti. Il rilevamento con lo strumento EFM/MRL è stato così consolidato in seno alle cliniche. I riscontri e i processi di formazione permetteranno verosimilmente di rafforzare questa tendenza. Un gruppo di esperti si occupa da metà 2015 del controllo del rilevamento delle misure restrittive della libertà. Vi sono rappresentate anche la sottocommissione dell’ASSM per le misure coercitive nella medicina e la Società svizzera di psichiatria e di psicoterapia degli anziani (SPPA).

Importante: un’interpretazione delle cifre concernenti le misure restrittive della libertà è ammessa solo nel contesto dei concetti delle cliniche. Un basso numero di misure non significa infatti automaticamente una qualità migliore. Alcune cliniche adottano più spesso brevi misure restrittive della libertà, altre puntano su meno misure, ma attuate più a lungo. L’importante è che queste misure siano ponderate, motivate e documentate, e che rispettino le direttive della protezione dei minori e degli adulti.

2 Introduzione

Le cliniche psichiatriche in Svizzera che hanno aderito al contratto nazionale di qualità rilevano dal 1° luglio 2012 i dati sulla qualità prescritti dall'ANQ. Il rilevamento è effettuato con gli strumenti, nei momenti e secondo le procedure indicati dall'ANQ.

Indicatore	Autovalutazione da parte dei pazienti	Valutazione della persona curante
Statistica medica		
Rilevamento durante la degenza, registrazione al massimo entro due mesi dopo la dimissione		- Set dati di base UST - Dati supplementari psichiatria UST
Peso dei sintomi		
Viene rilevata la differenza tra l'ammissione e la dimissione per ogni paziente	- BSCL (forma abbreviata del questionario SCL-90)	- HoNOS
Misure restrittive della libertà		
Vengono rilevate tutte le misure restrittive della libertà		- EFM/MRL

Il 28 febbraio 2015, l'ANQ ha pubblicato il concetto di analisi attualmente in vigore. Tale documento definisce le analisi e i rapporti sui risultati, segnatamente l'annuale rapporto comparativo nazionale concernente le misurazioni dell'anno precedente. Il suo scopo principale è quello di fornire a pazienti, enti finanziatori, fornitori di prestazioni e opinione pubblica le basi per una valutazione comparativa del peso dei sintomi rilevato con l'HoNOS e la BSCL, e delle misure restrittive della libertà.

Il rapporto comparativo nazionale riguardante il 2014 fornisce ragguagli sui risultati delle misurazioni nazionali della qualità dell'ANQ nella psichiatria ospedaliera per adulti e comprende le analisi dei dati di tutti i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. Alle misurazioni 2014 hanno preso parte 65 cliniche, 64 delle quali hanno fornito dati.

Le analisi comparative sul peso dei sintomi e il suo cambiamento nel corso della degenza sono integrate nell'attuale rapporto e presentate dal punto di vista del personale di cura (HoNOS) e dei pazienti (BSCL). Il documento comprende altresì i risultati delle misure restrittive della libertà rilevate con lo strumento EFM/MRL, come pure confronti con gli anni precedenti e conclusioni sulla qualità dei dati rilevati. Nella parte principale, i risultati centrali sono raffigurati prevalentemente con l'ausilio di diagrammi. L'annesso riporta i valori esatti e ausili per la lettura dei diagrammi, nonché analisi più approfondite, pure in forma grafica.

I nomi delle cliniche sono sostituiti da numeri. Per una questione di protezione dei dati, per i risultati dell'HoNOS e della BSCL vengono utilizzati numeri a tre cifre, per quelli concernenti le misure restrittive della libertà a due cifre. Le cliniche sono ovviamente a conoscenza del numero che le rappresenta. I risultati principali vengono comunicati in forma elettronica e trasparente, come previsto dal concetto di pubblicazione.

3 Confronti tra cliniche sulla qualità dei risultati

Di seguito, sono presentati i risultati essenziali, aggiustati per le principali variabili confondenti con la procedura descritta al [punto 6.3](#). Sono stati analizzati i risultati della misurazione per quanto riguarda la differenza del peso dei sintomi (HoNOS e BSCL) e le misure restrittive della libertà.

Un risultato terapeutico centrale è il cambiamento del peso dei sintomi tra ammissione e dimissione. Il peso dei sintomi viene rilevato con la valutazione da parte di terzi (responsabile del caso) nel questionario HoNOS e con l'autovalutazione da parte del paziente nel questionario BSCL. L'indicatore del risultato della cura è la differenza tra la misurazione al momento dell'ammissione e quella al momento della dimissione. I risultati della misurazione vengono ripuliti dall'influsso delle variabili di disturbo.

Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, le cliniche vengono confrontate tra loro in base al tasso di pazienti per i quali sono stati adottati uno o più di questi provvedimenti considerando le stesse caratteristiche del paziente come variabili confondenti.

Ogni clinica è rappresentata dal suo valore medio con l'intervallo di confidenza (IC)⁵ del 95%. Il riferimento è sempre costituito dai valori residui dell'intero campione con intervallo di confidenza. Una rapida consultazione permette di scoprire se una determinata clinica si trova nella media (la sua barra di errore interseca il riferimento complessivo), al di sotto o al di sopra della media (la barra di errore è completamente sotto o sopra il riferimento complessivo). In più, vengono riferiti i risultati di test di significatività statistica della differenza tra il valore della clinica e il valore dell'intero campione (cfr. diagramma a barre di errore negli [ausili alla lettura](#)). Il risultato dei test di significatività non deve sempre coincidere con la valutazione degli intervalli di confidenza.

3.1 Peso dei sintomi

Per entrambe le dimensioni del peso dei sintomi, i valori positivi rivelano una differenza maggiore del peso dei sintomi rispetto alle altre cliniche, quelli negativi un risultato al di sotto delle attese. Un punto dato grigio scuro indica inoltre un risultato della misurazione significativamente superiore alla media in base al livello di significatività definito, un punto dato grigio chiaro un risultato della misurazione significativamente inferiore alla media. Un punto dato grigio indica che il risultato della misurazione della clinica non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media. Le cliniche con meno di trenta casi analizzabili⁶ sono contrassegnate con un * e rappresentate con un punto dato bianco senza significatività e intervalli di confidenza, poiché nei campioni di piccole dimensioni la rappresentatività dei dati non è garantita. I valori delle cliniche appaiono in ordine crescente secondo il tasso di risposta. Il valore nominale viene indicato come linea verticale nel diagramma. Il settore per i valori il cui tasso di risposta è insufficiente è blu.

3.1.1 Valutazione da parte di terzi del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS

La figura seguente rappresenta il risultato medio aggiustato del peso dei sintomi dal punto di vista del personale curante (differenza tra il punteggio complessivo HoNOS all'ammissione e alla dimissione).

Una clinica (numero 312) non ha fornito dati. Per le cliniche con meno di trenta casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza e le significatività, dato che con prove a campione così piccole la rappresentatività dei dati non è garantita. È il caso delle cliniche 271 e 339 (cfr. annesso A2,

⁵ Un intervallo di confidenza 95% è una stima statistica e descrive l'intervallo in cui il valore effettivo si pone con una probabilità del errore di 5%. Le misure sono sempre influenzate da accidentalità come p.es. quali pazienti che sono presenti durante la raccolta dei dati, variazioni stagionali, errori di misura. Pertanto, i valori misurati indicano il valore reale di solo approssimativamente. Il valore reale si pone con una probabilità del errore di 5% nell'intervallo di confidenza 95%.

⁶ Conformemente ai risultati della consultazione, aumento della quantità minima di casi analizzabili da venti a trenta.

[tabella valutazione da parte di terzi del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS](#)). Le relative cifre sono riportate nel grafico seguente contrassegnate da un *.

Le ventisei cliniche seguenti hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era superiore alla media dell'intero gruppo): 104, 106, 123, 124, 129, 131, 143, 152, 161, 171[#], 172[#], 181, 191, 212, 221, 242, 261[#], 291, 292, 294, 301[#], 303[#], 305[#], 322, 331, 334.

Le sedici cliniche seguenti hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era inferiore alla media dell'intero gruppo): 102, 105, 121[#], 122, 125, 151, 192, 211, 241, 281, 311, 321, 333, 335, 337, 338.

Le altre venti cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale HoNOS, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

Le cliniche contrassegnate da un [#] non hanno raggiunto il tasso di risposta atteso dell'80% di casi analizzabili (inclusi i *drop-out* non influenzabili). La rappresentatività dei loro risultati è dunque limitata.

3.1.2 Autovalutazione del peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

La figura seguente rappresenta il risultato medio aggiustato del peso dei sintomi dal punto di vista del paziente (differenza tra il punteggio complessivo BSCL all'ammissione e alla dimissione).

Una clinica (numero 312) non ha fornito dati. Per le cliniche con meno di trenta casi analizzabili non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza e le significatività, dato che con prove a campione così piccole la rappresentatività dei dati non è garantita. È il caso delle cliniche 106, 271, 304 e 339 (cfr. annesso A2, [tabella autovalutazione del peso dei sintomi, valore differenziale BSCL](#)). Le relative cifre sono riportate nel grafico seguente contrassegnate da un *.


Le quattordici cliniche seguenti hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era superiore alla media dell'intero gruppo): 125, 127, 131, 141, 142, 161, 191, 211, 221, 242, 261, 301[#], 303, 322.

Le undici cliniche seguenti hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era inferiore alla media dell'intero gruppo): 102, 105, 133, 151, 281, 282, 293, 331, 332, 333, 336.


Le altre trentacinque cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale HoNOSCA-SR, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

Le cliniche contrassegnate da un [#] non hanno raggiunto il tasso di risposta atteso del 40% di casi analizzabili (inclusi i *drop-out* non influenzabili). La rappresentatività dei loro risultati è dunque limitata.

Risultato della misurazione - peso dei sintomi: differenza valore HoNOS



Risultato della misurazione - peso dei sintomi: valore di differenza BSCL



3.1.3 Panoramica dei risultati concernenti il peso dei sintomi

La figura seguente offre una rapida panoramica degli indicatori di base aggregati nel rapporto comparativo nazionale (con aggiustamento, in base al livello di significatività).

- Valutazione da parte di terzi: valore differenziale HoNOS
- Autovalutazione: valore differenziale BSCL

La posizione di una clinica rispetto all'intero campione è segnalata secondo un codice cromatico: per le due dimensioni del peso dei sintomi, un campo grigio scuro indica un risultato della misurazione significativamente superiore alla media in base al livello di significatività definito, un campo grigio chiaro un risultato della misurazione significativamente inferiore alla media. Un campo grigio indica che il risultato della misurazione della clinica non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media. Le cliniche con meno di trenta casi analizzabili sono contrassegnate da un * e rappresentate con un campo bianco (senza significatività). Le cliniche con tasso di risposta inferiore al valore nominale sono contrassegnate da un # e da una cornice blu.

Tabella con tutti i livelli di significatività dei valori medi complessivi aggiustati di tutte le cliniche per HoNOS e BSCL

Clinica	HoNOS	BSCL
	Valore differenziale	Valore differenziale
101		
102		
103		
104		
105		
106		*#
111		
121	#	
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
131		
132		
133		
134		
141		
142	#	
143		
151		
152		
161		

Clinica	HoNOS	BSCL
	Valore differenziale	Valore differenziale
171	#	#
172	#	
181		
191		
192		
211		
212		
221		
231	#	
241		
242		
251		
261	#	
271	*	*
281		
282		
283		
291		
292		
293		
294		
301	#	#
302	#	
303	#	
304		*
305	#	

Clinica	HoNOS	BSCL
	Valore differenziale	Valore differenziale
311		
312		
321		
322		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339	*	*

Leggenda	
Divergenza significativa verso l'alto (per le MRL verso il basso)	
Nessuna divergenza significativa	
* < 30 casi validi => significatività non calcolata	
Divergenza significativa verso il basso (per le MRL verso l'alto)	
# Tasso di risposta inferiore al 80% (HoNOS) rispettivamente 40% (BSCL)	
Nessun dato fornito	

3.2 Misure restrittive della libertà


Per le misure restrittive della libertà, un punto dato grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva, mentre un punto dato grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente superiore alla media complessiva. Un punto grigio indica che la quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media.

27 cliniche hanno comunicato che nel periodo di rilevamento 2014 non sono state adottate misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ). Due cliniche (la numero 26 e la numero 66) non hanno fornito dati. 36 cliniche hanno adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento 2014. Le analisi sulle misure restrittive della libertà includono solo le cliniche che hanno annunciato almeno un caso e i valori medi sono stati calcolati solo considerando questi casi.

Vengono valutati anche i casi per i quali si dispone di una documentazione lacunosa. Le venti cliniche seguenti presentano valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la probabilità aggiustata per il *case-mix* di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era inferiore alla media dell'intero gruppo): 08, 12, 13, 17, 18, 22, 27, 32, 35, 39, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 58, 59, 63.

Le otto cliniche seguenti presentano valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la probabilità aggiustata per il *case-mix* di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era superiore alla media dell'intero gruppo): 03, 07, 24, 28, 34, 37, 48, 54.

Un valore basso non equivale necessariamente a un risultato favorevole, dato che in caso di elevato pericolo per sé stessi o per altre persone l'adozione di misure restrittive della libertà è considerata imprescindibile. Occorre inoltre considerare che le cliniche presentano circostanze differenti (p.es. obbligo di ammissione dei pazienti), un altro aspetto che può influenzare la quota di misure restrittive della libertà.



Le cliniche seguenti non hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà:

26, 66

Le cliniche seguenti hanno comunicato di non aver adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ):

01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 29, 31, 38, 45, 47, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 65, 67

3.2.1 Panoramica dei risultati concernenti le misure restrittive della libertà

La figura della pagina seguente offre una rapida panoramica dei quattro tipi di misura restrittiva della libertà e dell'indicatore di base "Quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà" (con aggiustamento, in base al livello di significatività):

- quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (FM);
- isolamento (intensità (frequenza*durata)/caso);
- immobilizzazione (intensità (frequenza*durata)/caso);
- medicazione forzata (orale e iniezione, frequenza/caso);
- misura di sicurezza (in sedia e a letto, frequenza/caso).

Per le misure restrittive della libertà, un campo grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva delle cliniche che hanno registrato almeno una misura restrittiva della libertà, mentre un campo grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente superiore alla media. Un campo grigio indica che la quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media complessiva.

3.2.2 Rapporto tra il numero di misure restrittive della libertà e il numero di ricoveri a scopo di assistenza nel rispettivo anno di misurazione

Nell'intero gruppo, il rapporto tra i ricoveri a scopo di assistenza e l'attuazione di una o più misure restrittive della libertà è pari a $\phi = 0,261^7$ (significatività $<0,001$ su ambo i fronti).

⁷ Il coefficiente di correlazione phi abbraccia un settore che va da -1 (rapporto perfettamente negativo: più ricoveri, meno misure, risp. più misure, meno ricoveri) a 0 (nessun rapporto), a +1 (rapporto perfettamente positivo: più ricoveri, più misure, risp. più misure, più ricoveri).

Tabella con tutti i livelli di significatività dei valori medi complessivi aggiustati delle cliniche in questione per le misure restrittive della libertà

Cli- nica	MRL	Isolamento	Immo- bilizzazione	Medicazione forzata	Restrizione movimento
	Quota di casi affetti	intensità/ caso	intensità/ caso	frequenza/ caso	frequenza/ caso
03					
06				*	*
07			*	*	*
08			*		*
12		*		*	
13				*	
17			*		*
18				*	
21			*		
22				*	
24			*		
26					
27				*	
28			*		
30			*		*
32				*	*
33			*	*	
34					*
35					
36			*	*	*
37			*	*	*
39			*		
40				*	
42			*		*
43			*		
44		*			*
46			*		*
48					*
49					
50		*	*	*	
51			*	*	*
52			*		*
54			*		
56			*		*
58			*		
59		*		*	
63		*		*	
66					

Leggenda	
	MRL divergenza significativa verso il basso (HoNOS/BSCL verso l'alto)
	Nessuna divergenza significativa
	* < 30 casi validi => significatività non calcolata
	MRL divergenza significativa verso l'alto (HoNOS/BSCL verso il basso)
	Nessun caso secondo quanto comunicato dalla clinica
	Nessun dato fornito


3.3 Confronti annuali della qualità dei risultati

L'evoluzione dei risultati della misurazione rispetto al periodo di rilevamento precedente è rappresentata analogamente al confronto tra cliniche ricorrendo ai valori aggiustati. I valori aggiustati sono sempre standardizzati in base a un valore medio complessivo pari a 0, il che rende però invisibili i possibili cambiamenti nell'intero campione.


L'analisi comparativa trasversale annuale consente di verificare, nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità, se le misure adottate hanno dato i frutti sperati l'anno successivo.

Nelle figure seguenti, sono rappresentati i valori medi aggiustati delle singole cliniche per il 2013 e il 2014. Il genere di rappresentazione basata su un valore medio comune comporta il miglioramento, rispettivamente il peggioramento di alcune cliniche rispetto ad altre. Un calo relativo del valore di una clinica rispetto alle altre non significa quindi necessariamente che la qualità delle cure sia peggiorata, bensì semplicemente che altre cliniche hanno ottenuto miglioramenti più marcati. Per valutare l'evoluzione di ogni singola clinica sono più adeguati i valori non aggiustati riportati nei rapporti specifici.


3.3.1 Peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS



3.3.2 Peso dei sintomi: valore differenziale BSCL



3.3.3 Misure restrittive della libertà: quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà



3.3.4 Valori medi complessivi non aggiustati di tutte le cliniche

La tabella seguente con i risultati non aggiustati mostra che il risultato medio della misurazione con l'HoNOS è passato da 6.36 punti (differenza tra l'HoNOS al momento dell'ammissione e al momento della dimissione con un cambiamento massimo di ± 48 punti) nel 2012 (solo secondo semestre) a 6.43 punti nel 2013 e a 7.30 punti nel 2014. Nell'autovalutazione da parte dei pazienti, invece, il risultato medio nell'intero campione è passato da 29.78 a 30.82 punti, e poi a 31.18 punti (differenza tra la BSCL al momento dell'ammissione e al momento della dimissione con un cambiamento massimo di ± 212 punti).

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL

Periodo di rilevamento	Totale	HoNOS ammissione	BSCL ammissione	valore di differenza HoNOS			valore di differenza BSCL		
	Numero	Valore medio	Valore medio	Validi	Valore medio	Deviazione standard	Validi	Valore medio	Deviazione standard
2012 (2° sem.)	24460	17.23	65.64	13804	6.36	7.33	5607	29.78	35.62
2013	64648	17.00	66.59	42241	6.43	7.01	18347	30.82	34.75
2014	67214	17.39	67.43	44111	7.30	7.02	19610	31.18	34.04

Nel 2014, il 6.9% dei pazienti è stato interessato da una o più misure restrittive della libertà (2013: 6.8%).

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà

Periodo di rilevamento	Quota di casi affetti					
	Totale		Casi senza MRL		Casi con almeno una MRL	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
2013	64648	100.00%	60253	93.2%	4395	6.8%
2014	67214	100.00%	62571	93.1%	4643	6.9%

4 Qualità dei dati

La completezza e la qualità dei dati fondamentali sono importanti per la rappresentatività dei risultati. Per questo, nei diagrammi seguenti viene rappresentata la quota dei casi complessivamente utili per il confronto tra cliniche. Si fa distinzione tra casi analizzabili (barre verdi), *drop-out* documentati correttamente e non influenzabili (p.es. a causa di una dimissione dopo meno di sette giorni dall'ammissione; barre gialle), *drop-out* documentati e influenzabili (barre grigio chiaro), dati lacunosi, ossia disponibili ma non analizzabili (barre grigio scuro) e set di dati mancanti del tutto e senza spiegazione (barre nere). Queste ultime tre categorie sono particolarmente sfavorevoli, mentre i *drop-out* non influenzabili non tangono la buona qualità dei dati.

La valutazione della qualità dei set di dati avviene separatamente per le singole analisi. Un set di dati, per esempio, può essere analizzabile per i confronti tra cliniche sulla base dell'HoNOS, ma non per quelli sulla base della BSCL. È dunque possibile che il numero di casi analizzabili diverga secondo l'analisi e anche secondo il singolo tipo di misura restrittiva della libertà.

4.1 HoNOS

L'ANQ auspica per l'80% dei pazienti in cura questionari HoNOS di ammissione e dimissione analizzabili oppure *drop-out* documentati correttamente e non influenzabili.


Per la valutazione centrale del peso dei sintomi da parte del personale di cura con l'HoNOS, 55 cliniche su 65 (l'85%) hanno raggiunto il tasso dell'80% o più auspicato dall'ANQ di casi per i quali sono stati rilevati e forniti la misurazione al momento dell'ammissione, al momento della dimissione e i dati necessari della statistica medica, oppure documentati come *drop-out* non influenzabili. Due cliniche hanno documentato sufficientemente meno del 50% dei loro casi e una clinica non ha fornito dati. In alcune cliniche, molti set di dati HoNOS mancano del tutto senza spiegazione.

4.2 BSCL


Per la BSCL, ossia la valutazione del peso dei sintomi da parte dei pazienti, esistono più motivi legittimi per i quali non può essere fornito un set di dati, tra cui la lingua del paziente. Per questo, il numero delle risposte è inferiore. 62 cliniche su 65 (il 95%) hanno raggiunto il valore auspicato dall'ANQ del 40% di coppie di questionari con le necessarie indicazioni sociodemografiche, rispettivamente di *drop-out* non influenzabili documentati correttamente. Il tasso di *drop-out* influenzabili e non influenzabili, e il numero di set di dati non documentati sono in parte ancora molto alti anche per la BSCL.


4.3 Misure restrittive della libertà

Nelle misure restrittive della libertà, 17 cliniche su 36 (il 47%) hanno fornito il 100% delle misure notificate in qualità analizzabile. Nelle altre, mancava una parte delle indicazioni (p.es. la data dell'inizio o l'ora della fine della misura) nello 0,1-100% delle misure.




Quota di casi analizzabili per calcoli BSCL (inclusivo drop-out (non influenzabile))
(comprende MedStat + dati aggiuntivi psichiatria + BSCL di ammissione + BSCL di dimissione)






4.4 Confronti annuali della qualità dei dati


4.4.1 Quota di casi analizzabili per l'HoNOS nell'anno in corso e in quello precedente



4.4.2 Quota di casi analizzabili per la BSCL nell'anno in corso e in quello precedente



4.4.3 Quota d'annotazione valutabile per calcoli le misure restrittive della libertà nell'anno in corso e in quello precedente




5 Descrizione prova a campione e *case-mix*


In questo capitolo, si descrive la clientela di pazienti delle singole cliniche oggetto di queste analisi. Oltre al numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento, qui vengono rappresentate tutte le variabili rilevanti per il confronto tra cliniche (vedi [punto 6.2](#)). Inoltre, è rappresentato il punteggio complessivo medio BSCL e HoNOS al momento dell'ammissione.

Queste analisi si riferiscono ai casi effettivamente trattati e documentati senza aggiustamento. Per motivi di chiarezza, la maggior parte delle variabili è comunicata soltanto per l'intero campione. [L'annesso A1](#) riporta i valori di tutte le cliniche riferiti a tutte le caratteristiche.


5.1 Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




5.2 Età all'ammissione




5.3 Sesso



5.4 Diagnosi principale




5.5 Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Esempio di lettura: i pazienti della clinica 101 presentano un risultato medio HoNOS all'ammissione di 14 punti (vedi rombo azzurro nella colonna 101), inferiore al punteggio HoNOS all'ammissione dell'entità totale (= 17, linea orizzontale blu). Il risultato medio BSCL all'ammissione dei pazienti della clinica 101 è di 65 punti (vedi cerchio verde nella colonna 101), leggermente superiore al punteggio medio BSCL all'ammissione dell'entità totale (= 63, linea orizzontale verde).


5.6 Ricovero a scopo di assistenza




5.7 Nazionalità




5.8 Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




5.9 Stato civile




5.10 Occupazione prima dell'ammissione




5.11 Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




5.12 Classe



5.13 Istanza ricoverante



5.14 Durata della degenza




In questo rapporto, la durata della degenza⁸ viene calcolata in base alla definizione di SwissDRG (data della dimissione-data dell'ammissione-congedo amministrativo) e si riferisce solamente a pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 (inizio della misurazione) e dimessi nel periodo di rilevamento (1° gennaio - 31 dicembre 2014). Non può quindi essere superiore a 913 giorni. Per i pazienti lungodegenti (ammessi a partire dal 1° luglio 2012), la durata della cura potrà essere rappresentata solo in rapporti successivi.

⁸ Sulla scorta della consultazione 2014, la durata della degenza viene descritta anche con il valore medio, oltre che con la mediana. Questi valori sono riportati nella relativa tabella nell'annesso.


5.15 Degenze di breve durata

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.




5.16 Casi esclusi (HoNOS)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), HoNOS drop-outs e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.




5.17 Casi esclusi (BSCL)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), BSCL drop-outs e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.



5.18 Casi esclusi (misure restrittive della libertà)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure il valore HoNOS all'ammissione) sono esclusi dai confronti tra cliniche.



6 Metodi

La procedura metodica è stata sviluppata dall'istituto di analisi in stretto coordinamento con il Comitato dell'ANQ per la qualità Psichiatria, sulla base delle direttive dell'ANQ e dello stato della scienza e delle esperienze derivanti da altri sistemi di gestione della qualità (cfr. p.es. BQS, procedure GQ Reha, [Kuhl et al. 2008](#)). Si è inoltre fatto ricorso alle esperienze acquisite con le misurazioni nazionali per perfezionare la metodica, ove necessario. Le esperienze saranno usate anche per migliorare le direttive per l'attuazione e per la qualità dei dati, e per ottimizzare l'*inter-rater reliability* tramite formazioni e altre misure di accompagnamento.

6.1 Procedura

Il rilevamento dei dati è responsabilità delle cliniche, le quali si rifanno alle direttive dell'ANQ riportate nei documenti "*Manuale per rilevatori*" e "*Definizione dei dati*". La qualità dei dati forniti è decisiva per avere analisi significative e affidabili. Le cliniche sono state informate dall'ANQ in occasione di incontri di formazione e tramite diversi documenti, una newsletter e un sito internet con domande frequenti (FAQ) in merito a fondamenti, svolgimento e aspetti tecnici del rilevamento, della gestione e del trasferimento dei dati. Hanno altresì beneficiato della consulenza dell'istituto di analisi riguardo al rilevamento e alla fornitura dei dati, mentre nel novembre 2012 e da marzo 2013 hanno ricevuto analisi semestrali sulla qualità dei dati con proposte per l'ottimizzazione. Questi riscontri contenevano, oltre alle informazioni sulla completezza dei set di dati parziali forniti e la loro analizzabilità per i confronti nazionali tra cliniche, anche le indicazioni sul potenziale di miglioramento della qualità dei dati.

Nelle cliniche vengono rilevati cinque set di dati riferiti ai casi:

- indicazioni generali e set minimo di dati UST (definiti dall'UST);
- dati supplementari psichiatria UST (definiti dall'UST);
- peso dei sintomi come valutazione da parte di terzi con il questionario di documentazione del caso Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults al momento dell'ammissione e della dimissione ([Wing et al., 1998](#));
- peso dei sintomi come autovalutazione con il questionario dei pazienti Brief Symptom Checklist BSCL al momento dell'ammissione e della dimissione (precedente denominazione: Brief Symptom Inventory BSI, forma abbreviata della checklist dei sintomi SCL-90; [Derogatis & Melisaratos, 1983](#));
- misure restrittive della libertà con il questionario di documentazione del caso EFM/MRL (sviluppato dall'ANQ sulla base dello strumento costrizione BM secondo il progetto pilota ANQ ([ANQ, 2011](#)) e il benchmark ZM regione Lago di Costanza ([Martin et al., 2007](#)) integrato con item specifici della gerontopsichiatria). Si rilevano isolamenti, immobilizzazioni, medicazioni forzate e misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto.

La misura centrale per la qualità della cura è il cambiamento del peso dei sintomi, misurato sia con l'HoNOS sia con la BSCL. Altri outcome sono la frequenza, rispettivamente l'intensità dei diversi tipi di misure restrittive della libertà.

La definizione del caso corrisponde a quella dell'Ufficio federale di statistica.⁹ L'unità di rilevamento è un caso di cura. Le cliniche forniscono dati per tutti i pazienti adulti trattati in ospedali psichiatrici nel periodo di rilevamento. Per l'analisi attuale sono stati considerati i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, poiché i dati delle misurazioni sia all'ammissione sia alla dimissione erano disponibili solo per questi pazienti e quindi solo per questi si potevano calcolare i valori dei risultati delle misurazioni.

⁹ http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen_quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90752.pdf

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

Per l'aggiustamento dei risultati è necessario disporre, oltre che delle misurazioni del peso dei sintomi all'ammissione e alla dimissione, anche dei dati per le variabili confondenti rilevanti. Dall'analisi sono stati esclusi i casi senza valori per i predittori potenzialmente importanti (età, sesso, gruppo di diagnosi, gravità all'ammissione (HoNOS o BSCL)). Le variabili di categoria come i gruppi di diagnosi sono stati trasformati in variabili dummy. Le analisi statistiche sono state eseguite con il software IBM SPSS Statistics versione 22 (IBM Corp., 2013).

Tutte le cliniche partecipanti sono state inserite nel confronto nazionale, indipendentemente dal numero di casi trattati o documentati. Una clinica con un numero basso di casi ben documentati viene resa distinguibile nei diagrammi a causa del maggiore grado di incertezza dei risultati calcolati.

Oltre al rapporto comparativo nazionale, le cliniche ricevono un rapporto specifico non pubblico con ulteriori analisi non aggiustate.

6.2 Analisi variabili confondenti

Con l'analisi delle variabili confondenti si è appurato quali caratteristiche dei pazienti dovevano essere considerate confondenti, poiché avevano un'influenza sostanziale sul risultato delle misurazioni e quindi - se le cliniche differivano nella composizione dei loro pazienti per quanto riguarda le relative variabili - avrebbero potuto portare a distorsioni dei confronti tra cliniche. Sulla scorta di ponderazioni contenutistiche, è stato stilato un elenco di caratteristiche dei pazienti e dei casi, e ne è stata valutata l'influenza sul risultato della misurazione.

Tra le variabili dei set di dati rilevati, le seguenti sono state identificate come potenzialmente rilevanti:

- età all'ammissione;
- sesso;
- diagnosi principale;
- gravità della malattia al momento dell'ammissione (HoNOS, risp. BSCL);
- ricovero a scopo di assistenza;
- nazionalità;
- formazione scolastica o professionale più elevata conclusa;
- stato civile;
- occupazione prima dell'ammissione;
- luogo di soggiorno prima dell'ammissione;
- classe (comune, semiprivato, privato);
- istanza ricoverante;
- durata della degenza.

6.2.1 Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS

Per il risultato della misurazione rilevato con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): HoNOS complessivo (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F0, F1, F4, F6, F7, altro); ricovero a scopo di assistenza; nazionalità; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, lavoro domestico nella propria economia domestica, in formazione, AI/AVS o rendita, sconosciuto); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (nessuno, scuola dell'obbligo, sconosciuto); stato civile (coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, sconosciuto); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (casa di cura, casa per anziani, clinica psichiatrica, penitenziario, altro); classe (semiprivato o privato); istanza ricoverante (paziente stesso/familiare, servizio di soccorso, altro, sconosciuto). Nel complesso, le variabili hanno chiarito il 33.4% della varianza degli outcome nell'HoNOS.

6.2.2 Risultato della misurazione peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

Per il risultato della misurazione rilevato con la BSCL, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): BSCL complessiva (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F1, F2, F4, F5, F6); mancanza dell'indicazione del ricovero a scopo di assistenza; nazionalità; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, AI/AVS o rendita); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (nessuno, scuola dell'obbligo); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (domicilio con spitex o casa per anziani); classe (semiprivato o privato); assegnazione da parte di terapisti non medici. I predittori considerati hanno chiarito il 37.6% della varianza.

6.2.3 Risultato della misurazione delle misure restrittive della libertà: tasso di casi interessati

Per il tasso di pazienti per i quali è stata adottata almeno una misura restrittiva della libertà, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): età; sesso; HoNOS complessivo (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F0, F1, F2, F4, F6, F7, altro); ricovero a scopo di assistenza; formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (scuola dell'obbligo, tirocinio, alta scuola o università); stato civile (vedovo/a, divorziato/a o sconosciuto/mancante); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (casa di cura o casa per anziani); classe (semiprivato o privato); istanza ricoverante (paziente stesso/familiare, servizio di soccorso o autorità giudiziaria); durata della degenza. Le variabili considerate hanno chiarito il 19.4% della varianza dei tassi di casi con misure restrittive della libertà.

6.2.4 Valutazione complessiva

Per l'aggiustamento dei risultati, tutte le variabili potenzialmente rilevanti sono state inserite nei modelli di regressione finali, dato che singoli predittori, pur non esercitando un'influenza statisticamente significativa sull'outcome nell'intero campione, risultavano significativi per singole cliniche.

6.3 Aggiustamento secondo il rischio per i confronti tra cliniche

Al fine di consentire confronti quanto più equi possibile della qualità dei risultati, i parametri outcome calcolati a tale scopo devono essere ripuliti dall'influenza delle variabili confondenti sulle quali la clinica non può agire. È il caso in primis della composizione del collettivo di pazienti in cura, il cosiddetto *case-mix*. I risultati ripuliti dall'influenza delle variabili confondenti sono definiti "aggiustati" (cfr. al riguardo [Farin et al., 2005](#); [Iezzoni, 1995, 2004](#)). Il rapporto comprende anche i risultati non aggiustati per rappresentare gli outcome delle cliniche con il loro *case-mix* effettivo, ma essi non sono adatti a trarre conclusioni comparative.

Le caratteristiche strutturali¹⁰ non sono state rilevate e non confluiscono nell'analisi, sono però interessanti per un'eventuale discussione dei risultati tra le cliniche.

L'aggiustamento secondo il rischio è effettuato con una procedura analitica della regressione: con l'ausilio dei dati dell'intero campione, viene stimato il valore atteso per ogni singolo caso in base alla caratteristica delle variabili confondenti. Questo valore è confrontato con il valore effettivo del risultato di ogni caso di cura. La differenza rappresenta il "valore residuo", ossia ciò che rimane dopo avere eliminato le influenze delle variabili confondenti dai valori grezzi ottenuti. I valori così calcolati sono confrontabili per diverse cliniche in quanto tengono in considerazione le particolarità della struttura dei pazienti.

Per la rappresentazione dei risultati dei confronti tra cliniche si opta per diagrammi a barre di errore: sull'asse delle ordinate y figura la differenza tra il risultato atteso e quello effettivo della cura di ciascuna clinica (valori residui standardizzati). Per ogni clinica, il valore medio del valore residuo di tutti i suoi casi è rappresentato con l'intervallo di confidenza 95%. Il riferimento è costituito dal valore resi-

¹⁰ L'inclusione di dati strutturali delle cliniche auspicata nel quadro della consultazione 2014 verrà approfondita a partire dal 2015 da un gruppo di lavoro del Comitato per la qualità Psichiatria. Finora, non esistono criteri strutturali unitari a livello svizzero che consentano una tale operazione.

duo medio dell'intero campione, che per motivi di semplificazione del calcolo ha sempre il valore "0", con il suo intervallo di confidenza 95% ([Brandstätter, 1999](#); [Cumming & Finch, 2005](#); cfr. esempio di lettura "Diagramma a barre di errore" nell'annesso "[Ausili alla lettura](#)").

6.4 Significatività delle differenze tra valore della clinica e valore normale

Per agevolare l'interpretazione dei risultati, sono stati calcolati i valori medi dei risultati delle cliniche, gli intervalli di confidenza e l'eventuale divergenza statisticamente significativa dei valori delle cliniche rispetto al valore medio svizzero. A tale scopo, per ogni valore (valore medio dei residui standardizzati di tutti i casi analizzabili della clinica in questione) è stato effettuato un test t per verificare se tale valore diverge con una sicurezza di almeno il 95% dal valore medio complessivo dei residui standardizzati (valore 0). È stata fissata il livello di significatività all' $\alpha_{\text{test}} \leq 0.05$.

Annesso


L'annesso contiene tabelle con i valori numerici relativi alle analisi descritte nella parte principale, altri diagrammi più dettagliati, ausili alla lettura e la bibliografia citata.

A1. Informazioni generali in riguardo alla fornitura dati

Numero di casi conclusi nel periodo della rilevazione

		Numero Casi			Numero Casi
		Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1. - 31.12.2014 («Completo»)			Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1. - 31.12.2014 («Completo»)
Clinica	Totale	67214	212		84
	101	3183	221		1277
	102	527	231		225
	103	186	241		2054
	104	138	242		1262
	105	683	251		655
	106	40	261		1748
	111	715	271		24
	121	249	281		1505
	122	250	282		1906
	123	284	283		344
	124	109	291		387
	125	1249	292		1275
	126	754	293		198
	127	2195	294		959
	128	155	301		3676
	129	74	302		194
	131	709	303		572
	132	384	304		53
	133	2632	305		992
	134	59	311		1603
	141	1929	312		0
	142	321	321		477
	143	141	322		1292
	151	518	331		2575
	152	2955	332		514
	161	2117	333		2925
	171	179	334		470
	172	3327	335		4847
	181	147	336		1940
	191	1782	337		204
	192	400	338		120
	211	2434	339		32

Età all'ammissione




Quota di casi per fascia di età nelle cliniche

		Età all'ammissione							
		fino 17 anni		18 - 64 anni		da 65 anni		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	581	0.9%	56275	83.7%	10352	15.4%	6	0.01%
	101	10	0.3%	2529	79.5%	644	20.2%	0	0.0%
	102	9	1.7%	476	90.3%	42	8.0%	0	0.0%
	103	0	0.0%	184	98.9%	2	1.1%	0	0.0%
	104	28	20.3%	110	79.7%	0	0.0%	0	0.0%
	105	0	0.0%	606	88.7%	77	11.3%	0	0.0%
	106	0	0.0%	35	87.5%	5	12.5%	0	0.0%
	111	6	0.8%	605	84.6%	104	14.5%	0	0.0%
	121	4	1.6%	214	85.9%	31	12.4%	0	0.0%
	122	0	0.0%	249	99.6%	0	0.0%	1	0.4%
	123	1	0.4%	256	90.1%	27	9.5%	0	0.0%
	124	5	4.6%	104	95.4%	0	0.0%	0	0.0%
	125	0	0.0%	1068	85.5%	181	14.5%	0	0.0%
	126	0	0.0%	637	84.5%	117	15.5%	0	0.0%
	127	5	0.2%	1767	80.5%	418	19.0%	5	0.2%
	128	0	0.0%	132	85.2%	23	14.8%	0	0.0%
	129	6	8.1%	67	90.5%	1	1.4%	0	0.0%
	131	5	0.7%	632	89.1%	72	10.2%	0	0.0%
	132	0	0.0%	356	92.7%	28	7.3%	0	0.0%
	133	0	0.0%	2284	86.8%	348	13.2%	0	0.0%
	134	3	5.1%	56	94.9%	0	0.0%	0	0.0%
	141	1	0.1%	1531	79.4%	397	20.6%	0	0.0%
	142	0	0.0%	245	76.3%	76	23.7%	0	0.0%
	143	0	0.0%	141	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	151	2	0.4%	451	87.1%	65	12.5%	0	0.0%
	152	4	0.1%	2525	85.4%	426	14.4%	0	0.0%
	161	15	0.7%	1777	83.9%	325	15.4%	0	0.0%
	171	13	7.3%	162	90.5%	4	2.2%	0	0.0%
	172	27	0.8%	2727	82.0%	573	17.2%	0	0.0%
	181	4	2.7%	127	86.4%	16	10.9%	0	0.0%
	191	52	2.9%	1386	77.8%	344	19.3%	0	0.0%
	192	0	0.0%	392	98.0%	8	2.0%	0	0.0%
	211	36	1.5%	2082	85.5%	316	13.0%	0	0.0%
	212	0	0.0%	80	95.2%	4	4.8%	0	0.0%

	Età all'ammissione							
	fino 17 anni		18 - 64 anni		da 65 anni		Indicazione mancata	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
221	5	0.4%	987	77.3%	285	22.3%	0	0.0%
231	3	1.3%	197	87.6%	25	11.1%	0	0.0%
241	12	0.6%	1769	86.1%	273	13.3%	0	0.0%
242	9	0.7%	1092	86.5%	161	12.8%	0	0.0%
251	7	1.1%	549	83.8%	99	15.1%	0	0.0%
261	27	1.5%	1402	80.2%	319	18.2%	0	0.0%
271	0	0.0%	18	75.0%	6	25.0%	0	0.0%
281	21	1.4%	1386	92.1%	98	6.5%	0	0.0%
282	15	0.8%	1509	79.2%	382	20.0%	0	0.0%
283	0	0.0%	315	91.6%	29	8.4%	0	0.0%
291	0	0.0%	295	76.2%	92	23.8%	0	0.0%
292	19	1.5%	1047	82.1%	209	16.4%	0	0.0%
293	0	0.0%	144	72.7%	54	27.3%	0	0.0%
294	5	0.5%	804	83.8%	150	15.6%	0	0.0%
301	8	0.2%	2997	81.5%	671	18.3%	0	0.0%
302	0	0.0%	140	72.2%	54	27.8%	0	0.0%
303	1	0.2%	476	83.2%	95	16.6%	0	0.0%
304	7	13.2%	46	86.8%	0	0.0%	0	0.0%
305	4	0.4%	846	85.3%	142	14.3%	0	0.0%
311	0	0.0%	1302	81.2%	301	18.8%	0	0.0%
312	.	.	.	.	.	.	.	.
321	9	1.9%	413	86.6%	55	11.5%	0	0.0%
322	4	0.3%	1071	82.9%	217	16.8%	0	0.0%
331	57	2.2%	2096	81.4%	422	16.4%	0	0.0%
332	0	0.0%	487	94.7%	27	5.3%	0	0.0%
333	50	1.7%	2462	84.2%	413	14.1%	0	0.0%
334	0	0.0%	400	85.1%	70	14.9%	0	0.0%
335	50	1.0%	4126	85.1%	671	13.8%	0	0.0%
336	30	1.5%	1564	80.6%	346	17.8%	0	0.0%
337	0	0.0%	192	94.1%	12	5.9%	0	0.0%
338	1	0.8%	119	99.2%	0	0.0%	0	0.0%
339	1	3.1%	31	96.9%	0	0.0%	0	0.0%

Sesso




Quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

		Sesso					
		Uomo		Donna		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	32827	48.8%	34382	51.2%	5	0.007%
	101	1591	50.0%	1592	50.0%	0	0.0%
	102	170	32.3%	357	67.7%	0	0.0%
	103	141	75.8%	45	24.2%	0	0.0%
	104	107	77.5%	31	22.5%	0	0.0%
	105	252	36.9%	431	63.1%	0	0.0%
	106	13	32.5%	27	67.5%	0	0.0%
	111	405	56.6%	310	43.4%	0	0.0%
	121	108	43.4%	141	56.6%	0	0.0%
	122	194	77.6%	56	22.4%	0	0.0%
	123	90	31.7%	194	68.3%	0	0.0%
	124	0	0.0%	109	100.0%	0	0.0%
	125	615	49.2%	634	50.8%	0	0.0%
	126	311	41.2%	443	58.8%	0	0.0%
	127	1190	54.2%	1000	45.6%	5	0.2%
	128	68	43.9%	87	56.1%	0	0.0%
	129	13	17.6%	61	82.4%	0	0.0%
	131	386	54.4%	323	45.6%	0	0.0%
	132	280	72.9%	104	27.1%	0	0.0%
	133	1271	48.3%	1361	51.7%	0	0.0%
	134	34	57.6%	25	42.4%	0	0.0%
	141	956	49.6%	973	50.4%	0	0.0%
	142	54	16.8%	267	83.2%	0	0.0%
	143	105	74.5%	36	25.5%	0	0.0%
	151	161	31.1%	357	68.9%	0	0.0%
	152	1467	49.6%	1488	50.4%	0	0.0%
	161	1098	51.9%	1019	48.1%	0	0.0%
	171	88	49.2%	91	50.8%	0	0.0%
	172	1692	50.9%	1635	49.1%	0	0.0%
	181	79	53.7%	68	46.3%	0	0.0%
	191	872	48.9%	910	51.1%	0	0.0%
	192	176	44.0%	224	56.0%	0	0.0%
	211	1281	52.6%	1153	47.4%	0	0.0%
	212	57	67.9%	27	32.1%	0	0.0%

	Sesso					
	Uomo		Donna		Indicazione mancata	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
221	628	49.2%	649	50.8%	0	0.0%
231	105	46.7%	120	53.3%	0	0.0%
241	1138	55.4%	916	44.6%	0	0.0%
242	669	53.0%	593	47.0%	0	0.0%
251	357	54.5%	298	45.5%	0	0.0%
261	907	51.9%	841	48.1%	0	0.0%
271	4	16.7%	20	83.3%	0	0.0%
281	543	36.1%	962	63.9%	0	0.0%
282	968	50.8%	938	49.2%	0	0.0%
283	74	21.5%	270	78.5%	0	0.0%
291	200	51.7%	187	48.3%	0	0.0%
292	740	58.0%	535	42.0%	0	0.0%
293	83	41.9%	115	58.1%	0	0.0%
294	450	46.9%	509	53.1%	0	0.0%
301	1748	47.6%	1928	52.4%	0	0.0%
302	52	26.8%	142	73.2%	0	0.0%
303	234	40.9%	338	59.1%	0	0.0%
304	3	5.7%	50	94.3%	0	0.0%
305	503	50.7%	489	49.3%	0	0.0%
311	729	45.5%	874	54.5%	0	0.0%
312	.	.	.	.	.	.
321	0	0.0%	477	100.0%	0	0.0%
322	684	52.9%	608	47.1%	0	0.0%
331	1234	47.9%	1341	52.1%	0	0.0%
332	343	66.7%	171	33.3%	0	0.0%
333	1421	48.6%	1504	51.4%	0	0.0%
334	175	37.2%	295	62.8%	0	0.0%
335	2491	51.4%	2356	48.6%	0	0.0%
336	856	44.1%	1084	55.9%	0	0.0%
337	66	32.4%	138	67.6%	0	0.0%
338	94	78.3%	26	21.7%	0	0.0%
339	3	9.4%	29	90.6%	0	0.0%

Diagnosi Principale



Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)

		Gruppi di diagnosi principale riunite									
		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	3703	14315	11675	21433	7930	692	4897	1395	901	273
101		267	757	596	760	445	12	221	62	63	0
102		1	6	2	312	143	34	10	3	16	0
103		0	175	1	3	0	0	7	0	0	0
104		0	138	0	0	0	0	0	0	0	0
105		3	2	8	544	94	18	14	0	0	0
106		0	0	0	0	0	34	0	0	6	0
111		48	149	133	212	63	1	73	24	12	0
121		5	31	50	106	28	0	26	2	1	0
122		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
123		1	0	11	202	48	2	19	0	1	0
124		0	40	0	4	0	61	3	0	1	0
125		50	256	143	599	149	2	40	10	0	0
126		2	66	31	531	112	3	8	1	0	0
127		110	638	429	474	199	8	156	73	102	6
128		5	13	21	96	13	0	6	0	1	0
129		0	1	0	18	23	24	4	1	3	0
131		22	142	163	237	74	2	51	13	5	0
132		0	384	0	0	0	0	0	0	0	0
133		97	499	701	668	381	11	178	22	60	15
134		0	0	51	4	1	0	3	0	0	0
141		182	400	349	541	169	18	227	12	31	0
142		0	2	11	168	125	2	2	0	11	0
143		0	134	4	2	0	0	1	0	0	0
151		2	49	32	315	58	17	44	1	0	0
152		127	676	577	933	344	15	223	30	22	8
161		154	521	335	586	337	7	144	32	0	1
171		0	27	0	0	0	44	19	0	83	6
172		161	650	755	986	183	20	194	137	89	152
181		2	19	18	50	48	0	8	1	1	0
191		106	436	278	560	201	18	82	30	71	0
192		0	0	0	362	35	0	1	0	2	0
211		64	487	405	575	214	16	339	334	0	0
212		0	84	0	0	0	0	0	0	0	0


	Gruppi di diagnosi principale riunite									
	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
221	166	245	208	319	169	2	116	29	9	14
231	5	31	55	87	24	1	17	2	3	0
241	127	504	371	616	229	4	148	27	28	0
242	59	275	268	428	109	6	72	16	29	0
251	31	166	144	132	97	2	68	7	8	0
261	188	450	294	443	217	7	107	40	2	0
271	0	0	0	14	8	0	0	0	2	0
281	10	144	115	701	389	22	96	26	2	0
282	117	522	296	497	164	3	187	12	107	1
283	0	0	0	276	17	51	0	0	0	0
291	11	96	65	92	55	3	60	4	1	0
292	50	303	375	228	79	2	175	48	15	0
293	2	14	25	104	34	2	15	2	0	0
294	48	152	158	322	123	5	134	13	4	0
301	419	834	808	877	290	14	307	58	7	62
302	2	8	4	121	56	0	3	0	0	0
303	6	83	34	349	40	7	48	3	0	2
304	0	0	0	0	0	52	1	0	0	0
305	33	160	249	253	144	2	104	16	30	1
311	129	127	355	626	178	16	80	75	17	0
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	3	8	59	289	43	6	65	4	0	0
322	41	238	275	455	111	9	89	18	56	0
331	175	443	418	1083	249	9	173	25	0	0
332	0	513	0	0	0	0	0	0	0	1
333	208	434	507	856	588	8	234	90	0	0
334	1	5	3	336	113	2	6	1	0	3
335	331	1088	1156	1209	601	17	373	72	0	0
336	132	269	304	811	272	33	103	16	0	0
337	0	51	25	61	44	6	13	3	0	1
338	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
339	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0

Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)

		Gruppi di diagnosi principale riunite									
		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Clinica	Totale	6%	21%	17%	32%	12%	1%	7%	2%	1%	0%
	101	8%	24%	19%	24%	14%	0%	7%	2%	2%	0%
	102	0%	1%	0%	59%	27%	6%	2%	1%	3%	0%
	103	0%	94%	1%	2%	0%	0%	4%	0%	0%	0%
	104	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	105	0%	0%	1%	80%	14%	3%	2%	0%	0%	0%
	106	0%	0%	0%	0%	0%	85%	0%	0%	15%	0%
	111	7%	21%	19%	30%	9%	0%	10%	3%	2%	0%
	121	2%	12%	20%	43%	11%	0%	10%	1%	0%	0%
	122	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	123	0%	0%	4%	71%	17%	1%	7%	0%	0%	0%
	124	0%	37%	0%	4%	0%	56%	3%	0%	1%	0%
	125	4%	20%	11%	48%	12%	0%	3%	1%	0%	0%
	126	0%	9%	4%	70%	15%	0%	1%	0%	0%	0%
	127	5%	29%	20%	22%	9%	0%	7%	3%	5%	0%
	128	3%	8%	14%	62%	8%	0%	4%	0%	1%	0%
	129	0%	1%	0%	24%	31%	32%	5%	1%	4%	0%
	131	3%	20%	23%	33%	10%	0%	7%	2%	1%	0%
	132	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	133	4%	19%	27%	25%	14%	0%	7%	1%	2%	1%
	134	0%	0%	86%	7%	2%	0%	5%	0%	0%	0%
	141	9%	21%	18%	28%	9%	1%	12%	1%	2%	0%
	142	0%	1%	3%	52%	39%	1%	1%	0%	3%	0%
	143	0%	95%	3%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
	151	0%	9%	6%	61%	11%	3%	8%	0%	0%	0%
	152	4%	23%	20%	32%	12%	1%	8%	1%	1%	0%
	161	7%	25%	16%	28%	16%	0%	7%	2%	0%	0%
	171	0%	15%	0%	0%	0%	25%	11%	0%	46%	3%
	172	5%	20%	23%	30%	6%	1%	6%	4%	3%	5%
	181	1%	13%	12%	34%	33%	0%	5%	1%	1%	0%
	191	6%	24%	16%	31%	11%	1%	5%	2%	4%	0%
	192	0%	0%	0%	91%	9%	0%	0%	0%	1%	0%
	211	3%	20%	17%	24%	9%	1%	14%	14%	0%	0%

	Gruppi di diagnosi principale riunite									
	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indica- zione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
212	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
221	13%	19%	16%	25%	13%	0%	9%	2%	1%	1%
231	2%	14%	24%	39%	11%	0%	8%	1%	1%	0%
241	6%	25%	18%	30%	11%	0%	7%	1%	1%	0%
242	5%	22%	21%	34%	9%	0%	6%	1%	2%	0%
251	5%	25%	22%	20%	15%	0%	10%	1%	1%	0%
261	11%	26%	17%	25%	12%	0%	6%	2%	0%	0%
271	0%	0%	0%	58%	33%	0%	0%	0%	8%	0%
281	1%	10%	8%	47%	26%	1%	6%	2%	0%	0%
282	6%	27%	16%	26%	9%	0%	10%	1%	6%	0%
283	0%	0%	0%	80%	5%	15%	0%	0%	0%	0%
291	3%	25%	17%	24%	14%	1%	16%	1%	0%	0%
292	4%	24%	29%	18%	6%	0%	14%	4%	1%	0%
293	1%	7%	13%	53%	17%	1%	8%	1%	0%	0%
294	5%	16%	16%	34%	13%	1%	14%	1%	0%	0%
301	11%	23%	22%	24%	8%	0%	8%	2%	0%	2%
302	1%	4%	2%	62%	29%	0%	2%	0%	0%	0%
303	1%	15%	6%	61%	7%	1%	8%	1%	0%	0%
304	0%	0%	0%	0%	0%	98%	2%	0%	0%	0%
305	3%	16%	25%	26%	15%	0%	10%	2%	3%	0%
311	8%	8%	22%	39%	11%	1%	5%	5%	1%	0%
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	1%	2%	12%	61%	9%	1%	14%	1%	0%	0%
322	3%	18%	21%	35%	9%	1%	7%	1%	4%	0%
331	7%	17%	16%	42%	10%	0%	7%	1%	0%	0%
332	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
333	7%	15%	17%	29%	20%	0%	8%	3%	0%	0%
334	0%	1%	1%	71%	24%	0%	1%	0%	0%	1%
335	7%	22%	24%	25%	12%	0%	8%	1%	0%	0%
336	7%	14%	16%	42%	14%	2%	5%	1%	0%	0%
337	0%	25%	12%	30%	22%	3%	6%	1%	0%	0%
338	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
339	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%

HoNOS: Gravità all'ammissione (punteggio totale)




Gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS) nelle cliniche

		Punteggio totale HoNOS (ammissione)								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
Clinica	Totale	17.39	7.38	.00	12.00	17.00	22.00	48.00	60144	7070
	101	15.34	7.32	.00	10.00	14.00	20.00	45.00	2533	650
	102	14.26	5.43	3.00	10.00	14.00	17.00	33.00	518	9
	103	13.26	5.91	.00	9.00	12.00	17.00	28.00	182	4
	104	13.09	5.42	3.00	9.00	13.00	16.00	29.00	138	0
	105	17.96	5.50	4.00	14.00	18.00	21.00	37.00	677	6
	106	10.37	4.63	5.00	6.50	9.00	12.50	21.00	40	0
	111	22.48	6.69	3.00	18.00	22.00	27.00	42.55	710	5
	121	18.06	5.87	7.00	14.00	18.00	22.00	34.00	171	78
	122	21.62	5.61	8.00	18.00	21.00	26.00	37.00	250	0
	123	14.53	6.37	2.00	9.82	14.18	19.00	37.00	279	5
	124	23.31	5.58	12.00	20.00	23.00	27.00	38.00	108	1
	125	17.60	7.37	.00	12.00	17.00	23.00	41.00	1227	22
	126	15.31	5.77	2.00	11.00	15.00	19.00	38.00	744	10
	127	20.12	6.81	.00	15.27	19.64	25.00	46.67	1990	205
	128	9.46	4.64	1.00	6.00	9.00	11.50	23.00	144	11
	129	22.24	7.07	8.00	18.00	22.91	26.00	39.00	73	1
	131	12.84	5.50	2.00	9.00	12.00	16.00	34.00	633	76
	132	12.76	6.13	2.00	8.00	11.00	16.00	37.00	384	0
	133	18.35	8.41	.00	12.00	17.33	24.00	46.00	2080	552
	134	20.09	5.98	8.00	17.00	19.00	25.00	35.00	59	0
	141	15.49	6.24	.00	11.00	15.00	19.00	38.00	1822	107
	142	18.90	6.50	4.00	15.00	20.00	24.00	35.00	199	122
	143	12.44	5.86	.00	8.00	12.00	16.00	31.00	127	14
	151	17.18	5.21	.00	14.00	17.00	20.00	34.00	517	1
	152	18.29	8.32	1.00	12.00	17.00	23.00	48.00	2665	290
	161	17.04	7.34	.00	11.00	16.00	22.00	43.64	2017	100
	171	13.76	9.34	.00	5.00	13.00	20.73	39.00	115	64
	172	14.67	6.26	.00	10.00	14.00	19.00	40.80	2503	824
	181	15.49	5.68	2.00	12.00	15.00	18.55	38.00	135	12
	191	13.12	6.80	.00	8.00	12.00	17.00	44.00	1703	79
	192	17.94	4.97	3.00	15.00	18.00	22.00	34.00	396	4
	211	17.73	7.51	1.00	12.00	17.00	22.67	45.00	2032	402
	212	11.90	4.81	.00	8.00	11.00	15.00	28.00	84	0
	221	16.65	6.10	2.00	12.00	16.00	21.33	48.00	1255	22

	Punteggio totale HoNOS (ammissione)								
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
231	16.40	5.93	4.00	12.00	16.00	21.00	31.00	222	3
241	21.75	6.94	3.00	17.00	21.00	26.18	43.20	1985	69
242	16.44	6.21	2.00	12.00	16.00	20.73	39.00	1217	45
251	17.46	6.88	3.00	12.00	17.00	22.00	37.00	652	3
261	13.46	5.56	.00	9.82	13.00	16.80	34.80	931	817
271	14.21	6.94	.00	10.00	13.80	19.00	26.00	22	2
281	20.67	7.00	4.00	16.00	20.00	25.00	44.00	1459	46
282	21.57	7.62	.00	16.00	21.00	27.00	43.64	1897	9
283	19.16	7.33	3.00	14.00	18.00	24.00	42.00	343	1
291	15.34	6.16	1.00	11.00	15.00	19.00	35.00	387	0
292	17.22	7.21	.00	12.00	17.00	22.00	40.00	1224	51
293	17.37	5.04	6.00	14.00	17.00	20.00	35.00	198	0
294	20.28	6.75	1.00	15.00	20.00	24.00	48.00	937	22
301	15.47	8.02	.00	9.82	15.00	20.00	46.80	3118	558
302	13.76	5.36	3.00	10.00	13.00	18.00	26.00	120	74
303	14.33	5.48	.00	11.00	14.00	18.00	35.00	474	98
304	9.18	6.08	3.00	5.00	6.77	11.00	30.67	46	7
305	16.97	7.12	2.00	11.00	16.00	22.00	40.00	932	60
311	20.34	7.60	1.00	15.00	20.00	26.00	44.00	1391	212
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	14.30	5.86	.00	10.00	13.09	18.00	37.00	469	8
322	18.08	6.80	2.00	13.00	18.00	22.91	42.67	1234	58
331	20.21	6.87	.00	15.00	20.00	25.00	45.33	2542	33
332	15.33	6.43	1.00	11.00	15.00	19.00	40.00	510	4
333	17.27	6.86	.00	12.00	17.00	21.82	48.00	2384	541
334	13.68	4.47	4.00	11.00	14.00	16.00	30.00	461	9
335	18.80	7.31	.00	14.00	18.00	24.00	46.00	4283	564
336	15.70	6.42	.00	11.00	15.00	20.00	41.33	1872	68
337	18.60	6.32	5.00	14.00	18.67	23.00	40.00	177	27
338	12.08	6.32	2.00	7.00	12.00	15.64	30.00	116	4
339	21.69	5.48	9.82	18.00	22.00	26.00	30.00	31	1

BSCL: Gravità all'ammissione (punteggio totale)




Gravità all'ammissione (punteggio totale BSCL) nelle cliniche

		Punteggio totale BSCL (ammissione)								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
Clinica	Totale	67.43	42.16	.00	33.00	63.00	97.00	212.00	34872	32342
	101	70.47	42.88	.00	36.00	65.00	102.00	198.00	1150	2033
	102	74.62	42.52	.00	42.00	68.00	103.00	197.00	495	32
	103	41.21	31.81	.00	18.00	34.50	57.50	142.00	180	6
	104	53.58	38.72	.00	19.00	51.00	77.00	184.00	133	5
	105	67.47	34.29	2.00	42.00	64.00	89.00	168.00	651	32
	106	51.77	35.93	8.00	22.00	34.00	75.53	115.00	15	25
	111	72.16	41.49	.00	40.00	67.00	104.94	212.00	479	236
	121	75.77	39.75	.00	45.00	72.00	103.00	186.00	137	112
	122	49.02	36.55	1.00	21.00	39.75	73.26	163.00	212	38
	123	71.08	34.83	.00	44.00	68.00	94.00	186.00	254	30
	124	67.15	42.74	4.08	38.00	60.00	90.00	190.00	105	4
	125	62.24	38.58	.00	32.00	57.00	88.00	212.00	981	268
	126	73.71	37.19	2.12	46.00	70.00	98.00	208.00	518	236
	127	63.67	43.56	.00	27.00	56.00	93.88	212.00	888	1307
	128	64.58	36.39	6.00	35.50	61.00	90.50	160.00	88	67
	129	71.06	33.02	.00	44.85	69.00	94.00	151.00	59	15
	131	62.64	40.98	.00	30.00	57.50	89.85	212.00	364	345
	132	36.98	31.95	.00	13.00	28.00	51.50	194.00	360	24
	133	69.73	44.42	.00	33.63	65.00	101.00	207.18	1026	1606
	134	73.98	36.07	.00	49.00	68.50	100.00	147.00	54	5
	141	67.11	41.14	.00	32.00	63.30	94.00	209.00	930	999
	142	83.12	34.11	7.00	60.50	83.00	100.50	187.00	212	109
	143	45.63	33.43	.00	20.00	35.00	65.23	152.88	133	8
	151	74.54	37.85	5.00	44.50	69.00	100.00	193.00	436	82
	152	74.87	42.50	.00	40.00	75.00	105.00	204.00	1496	1459
	161	57.28	42.94	.00	22.00	46.00	88.00	199.00	1239	878
	171	55.31	34.86	2.00	31.00	51.50	66.50	159.00	104	75
	172	69.45	44.41	.00	32.50	65.00	101.88	212.00	1752	1575
	181	61.94	41.35	1.00	30.00	57.00	88.00	173.00	45	102
	191	61.24	40.36	.00	29.00	54.02	87.00	187.00	1002	780
	192	68.42	32.65	6.00	44.00	66.00	90.00	185.50	386	14
	211	67.02	43.31	.00	33.00	61.15	98.00	196.00	1019	1415
	212	28.54	24.64	.00	11.00	23.50	39.00	114.00	82	2
	221	64.59	45.99	.00	25.48	55.02	97.00	210.00	674	603

	Punteggio totale BSCL (ammissione)								
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
231	41.64	45.69	.00	.00	29.50	72.50	187.00	192	33
241	71.75	44.01	.00	36.00	68.62	101.00	212.00	1054	1000
242	67.42	41.95	.00	32.00	64.00	97.50	187.00	736	526
251	73.31	44.31	.00	34.00	71.00	107.00	183.00	394	261
261	61.75	42.00	.00	28.00	56.00	87.00	202.00	868	880
271	46.00	17.04	25.00	35.00	44.50	56.00	81.00	22	2
281	73.68	36.95	.00	45.00	71.00	100.00	204.00	1150	355
282	59.67	38.63	.00	29.00	51.00	86.00	212.00	1114	792
283	81.98	37.09	3.00	54.02	80.00	107.02	189.00	322	22
291	56.36	35.58	.00	28.00	50.50	81.00	187.00	342	45
292	58.23	45.76	.00	20.55	46.88	90.00	212.00	594	681
293	75.05	41.32	.00	43.00	68.00	102.00	187.00	149	49
294	69.89	45.03	.00	32.00	65.00	104.00	209.00	715	244
301	68.32	42.97	.00	35.17	63.10	98.80	190.00	808	2868
302	63.25	33.69	.00	34.29	64.00	86.00	138.00	127	67
303	73.13	40.12	2.00	42.00	69.65	101.00	197.00	402	170
304	64.67	42.27	5.00	24.00	58.00	104.00	145.00	35	18
305	63.33	46.00	.00	22.00	56.50	97.17	201.81	320	672
311	77.10	48.45	.00	35.00	77.00	111.00	212.00	811	792
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	75.84	41.79	.00	42.00	70.00	104.00	198.00	341	136
322	61.69	39.45	.00	28.00	59.00	89.00	203.00	633	659
331	75.75	42.63	.00	43.00	71.00	107.00	202.00	1478	1097
332	45.48	33.08	.00	19.00	39.25	64.43	163.00	470	44
333	77.72	40.86	.00	46.00	75.26	107.00	212.00	1139	1786
334	76.88	37.60	4.08	49.94	75.00	103.00	195.00	355	115
335	69.08	43.05	.00	33.00	66.00	102.00	193.00	1473	3374
336	69.71	41.44	.00	37.00	66.00	99.00	206.00	942	998
337	80.30	39.83	6.00	51.00	81.00	105.00	175.00	91	113
338	47.03	37.92	.00	18.00	34.00	70.00	184.00	111	9
339	67.20	31.82	9.00	45.00	66.00	81.00	134.00	25	7

Ricovero a scopo di assistenza




Ricovero a scopo di assistenza nelle cliniche

		Ricovero a scopo di assistenza					
		senza PLSA		con PLSA		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	57776	86.0%	8936	13.3%	502	0.7%
	101	2931	92.1%	252	7.9%	0	0.0%
	102	527	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	103	184	98.9%	2	1.1%	0	0.0%
	104	138	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	105	683	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	106	40	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	111	694	97.1%	21	2.9%	0	0.0%
	121	242	97.2%	7	2.8%	0	0.0%
	122	250	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	123	284	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	124	109	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	125	1138	91.1%	111	8.9%	0	0.0%
	126	752	99.7%	2	0.3%	0	0.0%
	127	2012	91.7%	178	8.1%	5	0.2%
	128	152	98.1%	3	1.9%	0	0.0%
	129	72	97.3%	1	1.4%	1	1.4%
	131	678	95.6%	31	4.4%	0	0.0%
	132	383	99.7%	1	0.3%	0	0.0%
	133	2355	89.5%	277	10.5%	0	0.0%
	134	59	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	141	1596	82.7%	333	17.3%	0	0.0%
	142	217	67.6%	1	0.3%	103	32.1%
	143	0	0.0%	0	0.0%	141	100.0%
	151	518	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	152	2638	89.3%	317	10.7%	0	0.0%
	161	2117	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	171	177	98.9%	0	0.0%	2	1.1%
	172	3314	99.6%	13	0.4%	0	0.0%
	181	146	99.3%	1	0.7%	0	0.0%
	191	1585	88.9%	197	11.1%	0	0.0%
	192	399	99.8%	0	0.0%	1	0.3%
	211	1886	77.5%	548	22.5%	0	0.0%
	212	84	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	221	1219	95.5%	58	4.5%	0	0.0%

	Ricovero a scopo di assistenza					
	senza PLSA		con PLSA		Indicazione mancata	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
231	211	93.8%	14	6.2%	0	0.0%
241	1479	72.0%	570	27.8%	5	0.2%
242	1043	82.6%	219	17.4%	0	0.0%
251	458	69.9%	193	29.5%	4	0.6%
261	1368	78.3%	380	21.7%	0	0.0%
271	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
281	1388	92.2%	84	5.6%	33	2.2%
282	1580	82.9%	326	17.1%	0	0.0%
283	344	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
291	368	95.1%	19	4.9%	0	0.0%
292	776	60.9%	499	39.1%	0	0.0%
293	195	98.5%	3	1.5%	0	0.0%
294	824	85.9%	135	14.1%	0	0.0%
301	3676	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
302	0	0.0%	0	0.0%	194	100.0%
303	572	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
304	53	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
305	992	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
311	1514	94.4%	76	4.7%	13	0.8%
312	.	.	.	.	.	.
321	440	92.2%	37	7.8%	0	0.0%
322	827	64.0%	465	36.0%	0	0.0%
331	1867	72.5%	708	27.5%	0	0.0%
332	512	99.6%	2	0.4%	0	0.0%
333	1999	68.3%	926	31.7%	0	0.0%
334	470	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
335	3413	70.4%	1434	29.6%	0	0.0%
336	1460	75.3%	480	24.7%	0	0.0%
337	192	94.1%	12	5.9%	0	0.0%
338	120	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
339	32	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

Nazionalità




Quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche

		Nazionalità			
		Svizzera		Altri	
		Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	52104	77.5%	15110	22.5%
	101	2506	78.7%	677	21.3%
	102	394	74.8%	133	25.2%
	103	144	77.4%	42	22.6%
	104	102	73.9%	36	26.1%
	105	584	85.5%	99	14.5%
	106	20	50.0%	20	50.0%
	111	588	82.2%	127	17.8%
	121	206	82.7%	43	17.3%
	122	220	88.0%	30	12.0%
	123	277	97.5%	7	2.5%
	124	99	90.8%	10	9.2%
	125	1082	86.6%	167	13.4%
	126	752	99.7%	2	0.3%
	127	1980	90.2%	215	9.8%
	128	145	93.5%	10	6.5%
	129	70	94.6%	4	5.4%
	131	506	71.4%	203	28.6%
	132	342	89.1%	42	10.9%
	133	2187	83.1%	445	16.9%
	134	59	100.0%	0	0.0%
	141	1576	81.7%	353	18.3%
	142	279	86.9%	42	13.1%
	143	112	79.4%	29	20.6%
	151	406	78.4%	112	21.6%
	152	2037	68.9%	918	31.1%
	161	1645	77.7%	472	22.3%
	171	147	82.1%	32	17.9%
	172	2035	61.2%	1292	38.8%
	181	119	81.0%	28	19.0%
	191	1432	80.4%	350	19.6%
	192	398	99.5%	2	0.5%
	211	1889	77.6%	545	22.4%
	212	72	85.7%	12	14.3%
	221	947	74.2%	330	25.8%
	231	200	88.9%	25	11.1%

	Nazionalità			
	Svizzera		Altri	
	Numero	%	Numero	%
241	1494	72.7%	560	27.3%
242	914	72.4%	348	27.6%
251	466	71.1%	189	28.9%
261	1358	77.7%	390	22.3%
271	24	100.0%	0	0.0%
281	1234	82.0%	271	18.0%
282	1513	79.4%	393	20.6%
283	291	84.6%	53	15.4%
291	228	58.9%	159	41.1%
292	1033	81.0%	242	19.0%
293	142	71.7%	56	28.3%
294	626	65.3%	333	34.7%
301	2508	68.2%	1168	31.8%
302	172	88.7%	22	11.3%
303	457	79.9%	115	20.1%
304	46	86.8%	7	13.2%
305	655	66.0%	337	34.0%
311	1182	73.7%	421	26.3%
312	.	.	.	.
321	399	83.6%	78	16.4%
322	967	74.8%	325	25.2%
331	2345	91.1%	230	8.9%
332	406	79.0%	108	21.0%
333	2364	80.8%	561	19.2%
334	402	85.5%	68	14.5%
335	3483	71.9%	1364	28.1%
336	1576	81.2%	364	18.8%
337	144	70.6%	60	29.4%
338	86	71.7%	34	28.3%
339	32	100.0%	0	0.0%

Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa



Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)

		Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							
		nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	2834	13316	21105	2408	4617	3309	15626	3999
	101	188	578	1066	56	255	75	957	8
	102	22	130	280	11	29	32	23	0
	103	5	70	97	4	6	2	2	0
	104	7	67	60	2	1	1	0	0
	105	8	61	332	43	114	90	35	0
	106	0	0	1	1	0	0	0	38
	111	38	170	249	9	25	5	219	0
	121	3	64	92	2	4	7	77	0
	122	6	84	12	142	4	0	2	0
	123	5	47	129	11	45	13	34	0
	124	2	27	56	13	5	6	0	0
	125	36	205	607	56	162	146	37	0
	126	11	51	326	32	92	91	151	0
	127	107	319	923	35	195	43	568	5
	128	8	22	76	1	10	3	35	0
	129	6	22	28	8	5	2	2	1
	131	27	215	115	15	26	27	284	0
	132	0	62	294	5	16	7	0	0
	133	79	358	605	87	307	136	1060	0
	134	3	20	23	10	3	0	0	0
	141	91	602	693	55	310	98	80	0
	142	3	13	77	48	60	43	28	49
	143	0	0	0	0	0	0	0	141
	151	41	110	238	35	48	37	9	0
	152	95	671	743	178	165	188	915	0
	161	129	880	614	140	124	99	130	1
	171	0	174	2	0	0	1	0	2
	172	0	0	0	0	0	0	0	3327
	181	12	65	39	4	3	2	22	0
	191	105	372	545	33	256	57	414	0
	192	4	2	164	9	105	113	2	1
	211	105	453	704	35	40	46	1051	0
	212	1	13	53	6	3	8	0	0


	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							
	nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
221	63	287	277	40	59	38	513	0
231	3	52	81	4	9	9	18	49
241	38	397	852	28	85	52	597	5
242	59	249	530	22	71	33	298	0
251	35	122	216	17	28	19	214	4
261	138	528	725	20	71	42	224	0
271	0	0	7	0	14	2	1	0
281	72	316	684	58	105	68	163	39
282	121	450	730	71	97	58	379	0
283	5	47	191	24	37	40	0	0
291	2	50	104	72	49	108	2	0
292	65	640	380	87	55	48	0	0
293	4	105	33	9	26	18	3	0
294	7	377	263	62	143	71	15	21
301	209	577	529	171	121	200	1869	0
302	0	0	0	0	0	0	0	194
303	3	28	45	25	42	50	339	40
304	1	6	14	9	9	12	2	0
305	24	50	147	27	28	36	620	60
311	87	465	666	58	73	47	194	13
312	.	.	.	.	.	.	.	.
321	12	94	148	19	19	16	169	0
322	50	229	415	31	43	55	469	0
331	70	425	816	61	160	170	873	0
332	14	68	295	19	54	43	20	1
333	129	511	905	80	192	153	955	0
334	2	10	147	0	0	0	311	0
335	346	976	1706	222	405	372	820	0
336	112	248	806	70	186	154	364	0
337	10	41	86	6	9	15	37	0
338	4	33	52	3	8	0	20	0
339	2	8	12	7	1	2	0	0

Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)

		Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							
		nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%
Clinica	Totale	4%	20%	31%	4%	7%	5%	23%	6%
	101	6%	18%	33%	2%	8%	2%	30%	0%
	102	4%	25%	53%	2%	6%	6%	4%	0%
	103	3%	38%	52%	2%	3%	1%	1%	0%
	104	5%	49%	43%	1%	1%	1%	0%	0%
	105	1%	9%	49%	6%	17%	13%	5%	0%
	106	0%	0%	3%	3%	0%	0%	0%	95%
	111	5%	24%	35%	1%	3%	1%	31%	0%
	121	1%	26%	37%	1%	2%	3%	31%	0%
	122	2%	34%	5%	57%	2%	0%	1%	0%
	123	2%	17%	45%	4%	16%	5%	12%	0%
	124	2%	25%	51%	12%	5%	6%	0%	0%
	125	3%	16%	49%	4%	13%	12%	3%	0%
	126	1%	7%	43%	4%	12%	12%	20%	0%
	127	5%	15%	42%	2%	9%	2%	26%	0%
	128	5%	14%	49%	1%	6%	2%	23%	0%
	129	8%	30%	38%	11%	7%	3%	3%	1%
	131	4%	30%	16%	2%	4%	4%	40%	0%
	132	0%	16%	77%	1%	4%	2%	0%	0%
	133	3%	14%	23%	3%	12%	5%	40%	0%
	134	5%	34%	39%	17%	5%	0%	0%	0%
	141	5%	31%	36%	3%	16%	5%	4%	0%
	142	1%	4%	24%	15%	19%	13%	9%	15%
	143	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	151	8%	21%	46%	7%	9%	7%	2%	0%
	152	3%	23%	25%	6%	6%	6%	31%	0%
	161	6%	42%	29%	7%	6%	5%	6%	0%
	171	0%	97%	1%	0%	0%	1%	0%	1%
	172	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	181	8%	44%	27%	3%	2%	1%	15%	0%
	191	6%	21%	31%	2%	14%	3%	23%	0%
	192	1%	1%	41%	2%	26%	28%	1%	0%
	211	4%	19%	29%	1%	2%	2%	43%	0%

	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							
	nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%
212	1%	15%	63%	7%	4%	10%	0%	0%
221	5%	22%	22%	3%	5%	3%	40%	0%
231	1%	23%	36%	2%	4%	4%	8%	22%
241	2%	19%	41%	1%	4%	3%	29%	0%
242	5%	20%	42%	2%	6%	3%	24%	0%
251	5%	19%	33%	3%	4%	3%	33%	1%
261	8%	30%	41%	1%	4%	2%	13%	0%
271	0%	0%	29%	0%	58%	8%	4%	0%
281	5%	21%	45%	4%	7%	5%	11%	3%
282	6%	24%	38%	4%	5%	3%	20%	0%
283	1%	14%	56%	7%	11%	12%	0%	0%
291	1%	13%	27%	19%	13%	28%	1%	0%
292	5%	50%	30%	7%	4%	4%	0%	0%
293	2%	53%	17%	5%	13%	9%	2%	0%
294	1%	39%	27%	6%	15%	7%	2%	2%
301	6%	16%	14%	5%	3%	5%	51%	0%
302	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
303	1%	5%	8%	4%	7%	9%	59%	7%
304	2%	11%	26%	17%	17%	23%	4%	0%
305	2%	5%	15%	3%	3%	4%	63%	6%
311	5%	29%	42%	4%	5%	3%	12%	1%
312	.	.	.	.	.	.	.	.
321	3%	20%	31%	4%	4%	3%	35%	0%
322	4%	18%	32%	2%	3%	4%	36%	0%
331	3%	17%	32%	2%	6%	7%	34%	0%
332	3%	13%	57%	4%	11%	8%	4%	0%
333	4%	17%	31%	3%	7%	5%	33%	0%
334	0%	2%	31%	0%	0%	0%	66%	0%
335	7%	20%	35%	5%	8%	8%	17%	0%
336	6%	13%	42%	4%	10%	8%	19%	0%
337	5%	20%	42%	3%	4%	7%	18%	0%
338	3%	28%	43%	3%	7%	0%	17%	0%
339	6%	25%	38%	22%	3%	6%	0%	0%

Stato civile



Stato civile nelle cliniche (numero di casi)

		Stato civile						
		nubile/ celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	31126	16549	2653	3491	10438	2507	450
	101	1392	886	70	221	581	33	0
	102	152	238	11	23	103	0	0
	103	115	31	8	4	28	0	0
	104	122	9	1	1	5	0	0
	105	212	291	24	0	143	13	0
	106	8	18	2	0	3	5	4
	111	393	155	19	33	93	22	0
	121	138	48	9	15	39	0	0
	122	199	13	6	30	1	1	0
	123	129	118	7	5	25	0	0
	124	83	14	1	1	10	0	0
	125	547	409	64	67	159	3	0
	126	260	290	32	36	120	16	0
	127	882	501	75	103	323	306	5
	128	68	55	3	10	18	1	0
	129	52	11	2	1	7	0	1
	131	339	175	39	36	118	2	0
	132	158	79	21	10	116	0	0
	133	1380	546	82	88	341	195	0
	134	56	3	0	0	0	0	0
	141	845	524	68	137	347	8	0
	142	74	97	13	24	38	28	47
	143	0	0	0	0	0	0	141
	151	204	185	22	20	87	0	0
	152	1472	529	144	144	406	260	0
	161	923	576	115	114	366	22	1
	171	118	25	8	2	21	3	2
	172	1623	828	57	173	640	6	0
	181	67	37	8	6	26	3	0
	191	767	525	48	104	260	78	0
	192	105	163	14	2	75	41	0
	211	1211	547	9	99	458	110	0
	212	36	17	4	2	25	0	0


	Stato civile						
	nubile/ celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
221	515	388	0	88	236	50	0
231	121	72	6	7	16	3	0
241	1072	418	87	101	361	10	5
242	533	387	56	58	205	23	0
251	285	137	37	32	101	59	4
261	1253	248	15	74	158	0	0
271	7	11	0	1	4	1	0
281	797	360	70	35	187	30	26
282	831	480	59	122	320	94	0
283	147	105	23	13	56	0	0
291	149	137	17	35	49	0	0
292	693	270	43	49	220	0	0
293	49	83	15	17	34	0	0
294	351	346	86	46	128	2	0
301	1690	846	222	267	633	18	0
302	0	0	0	0	0	0	194
303	207	243	20	34	67	1	0
304	43	7	0	0	3	0	0
305	488	214	73	43	167	0	7
311	674	231	285	125	273	2	13
312	.	.	.	.	.	.	.
321	213	154	13	18	79	0	0
322	647	356	49	66	172	2	0
331	1021	592	30	267	74	591	0
332	190	123	37	5	157	2	0
333	1309	654	140	119	415	288	0
334	113	231	17	21	71	17	0
335	2623	887	173	245	884	35	0
336	790	541	76	88	334	111	0
337	78	69	12	4	32	9	0
338	79	13	6	0	19	3	0
339	28	3	0	0	1	0	0

Stato civile nelle cliniche (quota di casi)

		Stato civile						
		nubile/ celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%
Clinica	Totale	46%	25%	4%	5%	16%	4%	1%
	101	44%	28%	2%	7%	18%	1%	0%
	102	29%	45%	2%	4%	20%	0%	0%
	103	62%	17%	4%	2%	15%	0%	0%
	104	88%	7%	1%	1%	4%	0%	0%
	105	31%	43%	4%	0%	21%	2%	0%
	106	20%	45%	5%	0%	8%	13%	10%
	111	55%	22%	3%	5%	13%	3%	0%
	121	55%	19%	4%	6%	16%	0%	0%
	122	80%	5%	2%	12%	0%	0%	0%
	123	45%	42%	2%	2%	9%	0%	0%
	124	76%	13%	1%	1%	9%	0%	0%
	125	44%	33%	5%	5%	13%	0%	0%
	126	34%	38%	4%	5%	16%	2%	0%
	127	40%	23%	3%	5%	15%	14%	0%
	128	44%	35%	2%	6%	12%	1%	0%
	129	70%	15%	3%	1%	9%	0%	1%
	131	48%	25%	6%	5%	17%	0%	0%
	132	41%	21%	5%	3%	30%	0%	0%
	133	52%	21%	3%	3%	13%	7%	0%
	134	95%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
	141	44%	27%	4%	7%	18%	0%	0%
	142	23%	30%	4%	7%	12%	9%	15%
	143	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	151	39%	36%	4%	4%	17%	0%	0%
	152	50%	18%	5%	5%	14%	9%	0%
	161	44%	27%	5%	5%	17%	1%	0%
	171	66%	14%	4%	1%	12%	2%	1%
	172	49%	25%	2%	5%	19%	0%	0%
	181	46%	25%	5%	4%	18%	2%	0%
	191	43%	29%	3%	6%	15%	4%	0%
	192	26%	41%	4%	1%	19%	10%	0%
	211	50%	22%	0%	4%	19%	5%	0%
	212	43%	20%	5%	2%	30%	0%	0%

	Stato civile						
	nubile/ celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%
221	40%	30%	0%	7%	18%	4%	0%
231	54%	32%	3%	3%	7%	1%	0%
241	52%	20%	4%	5%	18%	0%	0%
242	42%	31%	4%	5%	16%	2%	0%
251	44%	21%	6%	5%	15%	9%	1%
261	72%	14%	1%	4%	9%	0%	0%
271	29%	46%	0%	4%	17%	4%	0%
281	53%	24%	5%	2%	12%	2%	2%
282	44%	25%	3%	6%	17%	5%	0%
283	43%	31%	7%	4%	16%	0%	0%
291	39%	35%	4%	9%	13%	0%	0%
292	54%	21%	3%	4%	17%	0%	0%
293	25%	42%	8%	9%	17%	0%	0%
294	37%	36%	9%	5%	13%	0%	0%
301	46%	23%	6%	7%	17%	0%	0%
302	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
303	36%	42%	3%	6%	12%	0%	0%
304	81%	13%	0%	0%	6%	0%	0%
305	49%	22%	7%	4%	17%	0%	1%
311	42%	14%	18%	8%	17%	0%	1%
312	.	.	.	.	.	.	.
321	45%	32%	3%	4%	17%	0%	0%
322	50%	28%	4%	5%	13%	0%	0%
331	40%	23%	1%	10%	3%	23%	0%
332	37%	24%	7%	1%	31%	0%	0%
333	45%	22%	5%	4%	14%	10%	0%
334	24%	49%	4%	4%	15%	4%	0%
335	54%	18%	4%	5%	18%	1%	0%
336	41%	28%	4%	5%	17%	6%	0%
337	38%	34%	6%	2%	16%	4%	0%
338	66%	11%	5%	0%	16%	3%	0%
339	88%	9%	0%	0%	3%	0%	0%

Occupazione prima dell'ammissione




Occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

		occupato a tempo parziale	occupato a tempo pieno	inoccupa- to o disoc- cupato	lavoro domestico nella propria economia domestica	in forma- zione (scuola, tirocinio, studio)	program- ma di riabilita- zione	AI/AVS o altra rendita	lavoro in ambito protetto	scono- sciuto
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	5632	8056	26494	13813	2619	716	21797	2426	7682
	101	277	377	927	202	76	8	1202	167	207
	102	101	67	157	48	18	2	128	10	1
	103	0	0	5	0	0	0	1	0	0
	104	10	10	86	1	24	0	7	3	1
	105	165	191	319	608	35	8	145	11	2
	106	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	111	33	88	149	24	29	1	345	57	64
	121	14	31	75	58	12	0	88	13	7
	122	10	25	168	1	3	10	9	23	2
	123	51	40	56	23	16	1	74	17	6
	124	14	22	34	4	14	0	19	3	0
	125	207	358	684	798	27	41	337	93	24
	126	144	193	171	62	25	4	198	15	29
	127	207	224	699	323	61	28	908	189	137
	128	30	26	38	7	2	0	41	12	3
	129	10	13	19	6	22	3	11	6	0
	131	36	93	224	9	14	6	259	23	96
	132	44	87	181	5	0	1	65	21	2
	133	280	255	706	81	85	10	904	64	466
	134	11	1	24	1	10	0	20	12	0
	141	157	242	608	308	73	36	889	165	19
	142	82	26	22	73	4	2	70	1	47
	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	151	83	52	180	25	32	5	163	20	3
	152	197	379	733	53	92	7	1043	71	354
	161	255	345	1442	77	67	24	672	51	74
	171	6	29	68	1	35	0	32	0	5
	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181	8	20	43	4	8	0	55	5	3
	191	191	247	500	107	87	8	664	53	78
	192	105	234	50	238	10	5	9	1	1

	occupato a tempo parziale	occupato a tempo pieno	inoccupa- to o disoc- cupato	lavoro domestico nella propria economia domestica	in forma- zione (scuola, tirocinio, studio)	program- ma di riabilita- zione	AI/AVS o altra rendita	lavoro in ambito protetto	scono- sciuto
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
211	119	233	518	54	99	15	796	0	0
212	7	24	42	0	2	1	8	0	0
221	59	59	119	119	213	213	19	19	1155
231	26	20	43	18	4	6	73	28	3
241	164	310	1545	258	60	6	795	62	756
242	111	170	457	213	22	4	496	25	99
251	37	89	154	14	18	2	287	43	30
261	191	295	1262	1162	76	40	876	241	28
271	5	5	2	2	2	0	7	0	3
281	182	220	508	97	79	13	428	47	37
282	188	258	1458	885	62	16	551	132	533
283	80	90	174	301	30	4	76	5	1
291	33	54	114	3	12	1	159	6	0
292	60	81	920	385	44	19	787	0	0
293	12	17	64	3	1	2	103	0	1
294	74	148	199	65	19	0	439	2	13
301	145	410	641	18	254	29	1633	18	488
302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	23	62	66	0	1	0	29	0	340
304	4	5	6	0	17	0	13	0	0
305	36	69	112	6	21	3	375	2	301
311	110	127	226	14	30	2	870	13	85
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	77	52	117	62	46	3	106	11	7
322	159	232	830	455	51	12	374	88	203
331	0	0	328	1555	142	22	968	164	300
332	59	151	301	333	12	0	67	22	117
333	204	264	2457	1629	167	28	1076	165	408
334	0	0	32	313	10	2	31	0	0
335	490	563	3776	1669	134	36	1397	168	909
336	207	326	1407	871	85	16	502	33	188
337	29	23	148	129	6	5	81	18	8
338	8	17	94	32	9	6	14	8	38
339	5	7	6	0	10	0	3	0	0

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione



Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

		Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
		domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento o ospedaliero o casa partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	45177	1007	1576	5552	1813	7251	263	2453	2095	27
	101	2129	99	122	366	58	202	8	146	47	6
	102	495	7	2	1	8	13	0	1	0	0
	103	57	0	0	0	120	4	3	1	1	0
	104	87	0	0	37	2	1	10	1	0	0
	105	658	1	0	1	8	3	1	6	5	0
	106	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	446	2	9	117	8	102	2	23	6	0
	121	197	1	4	15	9	13	0	8	2	0
	122	190	0	0	22	10	1	1	26	0	0
	123	201	2	1	10	32	6	0	3	29	0
	124	63	0	0	4	35	7	0	0	0	0
	125	1047	16	9	68	27	51	0	27	4	0
	126	646	9	1	10	44	32	0	10	2	0
	127	1035	93	55	275	61	473	4	93	101	5
	128	130	1	0	8	1	10	0	4	1	0
	129	68	0	0	2	2	2	0	0	0	0
	131	412	6	11	93	27	143	1	16	0	0
	132	233	0	0	9	98	42	0	2	0	0
	133	1802	85	71	287	37	97	8	111	134	0
	134	34	0	0	7	17	1	0	0	0	0
	141	1264	54	22	242	19	243	8	77	0	0
	142	291	0	0	1	3	22	0	4	0	0

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
	domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento o ospedaliero o casa partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
143	93	0	0	22	12	5	3	6	0	0
151	467	8	0	13	14	9	0	7	0	0
152	2262	15	36	178	12	116	1	115	220	0
161	1579	13	52	272	13	102	14	71	1	0
171	177	0	0	0	2	0	0	0	0	0
172	1063	39	77	186	22	1663	4	195	78	0
181	110	0	2	18	2	5	0	7	3	0
191	1410	44	28	136	10	79	8	54	13	0
192	397	0	0	0	1	0	0	2	0	0
211	1873	2	58	133	37	189	20	10	112	0
212	33	0	0	0	34	15	0	2	0	0
221	837	7	64	116	6	36	13	23	175	0
231	183	0	2	0	5	24	0	10	1	0
241	1021	6	53	128	16	255	17	58	500	0
242	949	19	12	121	16	77	5	49	14	0
251	479	6	7	72	19	44	1	21	6	0
261	1233	22	21	249	49	104	16	54	0	0
271	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	1240	22	12	49	40	63	3	55	5	16
282	1393	67	73	155	29	109	0	62	18	0
283	310	3	0	3	13	8	0	7	0	0
291	342	2	2	6	13	18	0	4	0	0
292	450	95	40	85	47	488	6	64	0	0
293	162	2	0	0	6	27	0	1	0	0

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
	domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento o ospedaliero o casa partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
294	790	0	2	25	22	110	0	9	1	0
301	1957	0	181	381	177	765	0	187	28	0
302	181	0	0	0	3	10	0	0	0	0
303	525	0	0	0	19	26	0	1	1	0
304	43	0	0	0	1	9	0	0	0	0
305	622	0	67	1	72	198	0	27	5	0
311	822	0	138	92	33	428	12	78	0	0
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	450	0	6	9	6	4	1	1	0	0
322	857	16	32	157	22	138	8	48	14	0
331	1751	59	65	253	52	120	15	120	140	0
332	435	0	1	6	34	14	1	21	2	0
333	2059	93	84	370	33	62	32	192	0	0
334	290	0	1	2	16	18	0	0	143	0
335	2926	72	105	583	230	326	23	305	277	0
336	1604	16	46	120	35	107	9	3	0	0
337	148	1	0	22	9	9	0	10	5	0
338	78	2	2	14	4	0	5	14	1	0
339	27	0	0	0	1	3	0	1	0	0


Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)

		Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
		domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero o casa per partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Clinica	Totale	67%	1%	2%	8%	3%	11%	0%	4%	3%	0%
	101	67%	3%	4%	11%	2%	6%	0%	5%	1%	0%
	102	94%	1%	0%	0%	2%	2%	0%	0%	0%	0%
	103	31%	0%	0%	0%	65%	2%	2%	1%	1%	0%
	104	63%	0%	0%	27%	1%	1%	7%	1%	0%	0%
	105	96%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
	106	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	111	62%	0%	1%	16%	1%	14%	0%	3%	1%	0%
	121	79%	0%	2%	6%	4%	5%	0%	3%	1%	0%
	122	76%	0%	0%	9%	4%	0%	0%	10%	0%	0%
	123	71%	1%	0%	4%	11%	2%	0%	1%	10%	0%
	124	58%	0%	0%	4%	32%	6%	0%	0%	0%	0%
	125	84%	1%	1%	5%	2%	4%	0%	2%	0%	0%
	126	86%	1%	0%	1%	6%	4%	0%	1%	0%	0%
	127	47%	4%	3%	13%	3%	22%	0%	4%	5%	0%
	128	84%	1%	0%	5%	1%	6%	0%	3%	1%	0%
	129	92%	0%	0%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%
	131	58%	1%	2%	13%	4%	20%	0%	2%	0%	0%
	132	61%	0%	0%	2%	26%	11%	0%	1%	0%	0%
	133	68%	3%	3%	11%	1%	4%	0%	4%	5%	0%
	134	58%	0%	0%	12%	29%	2%	0%	0%	0%	0%
	141	66%	3%	1%	13%	1%	13%	0%	4%	0%	0%
	142	91%	0%	0%	0%	1%	7%	0%	1%	0%	0%

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
	domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero o casa per partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
143	66%	0%	0%	16%	9%	4%	2%	4%	0%	0%
151	90%	2%	0%	3%	3%	2%	0%	1%	0%	0%
152	77%	1%	1%	6%	0%	4%	0%	4%	7%	0%
161	75%	1%	2%	13%	1%	5%	1%	3%	0%	0%
171	99%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
172	32%	1%	2%	6%	1%	50%	0%	6%	2%	0%
181	75%	0%	1%	12%	1%	3%	0%	5%	2%	0%
191	79%	2%	2%	8%	1%	4%	0%	3%	1%	0%
192	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
211	77%	0%	2%	5%	2%	8%	1%	0%	5%	0%
212	39%	0%	0%	0%	40%	18%	0%	2%	0%	0%
221	66%	1%	5%	9%	0%	3%	1%	2%	14%	0%
231	81%	0%	1%	0%	2%	11%	0%	4%	0%	0%
241	50%	0%	3%	6%	1%	12%	1%	3%	24%	0%
242	75%	2%	1%	10%	1%	6%	0%	4%	1%	0%
251	73%	1%	1%	11%	3%	7%	0%	3%	1%	0%
261	71%	1%	1%	14%	3%	6%	1%	3%	0%	0%
271	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
281	82%	1%	1%	3%	3%	4%	0%	4%	0%	1%
282	73%	4%	4%	8%	2%	6%	0%	3%	1%	0%
283	90%	1%	0%	1%	4%	2%	0%	2%	0%	0%
291	88%	1%	1%	2%	3%	5%	0%	1%	0%	0%
292	35%	7%	3%	7%	4%	38%	0%	5%	0%	0%
293	82%	1%	0%	0%	3%	14%	0%	1%	0%	0%

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
	domicilio	domicilio con assistenza SPITEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario non ospedaliero	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero o casa per partorienti	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
294	82%	0%	0%	3%	2%	11%	0%	1%	0%	0%
301	53%	0%	5%	10%	5%	21%	0%	5%	1%	0%
302	93%	0%	0%	0%	2%	5%	0%	0%	0%	0%
303	92%	0%	0%	0%	3%	5%	0%	0%	0%	0%
304	81%	0%	0%	0%	2%	17%	0%	0%	0%	0%
305	63%	0%	7%	0%	7%	20%	0%	3%	1%	0%
311	51%	0%	9%	6%	2%	27%	1%	5%	0%	0%
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	94%	0%	1%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
322	66%	1%	2%	12%	2%	11%	1%	4%	1%	0%
331	68%	2%	3%	10%	2%	5%	1%	5%	5%	0%
332	85%	0%	0%	1%	7%	3%	0%	4%	0%	0%
333	70%	3%	3%	13%	1%	2%	1%	7%	0%	0%
334	62%	0%	0%	0%	3%	4%	0%	0%	30%	0%
335	60%	1%	2%	12%	5%	7%	0%	6%	6%	0%
336	83%	1%	2%	6%	2%	6%	0%	0%	0%	0%
337	73%	0%	0%	11%	4%	4%	0%	5%	2%	0%
338	65%	2%	2%	12%	3%	0%	4%	12%	1%	0%
339	84%	0%	0%	0%	3%	9%	0%	3%	0%	0%

Classe




Classe nelle cliniche

		Classe									
		Indicazione mancata		sconosciuto		privata		semiprivata		comune	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	287	0.4%	240	0.4%	1865	2.8%	3091	4.6%	61731	91.8%
	101	0	0.0%	7	0.2%	59	1.9%	135	4.2%	2982	93.7%
	102	0	0.0%	0	0.0%	19	3.6%	51	9.7%	457	86.7%
	103	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	186	100.0%
	104	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	137	99.3%
	105	0	0.0%	0	0.0%	86	12.6%	177	25.9%	420	61.5%
	106	0	0.0%	0	0.0%	4	10.0%	9	22.5%	27	67.5%
	111	0	0.0%	0	0.0%	10	1.4%	27	3.8%	678	94.8%
	121	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.6%	245	98.4%
	122	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	250	100.0%
	123	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	14	4.9%	269	94.7%
	124	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	109	100.0%
	125	0	0.0%	0	0.0%	60	4.8%	159	12.7%	1030	82.5%
	126	0	0.0%	0	0.0%	35	4.6%	175	23.2%	544	72.1%
	127	5	0.2%	3	0.1%	1	0.0%	39	1.8%	2147	97.8%
	128	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.2%	150	96.8%
	129	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	23.0%	57	77.0%
	131	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	709	100.0%
	132	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	384	100.0%
	133	0	0.0%	45	1.7%	41	1.6%	114	4.3%	2432	92.4%
	134	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	100.0%
	141	0	0.0%	0	0.0%	32	1.7%	98	5.1%	1799	93.3%
	142	0	0.0%	0	0.0%	15	4.7%	48	15.0%	258	80.4%
	143	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	141	100.0%
	151	0	0.0%	0	0.0%	11	2.1%	41	7.9%	466	90.0%
	152	0	0.0%	0	0.0%	115	3.9%	131	4.4%	2709	91.7%
	161	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2117	100.0%
	171	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	179	100.0%
	172	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	3326	100.0%
	181	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	146	99.3%
	191	0	0.0%	12	0.7%	40	2.2%	102	5.7%	1628	91.4%
	192	0	0.0%	0	0.0%	36	9.0%	94	23.5%	270	67.5%
	211	0	0.0%	110	4.5%	0	0.0%	2	0.1%	2322	95.4%
	212	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	100.0%
	221	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.1%	1275	99.8%
	231	0	0.0%	0	0.0%	6	2.7%	11	4.9%	208	92.4%

	Classe									
	Indicazione mancata		sconosciuto		privata		semiprivata		comune	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
241	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2054	100.0%
242	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1262	100.0%
251	0	0.0%	0	0.0%	8	1.2%	28	4.3%	619	94.5%
261	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1748	100.0%
271	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	3	12.5%	19	79.2%
281	282	18.7%	4	0.3%	22	1.5%	66	4.4%	1131	75.1%
282	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1904	99.9%
283	0	0.0%	0	0.0%	21	6.1%	72	20.9%	251	73.0%
291	0	0.0%	0	0.0%	196	50.6%	27	7.0%	164	42.4%
292	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1275	100.0%
293	0	0.0%	0	0.0%	14	7.1%	9	4.5%	175	88.4%
294	0	0.0%	0	0.0%	62	6.5%	49	5.1%	848	88.4%
301	0	0.0%	1	0.0%	3	0.1%	45	1.2%	3627	98.7%
302	0	0.0%	0	0.0%	34	17.5%	77	39.7%	83	42.8%
303	0	0.0%	22	3.8%	145	25.3%	207	36.2%	198	34.6%
304	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	100.0%
305	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	992	100.0%
311	0	0.0%	0	0.0%	10	0.6%	0	0.0%	1593	99.4%
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	0	0.0%	0	0.0%	12	2.5%	45	9.4%	420	88.1%
322	0	0.0%	0	0.0%	19	1.5%	67	5.2%	1206	93.3%
331	0	0.0%	0	0.0%	228	8.9%	216	8.4%	2131	82.8%
332	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	514	100.0%
333	0	0.0%	0	0.0%	40	1.4%	98	3.4%	2787	95.3%
334	0	0.0%	0	0.0%	206	43.8%	264	56.2%	0	0.0%
335	0	0.0%	0	0.0%	100	2.1%	141	2.9%	4606	95.0%
336	0	0.0%	0	0.0%	161	8.3%	218	11.2%	1561	80.5%
337	0	0.0%	34	16.7%	6	2.9%	4	2.0%	160	78.4%
338	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	120	100.0%
339	0	0.0%	0	0.0%	2	6.3%	0	0.0%	30	93.8%

Istanza ricoverante



Istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)

		Istanza ricoverante								
		Pazien- te stes- so, fami- liare	Servizio di soc- corso	Medico	Terapi- sta non medico	Servizio socio- sanitario	Autorità giudizia- rie	Altro	Scono- sciuto	Indica- zione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
Clinica	Totale	12964	1005	49838	626	403	337	855	1165	21
	101	765	19	2284	20	2	21	64	8	0
	102	27	0	488	7	1	0	4	0	0
	103	0	0	182	0	0	3	0	1	0
	104	2	0	126	0	0	10	0	0	0
	105	23	0	609	28	2	0	4	17	0
	106	13	0	26	1	0	0	0	0	0
	111	339	18	338	3	3	4	8	2	0
	121	22	0	223	0	0	1	2	1	0
	122	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	14	0	266	2	0	0	1	1	0
	124	0	0	107	0	0	0	2	0	0
	125	55	1	1169	12	2	1	9	0	0
	126	10	1	733	6	0	0	1	3	0
	127	103	1	2037	4	7	1	32	5	5
	128	11	0	141	2	0	0	1	0	0
	129	3	0	69	2	0	0	0	0	0
	131	143	0	542	9	2	11	2	0	0
	132	80	0	264	7	21	0	12	0	0
	133	209	16	2219	21	9	7	114	37	0
	134	0	0	59	0	0	0	0	0	0
	141	222	11	1601	36	30	6	23	0	0
	142	2	0	319	0	0	0	0	0	0
	143	52	0	24	1	58	2	4	0	0
	151	8	0	484	23	2	0	1	0	0
	152	1300	397	1154	14	7	4	31	48	0
	161	385	58	1590	9	5	41	28	1	0
	171	0	0	179	0	0	0	0	0	0
	172	14	0	3225	0	0	13	6	69	0
	181	61	2	77	3	0	0	1	3	0
	191	370	21	1137	6	7	14	66	161	0
	192	0	0	395	4	1	0	0	0	0

	Istanza ricoverante								
	Pazien- te stes- so, fami- liare	Servizio di soc- corso	Medico	Terapi- sta non medico	Servizio socio- sanitario	Autorità giudizia- rie	Altro	Scono- sciuto	Indica- zione mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
211	72	0	2233	0	0	6	13	110	0
212	0	0	79	0	5	0	0	0	0
221	83	0	1047	0	2	5	16	124	0
231	77	4	137	0	0	5	2	0	0
241	529	11	1450	3	6	29	22	4	0
242	438	4	778	11	4	3	23	1	0
251	246	16	378	7	1	2	2	3	0
261	341	6	1268	87	5	6	33	2	0
271	2	0	22	0	0	0	0	0	0
281	127	29	1220	60	12	3	35	3	16
282	650	17	1107	10	12	6	94	10	0
283	23	0	320	1	0	0	0	0	0
291	91	3	282	5	5	0	1	0	0
292	408	76	682	4	84	6	15	0	0
293	1	0	195	1	0	0	1	0	0
294	27	9	913	1	3	2	4	0	0
301	571	0	2828	3	0	3	14	257	0
302	0	0	194	0	0	0	0	0	0
303	21	0	549	0	0	0	0	2	0
304	0	0	53	0	0	0	0	0	0
305	68	0	828	0	0	22	38	36	0
311	231	16	1302	36	4	3	11	0	0
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	78	4	357	20	12	2	4	0	0
322	189	3	1059	16	12	2	11	0	0
331	521	139	1648	30	23	20	22	172	0
332	443	0	64	1	2	3	1	0	0
333	913	19	1875	44	15	29	30	0	0
334	29	0	360	3	0	0	0	78	0
335	1752	100	2892	21	28	28	26	0	0
336	358	4	1514	32	4	10	17	1	0
337	77	0	105	10	4	0	3	5	0
338	113	0	3	0	1	3	0	0	0
339	2	0	29	0	0	0	1	0	0

Istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)

		Istanza ricoverante								
		Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Clinica	Totale	19%	1%	74%	1%	1%	1%	1%	2%	0%
	101	24%	1%	72%	1%	0%	1%	2%	0%	0%
	102	5%	0%	93%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
	103	0%	0%	98%	0%	0%	2%	0%	1%	0%
	104	1%	0%	91%	0%	0%	7%	0%	0%	0%
	105	3%	0%	89%	4%	0%	0%	1%	2%	0%
	106	33%	0%	65%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
	111	47%	3%	47%	0%	0%	1%	1%	0%	0%
	121	9%	0%	90%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
	122	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	123	5%	0%	94%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	124	0%	0%	98%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
	125	4%	0%	94%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
	126	1%	0%	97%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	127	5%	0%	93%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
	128	7%	0%	91%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
	129	4%	0%	93%	3%	0%	0%	0%	0%	0%
	131	20%	0%	76%	1%	0%	2%	0%	0%	0%
	132	21%	0%	69%	2%	5%	0%	3%	0%	0%
	133	8%	1%	84%	1%	0%	0%	4%	1%	0%
	134	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	141	12%	1%	83%	2%	2%	0%	1%	0%	0%
	142	1%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	143	37%	0%	17%	1%	41%	1%	3%	0%	0%
	151	2%	0%	93%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
	152	44%	13%	39%	0%	0%	0%	1%	2%	0%
	161	18%	3%	75%	0%	0%	2%	1%	0%	0%
	171	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	172	0%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
	181	41%	1%	52%	2%	0%	0%	1%	2%	0%
	191	21%	1%	64%	0%	0%	1%	4%	9%	0%
	192	0%	0%	99%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	211	3%	0%	92%	0%	0%	0%	1%	5%	0%

	Istanza ricoverante								
	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
212	0%	0%	94%	0%	6%	0%	0%	0%	0%
221	6%	0%	82%	0%	0%	0%	1%	10%	0%
231	34%	2%	61%	0%	0%	2%	1%	0%	0%
241	26%	1%	71%	0%	0%	1%	1%	0%	0%
242	35%	0%	62%	1%	0%	0%	2%	0%	0%
251	38%	2%	58%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
261	20%	0%	73%	5%	0%	0%	2%	0%	0%
271	8%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
281	8%	2%	81%	4%	1%	0%	2%	0%	1%
282	34%	1%	58%	1%	1%	0%	5%	1%	0%
283	7%	0%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
291	24%	1%	73%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
292	32%	6%	53%	0%	7%	0%	1%	0%	0%
293	1%	0%	98%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
294	3%	1%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
301	16%	0%	77%	0%	0%	0%	0%	7%	0%
302	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
303	4%	0%	96%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
304	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
305	7%	0%	83%	0%	0%	2%	4%	4%	0%
311	14%	1%	81%	2%	0%	0%	1%	0%	0%
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	16%	1%	75%	4%	3%	0%	1%	0%	0%
322	15%	0%	82%	1%	1%	0%	1%	0%	0%
331	20%	5%	64%	1%	1%	1%	1%	7%	0%
332	86%	0%	12%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
333	31%	1%	64%	2%	1%	1%	1%	0%	0%
334	6%	0%	77%	1%	0%	0%	0%	17%	0%
335	36%	2%	60%	0%	1%	1%	1%	0%	0%
336	18%	0%	78%	2%	0%	1%	1%	0%	0%
337	38%	0%	51%	5%	2%	0%	1%	2%	0%
338	94%	0%	3%	0%	1%	3%	0%	0%	0%
339	6%	0%	91%	0%	0%	0%	3%	0%	0%

Durata della degenza

Durata della degenza nelle cliniche

		Durata della degenza (calcolata in base alla definizione di SwissDRG)								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25%	Mediana	Percentile 75%	Massimo	N valide	Man-cante
Clinica	Totale	32	37	-1	8	22	45	821	67210	4
	101	30	32	0	8	20	43	423	3183	0
	102	44	22	1	27	41	55	145	527	0
	103	92	62	1	50	78	140	252	186	0
	104	25	20	0	14	20	28	133	138	0
	105	46	15	1	40	48	56	84	683	0
	106	18	4	0	18	20	20	26	40	0
	111	31	41	0	6	17	44	562	715	0
	121	32	23	0	14	29	44	118	249	0
	122	31	26	0	11	24	45	143	250	0
	123	45	17	1	35	48	57	91	284	0
	124	98	64	2	58	87	118	288	109	0
	125	49	34	0	24	48	68	416	1249	0
	126	38	19	1	25	38	50	155	754	0
	127	36	48	0	8	21	47	650	2195	0
	128	31	19	1	15	30	43	84	155	0
	129	58	26	1	48	61	78	111	74	0
	131	24	24	1	9	18	32	188	709	0
	132	61	36	1	27	63	91	196	384	0
	133	28	43	0	6	17	37	806	2632	0
	134	53	26	4	32	57	75	96	59	0
	141	35	45	0	8	21	45	491	1929	0
	142	42	26	3	20	40	59	151	321	0
	143	33	32	0	13	26	44	208	141	0
	151	46	23	0	34	46	57	146	518	0
	152	28	33	0	4	17	41	381	2955	0
	161	28	38	0	7	17	32	483	2117	0
	171	50	71	0	14	30	57	638	179	0
	172	26	48	-1	6	12	24	563	3327	0
	181	20	23	1	5	13	28	142	147	0
	191	35	53	0	10	23	45	821	1782	0
	192	39	9	4	34	40	43	68	400	0
	211	33	41	0	7	20	47	556	2434	0

	Durata della degenza (calcolata in base alla definizione di SwissDRG)								
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25%	Mediana	Percentile 75%	Massimo	N valide	Man-cante
212	81	32	1	69	98	98	126	84	0
221	27	26	0	9	20	35	255	1277	0
231	30	33	0	8	17	38	198	225	0
241	36	46	-1	7	22	48	523	2052	2
242	41	45	0	12	28	53	440	1262	0
251	33	42	1	7	18	39	366	655	0
261	21	23	1	6	13	31	207	1748	0
271	24	12	2	17	25	31	48	24	0
281	37	25	1	17	36	56	271	1505	0
282	36	39	0	7	24	50	300	1906	0
283	57	25	1	43	57	71	142	344	0
291	35	34	1	12	28	46	302	387	0
292	32	38	0	8	21	42	405	1275	0
293	40	28	1	20	33	53	175	198	0
294	32	27	1	14	26	45	209	959	0
301	28	31	0	9	19	36	559	3676	0
302	23	14	1	14	20	31	100	194	0
303	32	26	0	14	27	46	203	572	0
304	71	53	4	16	59	109	173	53	0
305	24	37	0	5	12	28	379	992	0
311	26	36	0	6	14	30	363	1603	0
312	.	.	.	.	.	.	.	.	.
321	52	41	1	21	44	74	275	477	0
322	32	34	0	8	24	45	356	1292	0
331	30	26	0	8	23	44	245	2575	0
332	65	46	1	28	59	92	331	514	0
333	23	27	0	5	11	33	198	2925	0
334	48	21	0	34	49	62	128	470	0
335	27	30	0	5	18	39	256	4847	0
336	31	27	0	10	24	48	210	1940	0
337	36	29	0	13	30	55	135	203	1
338	31	32	0	9	21	43	174	119	1
339	89	58	1	34	93	142	187	32	0

Degenze di breve durata



Quota di degenze di breve durata (<= 7 giorni) nelle cliniche


		Degenza di breve durata			
		Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
		Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	51222	76.2%	15992	23.8%
	101	2431	76.4%	752	23.6%
	102	518	98.3%	9	1.7%
	103	173	93.0%	13	7.0%
	104	119	86.2%	19	13.8%
	105	671	98.2%	12	1.8%
	106	39	97.5%	1	2.5%
	111	501	70.1%	214	29.9%
	121	216	86.7%	33	13.3%
	122	206	82.4%	44	17.6%
	123	269	94.7%	15	5.3%
	124	107	98.2%	2	1.8%
	125	1126	90.2%	123	9.8%
	126	711	94.3%	43	5.7%
	127	1676	76.4%	519	23.6%
	128	141	91.0%	14	9.0%
	129	69	93.2%	5	6.8%
	131	558	78.7%	151	21.3%
	132	368	95.8%	16	4.2%
	133	1853	70.4%	779	29.6%
	134	56	94.9%	3	5.1%
	141	1484	76.9%	445	23.1%
	142	306	95.3%	15	4.7%
	143	121	85.8%	20	14.2%
	151	488	94.2%	30	5.8%
	152	1915	64.8%	1040	35.2%
	161	1587	75.0%	530	25.0%
	171	153	85.5%	26	14.5%
	172	2253	67.7%	1074	32.3%
	181	95	64.6%	52	35.4%
	191	1419	79.6%	363	20.4%
	192	399	99.8%	1	0.3%
	211	1775	72.9%	659	27.1%
	212	78	92.9%	6	7.1%
	221	999	78.2%	278	21.8%

	Degenza di breve durata			
	Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
	Numero	%	Numero	%
231	173	76.9%	52	23.1%
241	1491	72.6%	563	27.4%
242	1053	83.4%	209	16.6%
251	485	74.0%	170	26.0%
261	1210	69.2%	538	30.8%
271	20	83.3%	4	16.7%
281	1320	87.7%	185	12.3%
282	1419	74.4%	487	25.6%
283	335	97.4%	9	2.6%
291	322	83.2%	65	16.8%
292	965	75.7%	310	24.3%
293	185	93.4%	13	6.6%
294	819	85.4%	140	14.6%
301	2860	77.8%	816	22.2%
302	174	89.7%	20	10.3%
303	490	85.7%	82	14.3%
304	50	94.3%	3	5.7%
305	629	63.4%	363	36.6%
311	1112	69.4%	491	30.6%
312	.	.	.	.
321	417	87.4%	60	12.6%
322	983	76.1%	309	23.9%
331	1980	76.9%	595	23.1%
332	479	93.2%	35	6.8%
333	1748	59.8%	1177	40.2%
334	459	97.7%	11	2.3%
335	3294	68.0%	1553	32.0%
336	1575	81.2%	365	18.8%
337	171	83.8%	33	16.2%
338	96	80.0%	24	20.0%
339	28	87.5%	4	12.5%

Casi esclusi

Casi esclusi (HoNOS)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), HoNOS drop-outs e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.




Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

		Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (HoNOS)			
		validi		esclusi	
		Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	44111	65.6%	23103	34.4%
	101	1912	60.1%	1271	39.9%
	102	491	93.2%	36	6.8%
	103	172	92.5%	14	7.5%
	104	119	86.2%	19	13.8%
	105	656	96.0%	27	4.0%
	106	38	95.0%	2	5.0%
	111	498	69.7%	217	30.3%
	121	166	66.7%	83	33.3%
	122	204	81.6%	46	18.4%
	123	263	92.6%	21	7.4%
	124	104	95.4%	5	4.6%
	125	1116	89.4%	133	10.6%
	126	701	93.0%	53	7.0%
	127	1493	68.0%	702	32.0%
	128	129	83.2%	26	16.8%
	129	67	90.5%	7	9.5%
	131	448	63.2%	261	36.8%
	132	366	95.3%	18	4.7%
	133	1344	51.1%	1288	48.9%
	134	56	94.9%	3	5.1%
	141	1390	72.1%	539	27.9%
	142	191	59.5%	130	40.5%
	143	104	73.8%	37	26.2%
	151	486	93.8%	32	6.2%
	152	1768	59.8%	1187	40.2%
	161	1400	66.1%	717	33.9%
	171	44	24.6%	135	75.4%
	172	1358	40.8%	1969	59.2%
	181	93	63.3%	54	36.7%
	191	1224	68.7%	558	31.3%
	192	389	97.3%	11	2.8%
	211	1489	61.2%	945	38.8%
	212	76	90.5%	8	9.5%
	221	961	75.3%	316	24.7%

	Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (HoNOS)			
	validi		esclusi	
	Numero	%	Numero	%
231	125	55.6%	100	44.4%
241	1357	66.1%	697	33.9%
242	988	78.3%	274	21.7%
251	476	72.7%	179	27.3%
261	560	32.0%	1188	68.0%
271	19	79.2%	5	20.8%
281	1275	84.7%	230	15.3%
282	1397	73.3%	509	26.7%
283	334	97.1%	10	2.9%
291	321	82.9%	66	17.1%
292	898	70.4%	377	29.6%
293	185	93.4%	13	6.6%
294	799	83.3%	160	16.7%
301	1918	52.2%	1758	47.8%
302	40	20.6%	154	79.4%
303	365	63.8%	207	36.2%
304	40	75.5%	13	24.5%
305	399	40.2%	593	59.8%
311	891	55.6%	712	44.4%
312	.	.	.	.
321	404	84.7%	73	15.3%
322	948	73.4%	344	26.6%
331	1940	75.3%	635	24.7%
332	478	93.0%	36	7.0%
333	1368	46.8%	1557	53.2%
334	419	89.1%	51	10.9%
335	3083	63.6%	1764	36.4%
336	1514	78.0%	426	22.0%
337	141	69.1%	63	30.9%
338	86	71.7%	34	28.3%
339	27	84.4%	5	15.6%

Casi esclusi (BSCL)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), BSCL drop-outs e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.



Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)

		Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (BSCL)			
		validi		esclusi	
		Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	19610	29.2%	47604	70.8%
	101	516	16.2%	2667	83.8%
	102	409	77.6%	118	22.4%
	103	106	57.0%	80	43.0%
	104	97	70.3%	41	29.7%
	105	560	82.0%	123	18.0%
	106	0	0.0%	40	100.0%
	111	293	41.0%	422	59.0%
	121	133	53.4%	116	46.6%
	122	120	48.0%	130	52.0%
	123	199	70.1%	85	29.9%
	124	87	79.8%	22	20.2%
	125	740	59.2%	509	40.8%
	126	343	45.5%	411	54.5%
	127	354	16.1%	1841	83.9%
	128	47	30.3%	108	69.7%
	129	33	44.6%	41	55.4%
	131	192	27.1%	517	72.9%
	132	271	70.6%	113	29.4%
	133	488	18.5%	2144	81.5%
	134	43	72.9%	16	27.1%
	141	530	27.5%	1399	72.5%
	142	202	62.9%	119	37.1%
	143	91	64.5%	50	35.5%
	151	387	74.7%	131	25.3%
	152	709	24.0%	2246	76.0%
	161	690	32.6%	1427	67.4%
	171	32	17.9%	147	82.1%
	172	626	18.8%	2701	81.2%
	181	30	20.4%	117	79.6%
	191	599	33.6%	1183	66.4%
	192	360	90.0%	40	10.0%
	211	379	15.6%	2055	84.4%
	212	65	77.4%	19	22.6%
	221	444	34.8%	833	65.2%

	Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (BSCL)			
	validi		esclusi	
	Numero	%	Numero	%
231	60	26.7%	165	73.3%
241	580	28.2%	1474	71.8%
242	480	38.0%	782	62.0%
251	205	31.3%	450	68.7%
261	399	22.8%	1349	77.2%
271	19	79.2%	5	20.8%
281	843	56.0%	662	44.0%
282	564	29.6%	1342	70.4%
283	284	82.6%	60	17.4%
291	264	68.2%	123	31.8%
292	319	25.0%	956	75.0%
293	124	62.6%	74	37.4%
294	444	46.3%	515	53.7%
301	309	8.4%	3367	91.6%
302	59	30.4%	135	69.6%
303	278	48.6%	294	51.4%
304	22	41.5%	31	58.5%
305	105	10.6%	887	89.4%
311	322	20.1%	1281	79.9%
312	.	.	.	.
321	229	48.0%	248	52.0%
322	400	31.0%	892	69.0%
331	927	36.0%	1648	64.0%
332	368	71.6%	146	28.4%
333	343	11.7%	2582	88.3%
334	230	48.9%	240	51.1%
335	540	11.1%	4307	88.9%
336	580	29.9%	1360	70.1%
337	49	24.0%	155	76.0%
338	70	58.3%	50	41.7%
339	19	59.4%	13	40.6%

Casi esclusi (misure restrittive della libertà)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure il valore HoNOS all'ammissione) sono esclusi dai confronti tra cliniche.



Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (MRL)

		Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (MRL)			
		validi		esclusi	
		Numero	%	Numero	%
Clinica anonimizzata N°	Totale	51421	89,6%	5985	10,4%
	03	2533	79,6%	650	20,4%
	06	710	99,3%	5	0,7%
	07	633	89,3%	76	10,7%
	08	2074	78,8%	558	21,2%
	12	744	98,7%	10	1,3%
	13	1985	90,4%	210	9,6%
	17	1227	98,2%	22	1,8%
	18	171	68,7%	78	31,3%
	21	1822	94,5%	107	5,5%
	22	2661	90,1%	294	9,9%
	24	2016	95,2%	101	4,8%
	27	135	91,8%	12	8,2%
	28	1703	95,6%	79	4,4%
	30	2032	83,5%	402	16,5%
	32	1241	97,2%	36	2,8%
	33	222	98,7%	3	1,3%
	34	1217	96,4%	45	3,6%
	35	1983	96,5%	71	3,5%
	36	652	99,5%	3	0,5%
	37	931	53,3%	817	46,7%
	39	1896	99,5%	10	0,5%
	40	1459	96,9%	46	3,1%
	42	937	97,7%	22	2,3%
	43	1224	96,0%	51	4,0%
	44	387	100,0%	0	0,0%
	46	3070	83,5%	606	16,5%
	48	932	94,0%	60	6,0%
	49	1391	86,8%	212	13,2%
	50	469	98,3%	8	1,7%
	51	1234	95,5%	58	4,5%
	52	4283	88,4%	564	11,6%
	54	2384	81,5%	541	18,5%
	56	2542	98,7%	33	1,3%
	58	1872	96,5%	68	3,5%
	59	176	86,3%	28	13,7%
	63	473	82,7%	99	17,3%

A2. Risultato delle misure

Valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS

		Residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	44111	.00	.00	-0.009	0.009
	101	1912	-.03	.02	-0.076	0.021
	102	491	-.28	.03	-0.341	-0.211
	103	172	.09	.08	-0.060	0.235
	104	119	.26	.06	0.153	0.373
	105	656	-.15	.03	-0.219	-0.085
	106	38	.28	.06	0.162	0.398
	111	498	.05	.04	-0.024	0.128
	121	166	-.35	.07	-0.491	-0.208
	122	204	-.90	.05	-1.003	-0.805
	123	263	.23	.05	0.123	0.327
	124	104	.26	.13	0.014	0.508
	125	1116	-.18	.03	-0.246	-0.111
	126	701	-.06	.03	-0.128	0.001
	127	1493	.03	.03	-0.025	0.078
	128	129	-.03	.06	-0.148	0.095
	129	67	.52	.12	0.284	0.753
	131	448	.25	.04	0.172	0.320
	132	366	.01	.05	-0.081	0.106
	133	1344	.03	.03	-0.026	0.081
	134	56	-.07	.17	-0.393	0.262
	141	1390	.00	.03	-0.052	0.047
	142	191	.09	.05	-0.003	0.190
	143	104	.18	.09	0.004	0.361
	151	486	-.14	.03	-0.208	-0.071
	152	1768	.11	.03	0.057	0.163
	161	1400	.40	.03	0.348	0.446
	171	44	.85	.14	0.584	1.119
	172	1358	.18	.02	0.137	0.215
	181	93	.96	.09	0.770	1.142
	191	1224	.09	.03	0.037	0.147
	192	389	-.32	.04	-0.397	-0.237

	Residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)				
	Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
211	1489	-.17	.03	-0.233	-0.115
212	76	.28	.07	0.152	0.414
221	961	.50	.03	0.444	0.553
231	125	-.06	.06	-0.188	0.062
241	1357	-.13	.03	-0.181	-0.075
242	988	.17	.03	0.114	0.216
251	476	.03	.04	-0.039	0.103
261	560	.47	.03	0.422	0.524
271 *	19	.07	.15	.	.
281	1275	-.10	.03	-0.152	-0.049
282	1397	-.06	.03	-0.127	0.007
283	334	-.02	.05	-0.130	0.080
291	321	.52	.04	0.447	0.588
292	898	.38	.04	0.296	0.461
293	185	-.05	.06	-0.165	0.068
294	799	.17	.03	0.110	0.224
301	1918	.18	.02	0.141	0.224
302	40	.10	.12	-0.138	0.328
303	365	.13	.04	0.056	0.200
304	40	.12	.11	-0.100	0.345
305	399	.19	.05	0.092	0.281
311	891	-.15	.04	-0.222	-0.080
312 *	.	.	.	.	.
321	404	-.22	.04	-0.303	-0.133
322	948	.10	.03	0.044	0.160
331	1940	.10	.02	0.057	0.142
332	478	-.07	.04	-0.149	0.005
333	1368	-.10	.02	-0.148	-0.050
334	419	.10	.03	0.039	0.164
335	3083	-.61	.02	-0.644	-0.571
336	1514	.00	.02	-0.045	0.043
337	141	-.79	.08	-0.950	-0.621
338	86	-.38	.10	-0.585	-0.183
339 *	27	-.12	.14	.	.
* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.					

Test di significatività residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)

Clinica	Valore test = 0 (HoNOS valore differenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	superiore
101	-1.095	1911	.274	-.02713	-.1088	.0545
102	-8.303	490	.000	-.27625	-.3864	-.1661
103	1.168	171	.244	.08775	-.1638	.3393
104	4.681	118	.000	.26296	.0734	.4525
105	-4.426	655	.000	-.15207	-.2656	-.0385
106	4.653	37	.000	.28014	.0650	.4953
111	1.331	497	.184	.05176	-.0769	.1804
121	-4.844	165	.000	-.34946	-.5912	-.1078
122	-17.889	203	.000	-.90360	-1.0723	-.7349
123	4.333	262	.000	.22517	.0522	.3981
124	2.072	103	.041	.26094	-.1657	.6875
125	-5.154	1115	.000	-.17849	-.2928	-.0642
126	-1.928	700	.054	-.06326	-.1717	.0452
127	1.015	1492	.310	.02675	-.0602	.1137
128	-.423	128	.673	-.02627	-.2352	.1827
129	4.335	66	.000	.51842	.1065	.9303
131	6.528	447	.000	.24575	.1210	.3705
132	.268	365	.789	.01278	-.1455	.1711
133	1.009	1343	.313	.02742	-.0622	.1170
134	-.391	55	.697	-.06534	-.6465	.5158
141	-.096	1389	.923	-.00244	-.0862	.0813
142	1.893	190	.060	.09316	-.0713	.2576
143	2.008	103	.047	.18257	-.1255	.4906
151	-4.007	485	.000	-.13962	-.2550	-.0243
152	4.094	1767	.000	.11003	.0215	.1986
161	15.865	1399	.000	.39674	.3143	.4792
171	6.242	43	.000	.85136	.3696	1.3331
172	8.789	1357	.000	.17612	.1100	.2422
181	10.072	92	.000	.95633	.6335	1.2791
191	3.289	1223	.001	.09193	-.0003	.1841
192	-7.786	388	.000	-.31725	-.4524	-.1821
211	-5.806	1488	.000	-.17387	-.2726	-.0751
212	4.240	75	.000	.28279	.0544	.5112
221	17.924	960	.000	.49890	.4070	.5908
231	-.991	124	.323	-.06314	-.2778	.1516
241	-4.724	1356	.000	-.12824	-.2178	-.0387
242	6.347	987	.000	.16516	.0793	.2511

Clinica	Valore test = 0 (HoNOS valore differenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	superiore
251	.895	475	.371	.03236	-.0874	.1521
261	18.174	559	.000	.47261	.3866	.5586
271 *	.	.	.	.	.	.
281	-3.806	1274	.000	-.10021	-.1871	-.0134
282	-1.749	1396	.080	-.05996	-.1730	.0531
283	-.461	333	.645	-.02472	-.2027	.1533
291	14.357	320	.000	.51758	.3978	.6373
292	9.012	897	.000	.37831	.2397	.5169
293	-.823	184	.411	-.04893	-.2477	.1499
294	5.777	798	.000	.16703	.0715	.2625
301	8.675	1917	.000	.18234	.1131	.2516
302	.802	39	.427	.09532	-.3275	.5182
303	3.465	364	.001	.12783	.0054	.2502
304	1.077	39	.288	.12231	-.2818	.5264
305	3.877	398	.000	.18645	.0270	.3459
311	-4.166	890	.000	-.15124	-.2711	-.0314
312 *	.	.	.	.	.	.
321	-4.999	403	.000	-.21797	-.3625	-.0734
322	3.441	947	.001	.10188	.0041	.1996
331	4.607	1939	.000	.09951	.0283	.1707
332	-1.845	477	.066	-.07231	-.2021	.0575
333	-3.965	1367	.000	-.09878	-.1809	-.0166
334	3.186	418	.002	.10183	-.0041	.2077
335	-32.642	3082	.000	-.60706	-.6683	-.5458
336	-.043	1513	.966	-.00097	-.0746	.0726
337	-9.356	140	.000	-.78580	-1.0681	-.5035
338	-3.745	85	.000	-.38389	-.7333	-.0345
339 *	.	.	.	.	.	.
* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.						

Autovalutazione: valore differenza BSCL

		Residuo standardizzato (valore differenza BSCL)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	19610	.00	.01	-0.014	0.014
	101	516	.03	.04	-0.051	0.120
	102	409	-.44	.06	-0.552	-0.333
	103	106	.11	.06	0.000	0.222
	104	97	.05	.08	-0.097	0.201
	105	560	-.14	.04	-0.216	-0.065
	106 *	0	.	.	.	.
	111	293	-.01	.07	-0.140	0.127
	121	133	.18	.09	0.000	0.363
	122	120	.03	.06	-0.095	0.159
	123	199	.11	.06	-0.011	0.227
	124	87	.09	.11	-0.118	0.304
	125	740	.08	.03	0.020	0.150
	126	343	-.03	.05	-0.122	0.068
	127	354	.22	.05	0.119	0.329
	128	47	.06	.11	-0.159	0.286
	129	33	-.06	.22	-0.503	0.379
	131	192	.20	.06	0.077	0.330
	132	271	-.06	.05	-0.145	0.034
	133	488	-.12	.05	-0.207	-0.025
	134	43	.05	.16	-0.265	0.370
	141	530	.15	.04	0.069	0.233
	142	202	.49	.05	0.398	0.590
	143	91	.07	.06	-0.043	0.186
	151	387	-.29	.05	-0.388	-0.187
	152	709	-.06	.04	-0.131	0.021
	161	690	.09	.04	0.020	0.159
	171	32	.11	.13	-0.137	0.359
	172	626	.03	.04	-0.055	0.109
	181	30	.16	.16	-0.155	0.472
	191	599	.15	.04	0.079	0.230
	192	360	-.01	.04	-0.090	0.074
	211	379	.15	.05	0.053	0.256
	212	65	-.06	.07	-0.204	0.083
	221	444	.18	.05	0.073	0.282

	Residuo standardizzato (valore differenza BSCL)				
	Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
231	60	.07	.13	-0.180	0.327
241	580	-.03	.05	-0.123	0.062
242	480	.13	.04	0.039	0.214
251	205	.04	.07	-0.101	0.186
261	399	.21	.04	0.132	0.294
271 *	19	.13	.11	.	.
281	843	-.14	.03	-0.204	-0.085
282	564	-.17	.04	-0.251	-0.092
283	284	-.05	.06	-0.173	0.066
291	264	.00	.06	-0.114	0.114
292	319	-.07	.07	-0.198	0.061
293	124	-.27	.10	-0.461	-0.080
294	444	.00	.06	-0.109	0.110
301	309	.12	.06	0.007	0.238
302	59	.10	.10	-0.087	0.290
303	278	.14	.06	0.014	0.258
304 *	22	.21	.18	.	.
305	105	.03	.11	-0.190	0.256
311	322	.13	.07	-0.001	0.259
312 *	.	.	.	.	.
321	229	-.09	.08	-0.242	0.066
322	400	.12	.05	0.029	0.219
331	927	-.10	.04	-0.168	-0.030
332	368	-.13	.04	-0.200	-0.056
333	343	-.14	.06	-0.251	-0.029
334	230	.11	.07	-0.033	0.245
335	540	-.06	.04	-0.141	0.012
336	580	-.16	.04	-0.246	-0.073
337	49	.14	.16	-0.173	0.458
338	70	-.03	.09	-0.209	0.153
339 *	19	-.54	.15	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Test di significatività residuo standardizzato (valore differenza BSCL)

Clinica	Valore test = 0 (BSCL valore differenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
101	.793	515	.428	.03448	-.1094	.1783
102	-7.944	408	.000	-.44265	-.6273	-.2579
103	1.958	105	.053	.11101	-.0810	.3030
104	.679	96	.499	.05169	-.2066	.3100
105	-3.649	559	.000	-.14043	-.2677	-.0131
106 *	.	.	.	.	.	.
111	-.099	292	.922	-.00671	-.2329	.2195
121	1.962	132	.052	.18143	-.1299	.4927
122	.490	119	.625	.03176	-.1869	.2504
123	1.782	198	.076	.10791	-.0943	.3101
124	.866	86	.389	.09329	-.2737	.4603
125	2.558	739	.011	.08489	-.0248	.1945
126	-.552	342	.581	-.02684	-.1883	.1346
127	4.195	353	.000	.22405	.0468	.4013
128	.562	46	.577	.06372	-.3349	.4624
129	-.276	32	.784	-.06214	-.8769	.7526
131	3.148	191	.002	.20312	-.0126	.4188
132	-1.205	270	.229	-.05503	-.2070	.0969
133	-2.501	487	.013	-.11627	-.2702	.0377
134	.323	42	.748	.05244	-.5210	.6259
141	3.596	529	.000	.15085	.0120	.2897
142	10.044	201	.000	.49400	.3297	.6583
143	1.219	90	.226	.07120	-.1275	.2699
151	-5.599	386	.000	-.28745	-.4577	-.1172
152	-1.426	708	.154	-.05501	-.1824	.0724
161	2.525	689	.012	.08939	-.0276	.2064
171	.880	31	.386	.11133	-.3485	.5711
172	.643	625	.521	.02687	-.1114	.1651
181	.990	29	.330	.15855	-.4274	.7445
191	4.020	598	.000	.15485	.0275	.2822
192	-.193	359	.847	-.00805	-.1461	.1300
211	2.984	378	.003	.15423	-.0172	.3257
212	-.828	64	.410	-.06063	-.3131	.1918
221	3.337	443	.001	.17762	.0013	.3539
231	.570	59	.571	.07370	-.3740	.5214
241	-.639	579	.523	-.03013	-.1861	.1258
242	2.844	479	.005	.12643	-.0208	.2736

Clinica	Valore test = 0 (BSCL valore differenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
251	.586	204	.559	.04289	-.2016	.2874
261	5.143	398	.000	.21282	.0756	.3500
271 *	.	.	.	.	.	.
281	-4.775	842	.000	-.14482	-.2450	-.0447
282	-4.223	563	.000	-.17121	-.3053	-.0371
283	-.877	283	.381	-.05361	-.2569	.1497
291	.003	263	.998	.00018	-.1938	.1942
292	-1.033	318	.303	-.06819	-.2875	.1511
293	-2.778	123	.006	-.27042	-.5986	.0578
294	.012	443	.990	.00067	-.1842	.1856
301	2.071	308	.039	.12223	-.0739	.3184
302	1.057	58	.295	.10171	-.2319	.4353
303	2.184	277	.030	.13593	-.0710	.3429
304 *	.	.	.	.	.	.
305	.293	104	.770	.03336	-.3519	.4186
311	1.952	321	.052	.12902	-.0905	.3485
312 *	.	.	.	.	.	.
321	-1.122	228	.263	-.08825	-.3504	.1739
322	2.564	399	.011	.12394	-.0363	.2842
331	-2.817	926	.005	-.09929	-.2157	.0171
332	-3.493	367	.001	-.12841	-.2503	-.0065
333	-2.480	342	.014	-.13993	-.3272	.0474
334	1.495	229	.136	.10623	-.1306	.3430
335	-1.660	539	.097	-.06467	-.1935	.0642
336	-3.597	579	.000	-.15950	-.3061	-.0129
337	.886	48	.380	.14267	-.4219	.7072
338	-.305	69	.761	-.02818	-.3459	.2896
339 *	.	.	.	.	.	.
* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.						

Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti

		Residuo standardizzato (Misure restrittive della libertà – quota di casi affetti)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	51421	-.01	.00	-0.016	0.001
	03	2533	.13	.02	0.080	0.173
	06	710	-.04	.03	-0.104	0.014
	07	633	.30	.06	0.187	0.407
	08	2074	-.06	.02	-0.094	-0.021
	12	744	-.12	.02	-0.160	-0.074
	13	1985	-.06	.02	-0.102	-0.028
	17	1227	-.08	.02	-0.117	-0.047
	18	171	-.21	.02	-0.241	-0.175
	21	1822	.02	.02	-0.025	0.070
	22	2661	-.10	.01	-0.129	-0.077
	24	2016	.27	.03	0.205	0.327
	27	135	-.17	.01	-0.194	-0.148
	28	1703	.16	.03	0.099	0.219
	30	2032	.00	.03	-0.046	0.054
	32	1241	-.07	.02	-0.112	-0.021
	33	222	-.09	.05	-0.182	0.003
	34	1217	.16	.04	0.086	0.225
	35	1983	-.10	.02	-0.134	-0.069
	36	652	.07	.04	-0.007	0.154
	37	931	.42	.05	0.324	0.519
	39	1896	-.07	.02	-0.103	-0.030
	40	1459	-.03	.03	-0.075	0.023
	42	937	-.09	.02	-0.139	-0.050
	43	1224	-.06	.03	-0.116	-0.010
	44	387	-.10	.03	-0.156	-0.044
	46	3070	-.04	.02	-0.071	-0.007
	48	932	.18	.04	0.089	0.263
	49	1391	-.10	.02	-0.141	-0.057
	50	469	-.12	.03	-0.175	-0.071
	51	1234	-.01	.03	-0.064	0.035
	52	4283	-.16	.01	-0.179	-0.142
	54	2384	.09	.02	0.046	0.130
	56	2542	-.03	.02	-0.064	0.008
	58	1872	-.05	.02	-0.087	-0.015
	59	176	-.17	.03	-0.222	-0.113
	63	473	-.12	.02	-0.161	-0.073

Test di significatività residuo standardizzato
(Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti)

Clinica	Valore test = 0 (Misure restrittive della libertà – quota di casi affetti)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	5.356	2532	.000	.12641	.0487	.2042
06	-1.484	709	.138	-.04499	-.1452	.0552
07	5.297	632	.000	.29708	.1117	.4825
08	-3.113	2073	.002	-.05794	-.1193	.0034
12	-5.309	743	.000	-.11705	-.1899	-.0442
13	-3.444	1984	.001	-.06480	-.1268	-.0028
17	-4.588	1226	.000	-.08176	-.1405	-.0230
18	-12.310	170	.000	-.20818	-.2648	-.1515
21	.919	1821	.358	.02239	-.0579	.1027
22	-7.730	2660	.000	-.10329	-.1473	-.0593
24	8.563	2015	.000	.26594	.1636	.3683
27	-14.706	134	.000	-.17100	-.2101	-.1319
28	5.172	1702	.000	.15878	.0576	.2600
30	.149	2031	.881	.00383	-.0807	.0884
32	-2.861	1240	.004	-.06647	-.1431	.0102
33	-1.905	221	.058	-.08985	-.2472	.0675
34	4.395	1216	.000	.15538	.0388	.2720
35	-6.156	1982	.000	-.10147	-.1558	-.0472
36	1.784	651	.075	.07352	-.0627	.2098
37	8.436	930	.000	.42143	.2565	.5863
39	-3.556	1895	.000	-.06665	-.1284	-.0049
40	-1.041	1458	.298	-.02613	-.1089	.0567
42	-4.162	936	.000	-.09444	-.1694	-.0195
43	-2.339	1223	.020	-.06322	-.1524	.0259
44	-3.519	386	.000	-.10017	-.1946	-.0058
46	-2.410	3069	.016	-.03935	-.0931	.0144
48	3.970	931	.000	.17611	.0297	.3226
49	-4.596	1390	.000	-.09904	-.1701	-.0280
50	-4.628	468	.000	-.12300	-.2110	-.0350
51	-.592	1233	.554	-.01492	-.0981	.0683
52	-16.969	4282	.000	-.16077	-.1920	-.1296
54	4.101	2383	.000	.08763	.0172	.1580
56	-1.524	2541	.128	-.02783	-.0880	.0323
58	-2.783	1871	.005	-.05100	-.1114	.0094
59	-6.060	175	.000	-.16746	-.2599	-.0750
63	-5.224	472	.000	-.11687	-.1910	-.0428

Misure restrittive della libertà: isolamento (intensità)

		Residuo standardizzato (isolamento: intensità)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	2893	.00	.02	-0.036	0.036
	03	148	-.09	.05	-0.190	0.001
	06	43	-.20	.05	-0.295	-0.102
	07	67	.39	.17	0.064	0.721
	08	118	-.10	.08	-0.250	0.056
	12 *	4	.77	.35	.	.
	13	83	.30	.13	0.049	0.550
	17	55	-.17	.05	-0.275	-0.073
	18 *	0	.	.	.	.
	21	132	-.30	.03	-0.368	-0.242
	22	53	.01	.06	-0.106	0.120
	24	183	.12	.05	0.033	0.213
	27 *	0	.	.	.	.
	28	146	-.09	.03	-0.160	-0.025
	30	131	.07	.08	-0.094	0.228
	32	46	.10	.14	-0.177	0.372
	33 *	0	.	.	.	.
	34	131	-.09	.03	-0.150	-0.021
	35	127	-.05	.12	-0.297	0.191
	36	70	.08	.13	-0.173	0.329
	37	142	.07	.06	-0.055	0.196
	39	89	.47	.37	-0.265	1.199
	40	61	.05	.07	-0.080	0.178
	42 *	0	.	.	.	.
	43 *	0	.	.	.	.
	44 *	7	1.67	.69	.	.
	46	108	.17	.06	0.045	0.290
	48	51	.41	.15	0.122	0.702
	49 *	0	.	.	.	.
	50 *	5	-.27	.12	.	.
	51	119	-.14	.04	-0.218	-0.055
	52	176	-.28	.02	-0.312	-0.251
	54	286	.09	.06	-0.032	0.217
	56	194	-.12	.02	-0.167	-0.083
	58	110	-.23	.02	-0.271	-0.189
	59 *	2	1.43	.57	.	.
	63 *	6	.26	.37	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Test di significatività residuo standardizzato: isolamento (intensità)

Clinica	Valore test = 0 (isolamento (intensità))					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-1.937	147	.055	-.09467	-.2588	.0694
06	-4.030	42	.000	-.19850	-.3727	-.0243
07	2.343	66	.022	.39273	-.1846	.9701
08	-1.245	117	.216	-.09695	-.3599	.1660
12 *	.	.	.	.	.	.
13	2.344	82	.022	.29949	-.1366	.7356
17	-3.388	54	.001	-.17410	-.3529	.0047
18 *	.	.	.	.	.	.
21	-9.512	131	.000	-.30477	-.4126	-.1969
22	0.124	52	.902	.00716	-.1943	.2087
24	2.683	182	.008	.12282	-.0303	.2759
27 *	.	.	.	.	.	.
28	-2.678	145	.008	-.09266	-.2089	.0236
30	0.812	130	.418	.06673	-.2100	.3435
32	0.697	45	.489	.09763	-.3954	.5907
33 *	.	.	.	.	.	.
34	-2.588	130	.011	-.08526	-.1962	.0256
35	-.428	126	.669	-.05324	-.4724	.3659
36	.608	69	.545	.07784	-.3623	.5180
37	1.101	141	.273	.07040	-.1446	.2854
39	1.250	88	.215	.46703	-.8047	1.7388
40	.750	60	.456	.04938	-.1783	.2771
42 *	.	.	.	.	.	.
43 *	.	.	.	.	.	.
44 *	.	.	.	.	.	.
46	2.677	107	.009	.16759	-.0442	.3794
48	2.784	50	.008	.41194	-.1054	.9293
49 *	.	.	.	.	.	.
50 *	.	.	.	.	.	.
51	-3.293	118	.001	-.13675	-.2769	.0034
52	-18.171	175	.000	-.28190	-.3338	-.2300
54	1.457	285	.146	.09245	-.1185	.3034
56	-5.775	193	.000	-.12499	-.1973	-.0527
58	-10.990	109	.000	-.23034	-.3012	-.1595
59 *	.	.	.	.	.	.
63 *	.	.	.	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità)

		Residuo standardizzato (immobilizzazione: intensità)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	505	.00	.04	-0.083	0.083
	03	106	-.11	.05	-0.209	-0.020
	06 *	0	.	.	.	.
	07 *	1	.33	.	.	.
	08 *	26	.06	.13	.	.
	12 *	0	.	.	.	.
	13	68	.08	.08	-0.077	0.241
	17 *	24	-.12	.09	.	.
	18 *	0	.	.	.	.
	21 *	7	-.36	.15	.	.
	22 *	0	.	.	.	.
	24 *	24	-.07	.16	.	.
	27 *	0	.	.	.	.
	28 *	15	.45	.58	.	.
	30 *	11	.15	.28	.	.
	32 *	0	.	.	.	.
	33 *	5	-.18	.13	.	.
	34	55	-.14	.06	-0.249	-0.033
	35	74	.03	.13	-0.235	0.293
	36 *	5	.28	.23	.	.
	37 *	3	.55	.30	.	.
	39 *	15	.03	.27	.	.
	40 *	0	.	.	.	.
	42 *	21	-.07	.09	.	.
	43 *	1	.97	.	.	.
	44 *	0	.	.	.	.
	46 *	1	.84	.	.	.
	48 *	0	.	.	.	.
	49 *	0	.	.	.	.
	50 *	8	-.05	.09	.	.
	51 *	10	-.46	.19	.	.
	52 *	13	-.01	.07	.	.
	54 *	6	-.12	.20	.	.
	56 *	2	5.83	6.11	.	.
	58 *	4	.03	.09	.	.
	59 *	0	.	.	.	.
	63 *	0	.	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Test di significatività residuo standardizzato: immobilizzazione (intensità)

Clinica	Valore test = 0 (immobilizzazione: intensità)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-2.376	105	.019	-.11435	-.2773	.0486
06 *	.	.	.	.	.	.
07 *	.	.	.	.	.	.
08 *	.	.	.	.	.	.
12 *	.	.	.	.	.	.
13	1.008	67	.317	.08172	-.1972	.3607
17 *	.	.	.	.	.	.
18 *	.	.	.	.	.	.
21 *	.	.	.	.	.	.
22 *	.	.	.	.	.	.
24 *	.	.	.	.	.	.
27 *	.	.	.	.	.	.
28 *	.	.	.	.	.	.
30 *	.	.	.	.	.	.
32 *	.	.	.	.	.	.
33 *	.	.	.	.	.	.
34	-2.566	54	.013	-.14114	-.3325	.0503
35	0.216	73	.829	.02916	-.4332	.4916
36 *	.	.	.	.	.	.
37 *	.	.	.	.	.	.
39 *	.	.	.	.	.	.
40 *	.	.	.	.	.	.
42 *	.	.	.	.	.	.
43 *	.	.	.	.	.	.
44 *	.	.	.	.	.	.
46 *	.	.	.	.	.	.
48 *	.	.	.	.	.	.
49 *	.	.	.	.	.	.
50 *	.	.	.	.	.	.
51 *	.	.	.	.	.	.
52 *	.	.	.	.	.	.
54 *	.	.	.	.	.	.
56 *	.	.	.	.	.	.
58 *	.	.	.	.	.	.
59 *	.	.	.	.	.	.
63 *	.	.	.	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza)

		Residuo standardizzato (medicazione forzata: frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1476	.00	.03	-0.050	0.050
	03	91	-.11	.04	-0.182	-0.038
	06 *	13	-.28	.13	.	.
	07 *	26	-.18	.07	.	.
	08	73	-.13	.04	-0.217	-0.042
	12 *	1	-1.73	.	.	.
	13 *	28	-.13	.05	.	.
	17	39	-.22	.05	-0.322	-0.126
	18 *	1	-.05	.	.	.
	21	74	-.07	.07	-0.201	0.065
	22 *	26	-.15	.05	.	.
	24	80	-.05	.04	-0.133	0.028
	27 *	1	-.10	.	.	.
	28	80	-.12	.05	-0.223	-0.027
	30	50	-.09	.06	-0.209	0.035
	32 *	24	-.18	.06	.	.
	33 *	9	-.21	.06	.	.
	34	49	-.07	.08	-0.227	0.094
	35	71	-.04	.04	-0.115	0.033
	36 *	21	.12	.18	.	.
	37 *	20	-.10	.05	.	.
	39	59	-.14	.04	-0.227	-0.057
	40 *	14	-.03	.06	.	.
	42	38	-.04	.07	-0.181	0.091
	43	87	.11	.06	-0.004	0.228
	44 *	0	.	.	.	.
	46	43	.00	.09	-0.172	0.167
	48	48	1.30	.32	0.680	1.920
	49	51	-.07	.04	-0.156	0.017
	50 *	1	2.81	.	.	.
	51 *	26	-.18	.05	.	.
	52	115	.11	.17	-0.234	0.444
	54	72	.32	.30	-0.258	0.904
	56	79	-.08	.05	-0.171	0.009
	58	64	-.05	.08	-0.212	0.107
	59 *	1	-.15	.	.	.
	63 *	1	-.42	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Test di significatività residuo standardizzato: medicazione forzata (frequenza)

Clinica	Valore test = 0 (medicazione forzata: frequenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-3.005	90	.003	-.11023	-.2350	.0146
06 *	.	.	.	.	.	.
07 *	.	.	.	.	.	.
08	-2.907	72	.005	-0.12964	-.2826	0.0233
12 *	.	.	.	.	.	.
13 *	.	.	.	.	.	.
17	-4.484	38	.000	-0.22404	-.4022	-0.0459
18 *	.	.	.	.	.	.
21	-1.000	73	.320	-0.06784	-.3004	0.1647
22 *	.	.	.	.	.	.
24	-1.272	79	.207	-0.05231	-.1928	0.0882
27 *	.	.	.	.	.	.
28	-2.497	79	.015	-0.12468	-.2953	0.0460
30	-1.401	49	.167	-0.08698	-.3043	0.1303
32 *	.	.	.	.	.	.
33 *	.	.	.	.	.	.
34	-0.810	48	.422	-0.06627	-.3530	0.2204
35	-1.078	70	.285	-0.04075	-.1706	0.0891
36 *	.	.	.	.	.	.
37 *	.	.	.	.	.	.
39	-3.291	58	.002	-0.14199	-.2916	0.0076
40 *	.	.	.	.	.	.
42	-0.645	37	.523	-0.04491	-.2936	0.2038
43	1.891	86	.062	0.11189	-.0897	0.3135
44 *	.	.	.	.	.	.
46	-0.029	42	.977	-0.00250	-.3080	0.3030
48	4.108	47	.000	1.30007	.1892	2.4109
49	-1.577	50	.121	-0.06973	-.2243	0.0849
50 *	.	.	.	.	.	.
51 *	.	.	.	.	.	.
52	0.609	114	.544	0.10519	-.4787	0.6891
54	1.089	71	.280	0.32276	-.6949	1.3404
56	-1.772	78	.080	-0.08136	-.2383	0.0756
58	-0.643	63	.522	-0.05240	-.3335	0.2287
59 *	.	.	.	.	.	.
63 *	.	.	.	.	.	.
* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività						

**Misure restrittive della libertà:
restrizione della libertà di movimento (frequenza)**

		Residuo standardizzato (restrizione della libertà di movimento: frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	598	.00	.04	-0.077	0.077
	03	84	.22	.12	-0.015	0.456
	06 *	5	-.29	.14	.	.
	07 *	15	.18	.22	.	.
	08 *	5	-.62	.11	.	.
	12 *	0	.	.	.	.
	13	44	-.38	.09	-0.545	-0.210
	17 *	1	.62	.	.	.
	18 *	0	.	.	.	.
	21 *	0	.	.	.	.
	22	38	.18	.27	-0.343	0.696
	24	47	.16	.17	-0.169	0.488
	27 *	0	.	.	.	.
	28	94	-.23	.04	-0.318	-0.151
	30 *	5	-.40	.26	.	.
	32 *	14	.42	.30	.	.
	33 *	0	.	.	.	.
	34 *	21	-.33	.07	.	.
	35	49	-.06	.08	-0.226	0.100
	36 *	5	-.09	.09	.	.
	37 *	23	.47	.16	.	.
	39	66	-.39	.03	-0.453	-0.324
	40 *	0	.	.	.	.
	42 *	4	-.49	.17	.	.
	43 *	0	.	.	.	.
	44 *	5	.12	.21	.	.
	46 *	1	-.92	.	.	.
	48 *	16	1.40	.55	.	.
	49 *	0	.	.	.	.
	50 *	0	.	.	.	.
	51 *	17	.73	.27	.	.
	52 *	18	-.01	.17	.	.
	54 *	0	.	.	.	.
	56 *	21	-.18	.11	.	.
	58 *	0	.	.	.	.
	59 *	0	.	.	.	.
	63 *	0	.	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($N < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

**Test di significatività residuo standardizzato:
restrizione della libertà di movimento (frequenza)**

Clinica	Valore test = 0 (restrizione della libertà di movimento: frequenza)					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	1.832	83	.071	.22027	-.1899	.6305
06 *	.	.	.	.	.	.
07 *	.	.	.	.	.	.
08 *	.	.	.	.	.	.
12 *	.	.	.	.	.	.
13	-4.423	43	.000	-.37771	-.6793	-0.0761
17 *	.	.	.	.	.	.
18 *	.	.	.	.	.	.
21 *	.	.	.	.	.	.
22	.666	37	.510	.17661	-.7712	1.1244
24	.954	46	.345	.15967	-.4289	0.7482
27 *	.	.	.	.	.	.
28	-5.508	93	.000	-.23444	-.3791	-0.0898
30 *	.	.	.	.	.	.
32 *	.	.	.	.	.	.
33 *	.	.	.	.	.	.
34 *	.	.	.	.	.	.
35	-.755	48	.454	-.06280	-.3543	0.2287
36 *	.	.	.	.	.	.
37 *	.	.	.	.	.	.
39	-11.851	65	.000	-.38843	-.5014	-0.2755
40 *	.	.	.	.	.	.
42 *	.	.	.	.	.	.
43 *	.	.	.	.	.	.
44 *	.	.	.	.	.	.
46 *	.	.	.	.	.	.
48 *	.	.	.	.	.	.
49 *	.	.	.	.	.	.
50 *	.	.	.	.	.	.
51 *	.	.	.	.	.	.
52 *	.	.	.	.	.	.
54 *	.	.	.	.	.	.
56 *	.	.	.	.	.	.
58 *	.	.	.	.	.	.
59 *	.	.	.	.	.	.
63 *	.	.	.	.	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

A3.Qualità dati

Qualità dati HoNOS totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi)

		Quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
		Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
Clini-	Totale	100,0%	38,8%	26,8%	23,8%	4,0%	1,8%	4,8%
ca	101	100,0%	35,3%	24,8%	23,6%	14,6%	1,6%	0,1%
	102	100,0%	75,3%	17,8%	1,7%	4,9%	0,2%	0,0%
	103	100,0%	38,7%	53,8%	7,0%	0,5%	0,0%	0,0%
	104	100,0%	86,2%	0,0%	13,8%	0,0%	0,0%	0,0%
	105	100,0%	85,2%	10,8%	1,8%	1,8%	0,0%	0,4%
	106	100,0%	0,0%	95,0%	2,5%	0,0%	2,5%	0,0%
	111	100,0%	46,0%	23,6%	29,9%	0,1%	0,3%	0,0%
	121	100,0%	0,0%	66,7%	13,3%	12,9%	0,4%	6,8%
	122	100,0%	76,4%	5,2%	17,6%	0,8%	0,0%	0,0%
	123	100,0%	62,3%	30,3%	5,3%	1,4%	0,7%	0,0%
	124	100,0%	0,0%	95,4%	1,8%	2,8%	0,0%	0,0%
	125	100,0%	79,3%	10,1%	9,8%	0,4%	0,4%	0,0%
	126	100,0%	63,7%	29,3%	5,7%	0,4%	0,4%	0,5%
	127	100,0%	24,6%	43,4%	23,6%	0,8%	2,6%	4,9%
	128	100,0%	46,5%	36,8%	9,0%	7,7%	0,0%	0,0%
	129	100,0%	87,8%	2,7%	6,8%	1,4%	0,0%	1,4%
	131	100,0%	31,5%	31,7%	21,3%	0,1%	3,1%	12,3%
	132	100,0%	93,2%	2,1%	4,2%	0,5%	0,0%	0,0%
	133	100,0%	23,4%	27,6%	29,6%	0,6%	1,7%	17,1%
	134	100,0%	88,1%	6,8%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%
	141	100,0%	43,5%	28,6%	23,1%	0,8%	2,7%	1,3%
	142	100,0%	43,3%	16,2%	4,7%	14,0%	0,3%	21,5%
	143	100,0%	0,0%	73,8%	14,2%	4,3%	3,5%	4,3%
	151	100,0%	92,5%	1,4%	5,8%	0,4%	0,0%	0,0%
	152	100,0%	33,3%	26,5%	35,2%	2,6%	2,3%	0,0%
	161	100,0%	51,0%	15,2%	25,0%	1,4%	1,3%	6,2%
	171	100,0%	19,0%	5,6%	14,5%	0,0%	2,8%	58,1%
	172	100,0%	0,0%	40,8%	32,3%	0,5%	2,3%	24,1%
	181	100,0%	51,0%	12,2%	35,4%	0,7%	0,7%	0,0%
	191	100,0%	44,7%	24,0%	20,4%	10,5%	0,0%	0,4%
	192	100,0%	85,3%	12,0%	0,3%	1,5%	0,0%	1,0%

	Quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
	Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
211	100,0%	27,3%	33,9%	27,1%	8,2%	3,3%	0,2%
212	100,0%	84,5%	6,0%	7,1%	2,4%	0,0%	0,0%
221	100,0%	25,9%	49,3%	21,8%	0,7%	1,3%	1,0%
231	100,0%	41,3%	14,2%	23,1%	8,0%	0,4%	12,9%
241	100,0%	29,6%	36,5%	27,4%	4,5%	2,0%	0,0%
242	100,0%	49,6%	28,7%	16,6%	1,1%	1,5%	2,5%
251	100,0%	44,1%	28,5%	26,0%	1,4%	0,0%	0,0%
261	100,0%	18,2%	13,8%	30,8%	0,0%	0,5%	36,7%
271	100,0%	75,0%	4,2%	16,7%	4,2%	0,0%	0,0%
281	100,0%	51,9%	32,8%	12,3%	1,3%	1,2%	0,5%
282	100,0%	50,1%	23,2%	25,6%	0,7%	0,3%	0,2%
283	100,0%	93,9%	3,2%	2,6%	0,3%	0,0%	0,0%
291	100,0%	81,1%	1,8%	16,8%	0,3%	0,0%	0,0%
292	100,0%	68,5%	1,9%	24,3%	4,4%	0,9%	0,0%
293	100,0%	92,4%	1,0%	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%
294	100,0%	73,9%	9,4%	14,6%	0,2%	1,9%	0,0%
301	100,0%	19,2%	32,9%	22,2%	14,3%	2,9%	8,4%
302	100,0%	0,0%	20,6%	10,3%	69,1%	0,0%	0,0%
303	100,0%	18,5%	45,3%	14,3%	1,0%	1,7%	19,1%
304	100,0%	22,6%	52,8%	5,7%	13,2%	5,7%	0,0%
305	100,0%	12,5%	27,7%	36,6%	16,1%	0,6%	6,5%
311	100,0%	40,6%	15,0%	30,6%	1,1%	1,4%	11,3%
312	.	.	.	.	.	.	.
321	100,0%	50,7%	34,0%	12,6%	1,9%	0,8%	0,0%
322	100,0%	40,9%	32,4%	23,9%	0,3%	2,4%	0,0%
331	100,0%	34,3%	41,1%	23,1%	1,6%	0,0%	0,0%
332	100,0%	84,4%	8,6%	6,8%	0,0%	0,2%	0,0%
333	100,0%	22,6%	24,2%	40,2%	8,7%	4,3%	0,0%
334	100,0%	17,2%	71,9%	2,3%	5,7%	1,1%	1,7%
335	100,0%	43,1%	20,5%	32,0%	0,2%	4,1%	0,0%
336	100,0%	55,2%	22,9%	18,8%	0,1%	2,9%	0,1%
337	100,0%	46,6%	22,5%	16,2%	13,7%	1,0%	0,0%
338	100,0%	55,0%	16,7%	20,0%	3,3%	0,0%	5,0%
339	100,0%	78,1%	6,3%	12,5%	3,1%	0,0%	0,0%

Qualità dati HoNOS totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

		Numero di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
		Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
Cli-	Totale	67214	26084	18027	15992	2658	1224	3229
nica	101	3183	1123	789	752	466	51	2
	102	527	397	94	9	26	1	0
	103	186	72	100	13	1	0	0
	104	138	119	0	19	0	0	0
	105	683	582	74	12	12	0	3
	106	40	0	38	1	0	1	0
	111	715	329	169	214	1	2	0
	121	249	0	166	33	32	1	17
	122	250	191	13	44	2	0	0
	123	284	177	86	15	4	2	0
	124	109	0	104	2	3	0	0
	125	1249	990	126	123	5	5	0
	126	754	480	221	43	3	3	4
	127	2195	540	953	519	18	58	107
	128	155	72	57	14	12	0	0
	129	74	65	2	5	1	0	1
	131	709	223	225	151	1	22	87
	132	384	358	8	16	2	0	0
	133	2632	617	727	779	15	45	449
	134	59	52	4	3	0	0	0
	141	1929	839	551	445	16	53	25
	142	321	139	52	15	45	1	69
	143	141	0	104	20	6	5	6
	151	518	479	7	30	2	0	0
	152	2955	985	783	1040	78	69	0
	161	2117	1079	321	530	29	27	131
	171	179	34	10	26	0	5	104
	172	3327	0	1358	1074	16	77	802
	181	147	75	18	52	1	1	0
	191	1782	796	428	363	187	0	8
	192	400	341	48	1	6	0	4
	211	2434	665	824	659	199	81	6

	Numero di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
	Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
212	84	71	5	6	2	0	0
221	1277	331	630	278	9	16	13
231	225	93	32	52	18	1	29
241	2054	607	750	563	92	42	0
242	1262	626	362	209	14	19	32
251	655	289	187	170	9	0	0
261	1748	319	241	538	0	8	642
271	24	18	1	4	1	0	0
281	1505	781	494	185	20	18	7
282	1906	955	442	487	13	6	3
283	344	323	11	9	1	0	0
291	387	314	7	65	1	0	0
292	1275	874	24	310	56	11	0
293	198	183	2	13	0	0	0
294	959	709	90	140	2	18	0
301	3676	707	1211	816	527	107	308
302	194	0	40	20	134	0	0
303	572	106	259	82	6	10	109
304	53	12	28	3	7	3	0
305	992	124	275	363	160	6	64
311	1603	651	240	491	17	23	181
312	.	.	.	.	.	.	.
321	477	242	162	60	9	4	0
322	1292	529	419	309	4	31	0
331	2575	882	1058	595	40	0	0
332	514	434	44	35	0	1	0
333	2925	661	707	1177	255	125	0
334	470	81	338	11	27	5	8
335	4847	2087	996	1553	10	201	0
336	1940	1070	444	365	2	57	2
337	204	95	46	33	28	2	0
338	120	66	20	24	4	0	6
339	32	25	2	4	1	0	0

Qualità dati BSCL totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi)

		Quota di casi analizzabili per calcoli BSCL						
		Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
Clinica	Totale	100,0%	18,8%	10,4%	42,2%	18,8%	1,2%	8,7%
	101	100,0%	12,8%	3,4%	47,8%	33,7%	0,0%	2,3%
	102	100,0%	74,6%	3,0%	12,5%	9,9%	0,0%	0,0%
	103	100,0%	54,3%	2,7%	41,4%	1,6%	0,0%	0,0%
	104	100,0%	65,2%	5,1%	28,3%	1,4%	0,0%	0,0%
	105	100,0%	76,1%	5,9%	5,4%	11,7%	0,0%	0,9%
	106	100,0%	0,0%	0,0%	2,5%	0,0%	50,0%	47,5%
	111	100,0%	26,6%	14,4%	51,0%	7,0%	0,0%	1,0%
	121	100,0%	0,0%	53,4%	22,9%	17,3%	0,0%	6,4%
	122	100,0%	26,0%	22,0%	34,0%	17,2%	0,8%	0,0%
	123	100,0%	62,0%	8,1%	21,1%	8,8%	0,0%	0,0%
	124	100,0%	0,0%	79,8%	9,2%	10,1%	0,0%	0,9%
	125	100,0%	58,3%	1,0%	27,2%	12,9%	0,0%	0,6%
	126	100,0%	25,9%	19,6%	14,7%	37,5%	2,3%	0,0%
	127	100,0%	7,3%	8,8%	42,0%	10,2%	0,0%	31,7%
	128	100,0%	28,4%	1,9%	27,7%	41,9%	0,0%	0,0%
	129	100,0%	35,1%	9,5%	9,5%	39,2%	4,1%	2,7%
	131	100,0%	13,4%	13,7%	35,8%	7,3%	1,6%	28,2%
	132	100,0%	58,6%	12,0%	23,4%	5,5%	0,5%	0,0%
	133	100,0%	8,7%	9,9%	44,3%	11,8%	2,5%	22,9%
	134	100,0%	72,9%	0,0%	22,0%	5,1%	0,0%	0,0%
	141	100,0%	17,3%	10,2%	46,9%	21,3%	3,9%	0,4%
	142	100,0%	46,4%	16,5%	5,6%	16,5%	0,0%	15,0%
	143	100,0%	0,0%	64,5%	24,1%	8,5%	2,1%	0,7%
	151	100,0%	73,7%	1,0%	16,0%	9,3%	0,0%	0,0%
	152	100,0%	15,5%	8,5%	58,6%	16,8%	0,6%	0,0%
	161	100,0%	24,2%	8,4%	46,7%	13,7%	0,3%	6,8%
	171	100,0%	17,3%	0,6%	14,5%	0,0%	0,0%	67,6%
	172	100,0%	0,0%	18,8%	45,1%	9,3%	2,7%	24,1%
	181	100,0%	13,6%	6,8%	68,7%	7,5%	2,0%	1,4%
	191	100,0%	23,5%	10,1%	37,9%	28,1%	0,2%	0,2%
	192	100,0%	67,5%	22,5%	1,0%	7,5%	0,5%	1,0%
	211	100,0%	4,7%	10,9%	43,5%	33,6%	1,4%	5,9%

	Quota di casi analizzabili per calcoli BSCL						
	Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
212	100,0%	76,2%	1,2%	22,6%	0,0%	0,0%	0,0%
221	100,0%	10,3%	24,5%	41,3%	19,8%	4,1%	0,0%
231	100,0%	20,9%	5,8%	34,2%	5,8%	0,0%	33,3%
241	100,0%	13,4%	14,8%	57,6%	11,7%	1,9%	0,5%
242	100,0%	21,2%	16,9%	38,1%	18,2%	3,2%	2,4%
251	100,0%	21,2%	10,1%	50,5%	18,2%	0,0%	0,0%
261	100,0%	21,5%	1,4%	45,4%	1,3%	0,3%	30,2%
271	100,0%	75,0%	4,2%	16,7%	4,2%	0,0%	0,0%
281	100,0%	40,9%	15,1%	26,8%	17,1%	0,1%	0,0%
282	100,0%	25,1%	4,5%	54,6%	14,6%	0,0%	1,2%
283	100,0%	62,8%	19,8%	6,1%	3,2%	7,0%	1,2%
291	100,0%	57,6%	10,6%	26,9%	3,6%	0,8%	0,5%
292	100,0%	13,3%	11,7%	42,1%	30,0%	2,9%	0,0%
293	100,0%	57,1%	5,6%	20,7%	15,2%	0,0%	1,5%
294	100,0%	44,6%	1,7%	36,0%	17,7%	0,0%	0,0%
301	100,0%	2,2%	6,2%	31,6%	7,4%	2,3%	50,4%
302	100,0%	0,0%	30,4%	14,9%	52,6%	2,1%	0,0%
303	100,0%	12,1%	36,5%	28,3%	10,8%	0,2%	12,1%
304	100,0%	20,8%	20,8%	17,0%	28,3%	13,2%	0,0%
305	100,0%	1,8%	8,8%	53,2%	18,4%	2,0%	15,7%
311	100,0%	15,1%	5,0%	52,3%	19,5%	0,4%	7,7%
312	.	.	.	.	.	.	.
321	100,0%	36,1%	11,9%	31,7%	20,3%	0,0%	0,0%
322	100,0%	22,1%	8,9%	55,3%	13,8%	0,0%	0,0%
331	100,0%	13,5%	22,5%	43,0%	21,0%	0,0%	0,0%
332	100,0%	57,8%	13,8%	22,2%	5,8%	0,2%	0,2%
333	100,0%	6,0%	5,7%	73,7%	12,2%	2,4%	0,0%
334	100,0%	3,0%	46,0%	8,1%	26,4%	2,8%	13,8%
335	100,0%	7,3%	3,8%	46,3%	42,1%	0,4%	0,0%
336	100,0%	26,8%	3,1%	37,9%	32,2%	0,0%	0,0%
337	100,0%	14,7%	9,3%	23,5%	51,5%	0,5%	0,5%
338	100,0%	52,5%	5,8%	24,2%	17,5%	0,0%	0,0%
339	100,0%	59,4%	0,0%	15,6%	25,0%	0,0%	0,0%

Qualità dati BSCL totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

		Numero di casi analizzabili per calcoli BSCL						
		Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
Clinica	Totale	67214	12635	6975	28366	12604	789	5845
	101	3183	409	107	1521	1074	0	72
	102	527	393	16	66	52	0	0
	103	186	101	5	77	3	0	0
	104	138	90	7	39	2	0	0
	105	683	520	40	37	80	0	6
	106	40	0	0	1	0	20	19
	111	715	190	103	365	50	0	7
	121	249	0	133	57	43	0	16
	122	250	65	55	85	43	2	0
	123	284	176	23	60	25	0	0
	124	109	0	87	10	11	0	1
	125	1249	728	12	340	161	0	8
	126	754	195	148	111	283	17	0
	127	2195	160	194	922	223	1	695
	128	155	44	3	43	65	0	0
	129	74	26	7	7	29	3	2
	131	709	95	97	254	52	11	200
	132	384	225	46	90	21	2	0
	133	2632	228	260	1166	310	66	602
	134	59	43	0	13	3	0	0
	141	1929	334	196	904	411	76	8
	142	321	149	53	18	53	0	48
	143	141	0	91	34	12	3	1
	151	518	382	5	83	48	0	0
	152	2955	457	252	1733	495	18	0
	161	2117	513	177	988	289	6	144
	171	179	31	1	26	0	0	121
	172	3327	0	626	1500	309	91	801
	181	147	20	10	101	11	3	2
	191	1782	419	180	676	500	4	3
	192	400	270	90	4	30	2	4
	211	2434	114	265	1059	819	34	143
	212	84	64	1	19	0	0	0

	Numero di casi analizzabili per calcoli BSCL						
	Totale	Completi	Analizzabile	Dropout (non in- fluenzabile)	Dropout (influenzabi- le)	Insufficiente	Manca
221	1277	131	313	528	253	52	0
231	225	47	13	77	13	0	75
241	2054	276	304	1184	240	39	11
242	1262	267	213	481	230	41	30
251	655	139	66	331	119	0	0
261	1748	375	24	794	22	5	528
271	24	18	1	4	1	0	0
281	1505	616	227	403	258	1	0
282	1906	478	86	1041	279	0	22
283	344	216	68	21	11	24	4
291	387	223	41	104	14	3	2
292	1275	170	149	537	382	37	0
293	198	113	11	41	30	0	3
294	959	428	16	345	170	0	0
301	3676	80	229	1160	273	83	1851
302	194	0	59	29	102	4	0
303	572	69	209	162	62	1	69
304	53	11	11	9	15	7	0
305	992	18	87	528	183	20	156
311	1603	242	80	838	312	7	124
312	.	.	.	.	.	.	.
321	477	172	57	151	97	0	0
322	1292	285	115	714	178	0	0
331	2575	347	580	1107	541	0	0
332	514	297	71	114	30	1	1
333	2925	176	167	2155	357	70	0
334	470	14	216	38	124	13	65
335	4847	355	185	2244	2042	21	0
336	1940	519	61	735	625	0	0
337	204	30	19	48	105	1	1
338	120	63	7	29	21	0	0
339	32	19	0	5	8	0	0

Qualità dati misure restrittive della libertà

(casi completi, 1.1. - 31.12.2014)

		Qualità dati - misure restrittive della libertà					
		Totale		valutabile		non valutabile	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	22385	100,0%	21807	97,4%	578	2,6%
ano-	03	3207	100,0%	3132	97,7%	75	2,3%
nimizzata	06	255	100,0%	255	100,0%	0	0,0%
N°	07	438	100,0%	427	97,5%	11	2,5%
	08	429	100,0%	419	97,7%	10	2,3%
	12	7	100,0%	7	100,0%	0	0,0%
	13	1029	100,0%	1010	98,2%	19	1,8%
	17	169	100,0%	169	100,0%	0	0,0%
	18	1	100,0%	1	100,0%	0	0,0%
	21	444	100,0%	444	100,0%	0	0,0%
	22	1182	100,0%	892	75,5%	290	24,5%
	24	1707	100,0%	1705	99,9%	2	0,1%
	28	497	100,0%	488	98,2%	9	1,8%
	27	1	100,0%	0	0,0%	1	100,0%
	30	378	100,0%	378	100,0%	0	0,0%
	32	759	100,0%	758	99,9%	1	0,1%
	33	16	100,0%	14	87,5%	2	12,5%
	34	499	100,0%	499	100,0%	0	0,0%
	35	1186	100,0%	1177	99,2%	9	0,8%
	36	311	100,0%	311	100,0%	0	0,0%
	37	1564	100,0%	1563	99,9%	1	0,1%
	39	315	100,0%	315	100,0%	0	0,0%
	40	137	100,0%	132	96,4%	5	3,6%
	42	120	100,0%	120	100,0%	0	0,0%
	43	208	100,0%	208	100,0%	0	0,0%
	44	193	100,0%	193	100,0%	0	0,0%
	46	279	100,0%	252	90,3%	27	9,7%
	48	1383	100,0%	1378	99,6%	5	0,4%
	49	84	100,0%	0	0,0%	84	100,0%
	50	32	100,0%	32	100,0%	0	0,0%
	51	962	100,0%	962	100,0%	0	0,0%
	52	1081	100,0%	1081	100,0%	0	0,0%
	54	2477	100,0%	2454	99,1%	23	0,9%
	56	647	100,0%	644	99,5%	3	0,5%
	58	377	100,0%	376	99,7%	1	0,3%
	59	3	100,0%	3	100,0%	0	0,0%
	63	8	100,0%	8	100,0%	0	0,0%

A4.Ausili alla lettura

Diagramma a barre sovrapposte

Questi diagrammi si trovano nell'appendice per descrivere l'intero campione (es. distribuzione dei sessi, età).

Esempio di lettura: la distribuzione dei sessi nella clinica K01 è composta da 34.1% uomini e 65.9% donne.




Diagramma circolare

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. Luogo di dimora prima dell'ammissione).

Esempio di lettura: Per il 67.7% delle persone nella popolazione - nell'esempio qui illustrato - il luogo di dimora prima dell'ammissione è « a casa propria ».





Diagramma a colonne

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. diagnosi principale).

Esempio di lettura: Il 31.0% delle persone nella popolazione - nell'esempio qui illustrato - (20'063 dei casi esaminati) ha la diagnosi principale « disturbi affettivi».

Asse delle y con il numero di casi misurati nell'intero campione



Quota dei casi misurati per categoria

Leggenda delle categorie

- F0 - Disturbi organici
- F1 - Disturbi psichici causati da sostanze psicotrope
- F2 - Schizofrenia, disturbi schizotipici e paranoici
- F3 - Disturbi affettivi
- F4 - Disturbi nevrotici, da stress post-traumatico e somatoformi
- F5 - Anomalie comportamentali con disturbi fisici
- F6 - Disturbi della personalità e comportamentali
- F7, F8, F9 und F99 - Altri disturbi psichici
- Altre diagnosi mediche principali
- Indicazione mancata

Diagramma a punti


Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. gravità media di HoNOS e BSCL all'ammissione).

Esempio di lettura: Per esempio i pazienti della clinica K01 hanno un valore medio HoNOS-ammissione di 19, questo quindi è superiore al valore medio HONOS-ammissione del campione totale che è di 16. Il valore medio del BSCL-ammissione dei pazienti della clinica esempio K01 è di 63 ed è quindi superiore al valore medio BSCL-ammissione del campione totale che è di 62.

Leggenda delle categorie

Asse delle y con i valori medi d'ammissione (mediano):
asse sinistra HoNOS,
asse destra BSCL

Asse delle x con le singole cliniche



Boxplot

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 e nell'appendice per descrivere l'intero campione (es. durata della degenza, HoNOS e BSCL: gravità media (punteggio complessivo) all'ammissione).

Esempio di lettura: La clinica K01 presenta una durata media della degenza dei suoi pazienti pari a 19 giorni (mediana). Il 25% dei casi ha avuto una permanenza fino a 15 giorni (percentile 25%), il 25% dei casi ha avuto una permanenza di almeno 23 giorni (percentile 75%).

Asse con le caratteristiche dei valori misurati

Riga con il risultato dell'intero campione

Righe con i risultati delle singole cliniche




Diagramma a barre di errore con valore medio totale e relativo intervallo di confidenza al 95% come area di riferimento.

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 3 per descrivere la qualità della cura nel confronto tra cliniche: HoNOS risultato di misurazione, BSCL risultato di misurazione, misure restrittive della libertà (MRL).

Esempio di lettura: I valori medi grigio scuro (p.es. clinica K02) sono significativamente al di sopra della media dell'intero campione. I valori medi in grigio (p.es. K04) non divergono in maniera significativa dalla media complessiva. I valori medi grigio chiaro (p.es. clinica K03) sono significativamente al di sotto della media dell'intero campione. Per la clinica K01 non sono disponibili dati. Per la clinica K06 non è disponibile un numero sufficiente di dati (*n<30). Per le cliniche K01, K02 e K03 il tasso di risposta è inferiore al tasso atteso.





Diagramma a barre di errore con valore medio totale e relativo intervallo di confidenza al 95% come area di riferimento.

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 3 per descrivere la qualità della cura nel confronto tra cliniche: Raffronto annuale HoNOS, BSCL, misure restrittive della libertà (MRL).

Esempio di lettura:

La clinica esempio K03 nell'anno precedente ha raggiunto una media di 0.19. Nell'anno attuale la clinica ha raggiunto un valore di -0.42 (entrambi i risultati sono stati al di sotto della media, poiché in entrambi i anni il IC 95% della clinica esempio è stato al di sotto del IC 95% del campione totale). Nell'anno attuale non sussistono dati per la clinica esempio K01.



Valore medio standardizzato della singola clinica dell'anno precedente

Intervallo di confidenza 95% dell'intero campione dell'anno attuale (=area di riferimento) (area tra le linee viola)


Valore medio standardizzato della singola clinica dell'anno attuale

Asse delle x con le singole cliniche

Diagramma a colonne cumulate

Questi diagrammi si trovano al capitolo 4 sulla qualità dei dati: numero di casi analizzabili per HoNOS, BSCL è MRL.

Esempio di lettura: La clinica esempio K18 ha fornito un 56% di casi con una qualità valutabile (verde: fanno parte dell'analisi) e per 18% dei casi dropouts non influenzabili (giallo). Quindi risulta una quota di risposta del 74% che è al di sopra del valore stimato dell'ANQ di 80% (inclusi i casi valutabili ed i dropouts non influenzabili). Nel 6% dei casi della clinica esempio K18 sussiste un dropout (influenzabile) (grigio chiaro). Nel 14% dei casi i dati sono di scarsa qualità (grigio scuro) e nel 6% dei casi almeno una parte manca completamente (nero).



Valore atteso dell'ANQ per il ritorno dati

Asse delle y con la quota di casi

Asse delle x con le singole cliniche

Leggenda delle categorie

Quota di casi che non potevano essere inclusi nell'analisi a causa di indicazioni insufficienti o mancanti.

Quota di casi che non potevano essere inclusi nell'analisi a causa di un dropout influenzabile.

Percentuale di tasso di ritorno (in verde: casi valutabili, in giallo: dropouts non influenzabili).

Risultati dell'intero campione


Diagramma a colonne con punti dei dati

Questi diagrammi si trovano al capitolo 4 sulla qualità dei dati:

Raffronto annuale per il numero di casi analizzabili per HoNOS, BSCL e MRL.

Esempio di lettura: Nell'anno precedente, la clinica esempio K12 ha raggiunto una quota di ritorno di casi del 41% (dati di una valutabile qualità, inclusi dropouts non influenzabili). Nell'anno attuale la clinica ha raggiunto una quota di ritorno di casi del 55%, cosa corrisponde ad un aumento del 14%. La quota di risposta della clinica esempio K12 è stato in entrambi gli anni al di sotto del valore atteso dell'ANQ.

Per la clinica K01 non sono stati disponibili dati per entrambi gli anni.



A5.Glossario

Aggiustamento = vedi → Aggiustamento secondo il rischio

Aggiustamento secondo il rischio = depurazione statistica dei parametri calcolati dall'influenza delle variabili di disturbo sulle quali le cliniche non possono agire, al fine di poter confrontare equamente i dati delle cliniche; è il caso in primo luogo della composizione del collettivo di pazienti in cura (*case-mix*), ossia i rischi distribuiti in maniera diversa tra fornitori di servizi (possibilità di conseguire un buon risultato di misurazione)

Analisi del drop-out = verifica della rappresentatività dei dati della misurazione disponibili per ciascuna clinica e per tutti i casi della relativa clinica

Autovalutazione = registrazione del peso dei sintomi da parte dei pazienti mediante BSCL

Benchmark = processo sistematico continuo di confronto di prodotti, servizi e processi in diverse imprese riguardo a qualità e/o quantità

Box-plot = diagramma per la rappresentazione grafica di dati metrici per un'impressione rapida sulla loro distribuzione

BSCL (Brief Symptom Checklist) = questionario di autovalutazione con cui si può misurare il peso psichico di un paziente mediante scala Likert (5 livelli di possibili risposte); forma abbreviata della Symptom Checklist SCL-90, composta da 53 item che si suddividono in nove scale inferiori, tre valori caratteristici e gli item complementari

Campione complessivo = tutti i pazienti per i quali sono stati rilevati dati

Case-mix = composizione del collettivo di pazienti curati (p.es. riguardo a demografia dei pazienti, distribuzione delle diagnosi, peso dei sintomi al momento dell'ammissione)

Caso concluso = un paziente che ha iniziato e terminato la cura nel periodo di rilevamento (= caso di cura concluso)

Confounder (variabile confondente) = variabili di disturbo, di aggiustamento; fattori che possono influenzare sia le variabili dipendenti sia le variabili indipendenti, e controllati statisticamente mediante aggiustamento del risultato

Confronto tra cliniche = rappresentazione comparativa dei risultati - aggiustati per il *case-mix* - su peso dei sintomi (valutazione da parte di terzi, autovalutazione) e misure restrittive della libertà

Deviazione standard (DS) = unità di misura della dispersione dei valori di una variabile attorno al suo valore medio

Diagramma a barre = diagramma per la rappresentazione grafica di dati mediante barre orizzontali

Diagramma a barre di errore = rappresentazione grafica di dati numerici per la visualizzazione degli scarti, fondati su errori sistematici o statistici, dei valori di misurazione osservati rispetto al valore effettivo della dimensione di misurazione

Diagramma a colonne = diagramma per la rappresentazione grafica della distribuzione della frequenza in più categorie mediante colonne verticali

Diagramma a punti = diagramma per la rappresentazione grafica di determinate caratteristiche mediante punti

Drop-out = mancata risposta, valore mancante, mancata reazione a una domanda; molti *drop-out* possono condurre a una minore rappresentatività del sondaggio

Gravità/punteggio complessivo BSCL = è composto dalla somma dei 53 item e comprende valori che vanno da 0 a 212

Gravità/punteggio totale HoNOS = è composto dalla somma dei 12 item e comprende valori che vanno da 0 a 48

HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) = questionario di documentazione del caso per la valutazione da parte della persona curante della gravità dei sintomi; è composto in totale da 12 item

Intervallo di confidenza del 95% (IC) = l'IC descrive la precisione della stima di un parametro (p.es. valore medio); con un IC 95% il valore medio effettivo è con una probabilità del 95% nell'area indicata

Manuale per i rilevatori = documento dell'ANQ in cui sono descritte le direttive per i processi di rilevamento dei dati

Massimo = il valore più alto raggiunto nella misurazione

Mediana (= percentile 50%) = misura dei valori medi per distribuzioni, dove il 50% dei rispettivi valori misurati sono al di sotto o al di sopra di tale limite

Minimo = il valore più basso raggiunto nella misurazione

Misura restrittiva della libertà (MRL/EFM) = questionario di documentazione del caso riguardante le seguenti misure: isolamento, immobilizzazione e medicazione forzata come pure misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto tipiche della gerontopsichiatria (come tavolino applicato alla sedia, sbarre per il letto...). Questo indicatore rappresenta un fattore di successo critico per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di libertà dei pazienti e aiuta l'interpretazione quanto ad accuratezza e adeguatezza delle cure psichiatriche

Outcome = risultato della misurazione

Percentile = indice di dispersione che indica quale percentuale di tutte le osservazioni è al di sotto di un determinato valore

Percentile 25% = limite al di sotto del quale si trova il 25% dei valori misurati

Percentile 50% = vedi mediana

Percentile 75% = limite al di sopra del quale si trova il 25% dei valori misurati (il 75% dei valori è al di sotto)

Peso dei sintomi = numero e gravità dei sintomi presenti di un disturbo psichico; la differenza dei valori del peso dei sintomi al momento dell'ammissione e della dimissione consente di trarre conclusioni sull'efficacia della cura; il peso dei sintomi è misurato sia nella valutazione da parte di terzi sia nell'autovalutazione

Predittore = variabile da utilizzare per predire una caratteristica (cfr. *confounder*)

Prova a campione = quantità parziale di un'entità totale (popolazione); nel rilevamento dei dati vengono acquisiti tutti i casi curati in ospedale nel rispettivo arco di tempo, anche se sono entrati prima dell'attuale periodo di rilevamento o se alla fine di questo non erano ancora stati dimessi; per le analisi si considerano però solo i casi entrati a partire dal momento dell'inizio dello studio e dimessi nel periodo del relativo rapporto

Regressione, multipla = procedimento statistico per stimare una o più variabili dipendenti ("criteri") sulla base di una o più variabili indipendenti ("predittori")

Residuo, valore residuo = differenza tra il valore del risultato effettivamente misurato e quello stimato sulla base dei predittori; questo valore è ripulito dall'influenza delle variabili di disturbo, in modo che non vi siano più distorsioni a causa di una differente struttura dei pazienti delle cliniche; valori residui che si trovano sopra la media sono sinonimo di alta qualità, poiché il risultato è migliore di quello atteso in base alle caratteristiche del caso

Ricovero a scopo di assistenza, prima: **privazione della libertà a scopo di assistenza** = internamento di una persona contro la sua volontà in un istituto; di regola viene ordinato dall'autorità tutoria, anche se esistono differenze cantonali

Risultato della misurazione BSCL = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio BSCL all'ammissione e quello alla dimissione

Risultato della misurazione HoNOS = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio HoNOS all'ammissione e quello alla dimissione

Significatività, statistica = le differenze tra le dimensioni di misurazione sono considerate significative se la probabilità che ciò sia dovuto al caso non supera una soglia definita; la probabilità massima di errore ammessa è chiamata livello di significatività α

Statistica medica (MedStat) **dati base** (UST) = parte del rilevamento dei dati per l'UST, contiene caratteristiche sociodemografiche, indicazioni sull'ospedalizzazione, codici di diagnosi e cura dei pazienti ricoverati in ospedale; la registrazione di diagnosi principali, età e altri dati serve per l'aggiustamento dei confronti tra cliniche riguardo al *case-mix* nella struttura dei pazienti

Statistica medica (MedStat) **dati supplementari psichiatria** = parte del rilevamento dei dati per l'UST con indicazioni specifiche per la psichiatria

UST = Ufficio federale di statistica

Valore medio = media aritmetica dei valori misurati

Valutazione da parte di terzi = rilevamento del peso dei sintomi da parte del personale curante mediante HoNOS

Variabile = caratteristica statistica che attribuisce caratteristiche alle unità di indagine

Varianza = distribuzione dei valori misurati

A6.Bibliografia

- ANQ - Hochstrasser, Barbara / Ruflin, Regula / Bernhardsgrütter, Renate / Schütz, Christopher (2011):
progetto pilota ANQ psichiatria. Rapporto di analisi secondo anno pilota.
- Brandstätter, E. (1999). Confidence Intervals as an Alternative to Significance Testing. *Methods of Psychological Research Online* 4(2), 33-46.
- Cumming, G. & S. Finch (2005). Inference by Eye: Confidence Intervals and How to Read Pictures of Data. *American Psychologist* 60(2), 170-180. doi: 10.1037/0003-066X.60.2.170
- Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introductory report. *Psychological Medicine*, 13(03), 595-605. doi:10.1017/S0033291700048017
- Farin, E., Glattacker, M., Follert, P., Kuhl, H.C., Klein, K. & Jäckel, W.H. (2005). Einrichtungsvergleiche in der medizinischen Rehabilitation. *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich*, 98(8), 655-62.
- IBM Corporation (2013). IBM SPSS Statistics V22.0.
- Iezzoni, L.I. (1995). Risk adjustment for medical effectiveness research: an overview of conceptual and methodological considerations. *J Investig Med*, 43(2), 136-50.
- Iezzoni, L.I. (2004). Risk adjusting rehabilitation outcomes: an overview of methodologic issues. *Am J Phys Med Rehabil*, 83(4), 316-26.
- Kuhl, H.C., Krneta, D., Warnke, I., Herdt, J., Cassidy, C., von Allmen, U. & Rössler, W. (2008). Freiwilliges Benchmark der Psychiatrischen Unikliniken Basel, Bern und Zürich. Methodisches Vorgehen und Erfahrungsbericht. *Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie und Neurologie* (1), 37-40.
- Martin, V., Bernhardsgrütter, R., Goebel, R. & Steinert, Tilman (2007). The use of mechanical restraint and seclusion in patients with schizophrenia: A comparison of the practice in Germany and Switzerland. In: *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health* 3:1. Article available from: <http://www.cpementalhealth.com/content/3/1/1>.
- Wing, J. K., Beevor, A. S., Curtis, R. H., Park, S. B., Hadden, S., & Burns, A. (1998). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Research and development. *The British Journal of Psychiatry*, 172(1), 11-18. doi:10.1192/bjp.172.1.11