

Risultati registro delle protesi SIRIS anca e ginocchio

Spiegazioni sulle finestre pop-up

Questo paragrafo descrive brevemente i diversi valori che appaiono nelle finestre pop-up. Le lettere a-g (vedi legenda in basso) corrispondono a un determinato parametro. Gli esempi nella tabella sono fittizi.

Risultati tassi di revisione				
a) Tasso di revisione a due anni aggiustato	x	[4.8%]		
b) Tasso di revisione a due anni grezzo	n/N, x	[16/285, 5.6%]		
Descrizione collettivo		Collettivo di pazienti dell'ospedale/ della clinica	Collettivo totale protesi dell'anca	Collettivo totale protesi del ginocchio
c) Ripartizione secondo l'età	VM, mediana, DS Tasso meno di 50 anni Tasso più di 80 anni	[69.8], [70], [8.9] [1.2%] [12.5%]	68.7, 70, 10.9 5.0% 14.0%	69.9, 71, 9.2 1.5% 13.0%
d) Sesso	Tasso uomini	[37.4%]	48.5%	37.4%
e) IMC	Tasso sovrappeso, IMC ≥ 25 Tasso obesi, IMC ≥ 30 Tasso dati mancanti	[46.2%] [35.0%] [49.5%]	40.0% 25.5% 29.8%	38.5% 41.0% 30.3%
f) Score ASA	Tasso score ≥ 3 Tasso dati mancanti	[32.5%] [14.6%]	24.2% 22.5%	28.2% 21.6%
g) Classe di Charnley	Tasso classe B Tasso classe C Tasso dati mancanti	[64.2%] [4.5%] [26.3%]	62.7% 1.9% 38.7%	66.8% 2.1% 42.6%

a) Tasso di revisione a due anni aggiustato	x = revisioni in percentuale
b) Tasso di revisione a due anni grezzo	n = numero di revisioni, N = numero di interventi, x = revisioni in percentuale
c) Ripartizione secondo l'età	VM = valore medio Mediana DS = deviazione standard
d) Ripartizione secondo il sesso	Tasso di pazienti uomini
e) IMC	Tasso di pazienti con IMC (indice di massa corporea) ≥ 25 (sovrappeso) Tasso di pazienti con IMC ≥ 30 (obesi) Tasso di dati mancanti
f) Score ASA	Tasso di pazienti con uno score ASA ≥ 3 Tasso di dati mancanti
g) Classe di Charnley	Tasso di pazienti classe B (con malattia bilaterale) Tasso di pazienti classe C (con altre malattie limitanti la mobilità) Tasso di dati mancanti