

Istruzioni per la lettura: pubblicazione trasparente psichiatria/ grafici web/PA

1. Peso dei sintomi

Asse x

- I valori delle cliniche appaiono in ordine crescente secondo il tasso di risposta.
- Il valore atteso è rappresentato da una linea blu verticale: è del 90% per l'HoNOS e del 60% per la BSCL.

Asse y

- L'asse y rappresenta il risultato aggiustato secondo il rischio della riduzione del peso dei sintomi. Il valore comparativo presentato indica di quanto la riduzione del peso dei sintomi di ciascuna clinica sia inferiore o superiore alla media del gruppo di riferimento.
- La linea grigia orizzontale (linea dello zero) segnala la media complessiva della riduzione del peso dei sintomi (con aggiustamento secondo il rischio) di tutte le cliniche partecipanti.
- La linea verticale attraverso i punti dato contrassegna l'intervallo di confidenza (IC), ossia il settore nel quale, con una probabilità del 95%, si trova il valore misurato. Nella finestra pop-up, tale intervallo è indicato tra parentesi dietro il valore misurato.

Punti dato

- **Grigio scuro:** i valori positivi (IC sopra la linea dello zero) segnalano un risultato superiore a quanto atteso in base alle variabili di controllo.
- **Grigio chiaro:** i valori negativi (IC sotto la linea dello zero) segnalano un risultato inferiore a quanto atteso in base alle variabili di controllo.
- **Grigio:** il risultato di una clinica non diverge in modo statisticamente significativo dalla media (l'IC interseca la linea dello zero).
- **Bianco trasparente:** le cliniche con meno di trenta casi analizzabili vengono raffigurate senza intervallo di confidenza. Con campioni di piccole dimensioni, la rappresentatività dei dati è limitata e questi valori vanno pertanto considerati solo con riserva.

Riduzione/aumento del peso

- Nel **settore bianco**, rappresentante la riduzione del peso, si trovano le cliniche i cui pazienti in media presentano una riduzione del peso dei sintomi (di regola concerne tutte le cliniche).
- Nel **settore arancione**, rappresentante l'aumento del peso, si trovano le cliniche i cui pazienti in media hanno subito un aumento del peso dei sintomi.

2. Misure restrittive della libertà

Asse x

- I valori appaiono in ordine crescente secondo il numero della clinica.

Asse y

- L'asse y riporta il tasso di casi interessati (casi con almeno una misura restrittiva della libertà), senza aggiustamento secondo il rischio.
- La linea grigia orizzontale segnala il tasso complessivo delle misure restrittive della libertà di tutte le cliniche partecipanti.

Punti dato

- **Grigio scuro:** l'istituto appartiene al 25% di cliniche con il tasso più basso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà.
- **Grigio chiaro:** l'istituto appartiene al 25% di cliniche con il tasso più alto di casi con almeno una misura restrittiva della libertà.
- **Grigio:** l'istituto appartiene al 50% di cliniche con un tasso medio di casi con almeno una misura restrittiva della libertà.
- **Bianco:** la clinica ha meno di trenta casi analizzabili e, in considerazione della scarsa base di dati, non è stata inclusa nel calcolo dei quartili.

Tabella

La tabella offre una panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà in base al codice cromatico nel grafico summenzionato.

Ottobre 2022