
Rapporto comparativo nazionale Psichiatria ospedaliera per adulti

Misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti

Indicatori «peso dei sintomi» e «misure restrittive della libertà»

Periodo di rilevamento (dimissione): 1° gennaio – 31 dicembre 2015

07.11.2016 / versione 1.1

Impressum

Titolo	Rapporto comparativo nazionale: psichiatria ospedaliera adulti - misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti (indicatori «peso dei sintomi» e «misure restrittive della libertà»)
Anno	07.11.2016 (v 1.1)
Autori	Dr. Bernhard Bührle, responsabile progetto, Clinica psichiatrica universitaria di Basilea UPK Simone McKernan, MSc, UPK Basilea Sabine Olson, MSc, UPK Basilea
Collaborazione	Comitato dell'ANQ per la qualità Psichiatria
Committente rappresentato da	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ, dott.ssa Johanna Friedli, responsabile Psichiatria
Copyright	Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ Segretariato generale Thunstrasse 17, Casella postale 370 3000 Berna 6

Indice

Impressum	2
1. Riepilogo	7
1.1. Obiettivo e scopo.....	7
1.2. Risultati	8
1.2.1. Qualità dei dati.....	8
1.2.2. Indicatori «peso dei sintomi» e «misure restrittive della libertà» secondo il tipo di clinica.....	8
1.3. Commento.....	9
2. Introduzione	10
3. Confronti tra cliniche sulla qualità dei risultati	11
3.1.1. Peso dei sintomi.....	11
3.1.2. Panoramica dei risultati concernenti il peso dei sintomi.....	11
3.1.3. Misure restrittive della libertà.....	12
3.1.4. Panoramica dei risultati concernenti le misure restrittive della libertà	12
3.2. Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	14
3.2.1. Peso dei sintomi.....	14
3.2.2. Misure restrittive della libertà.....	16
3.3. Tipo di clinica 2: cliniche specializzate	18
3.3.1. Peso dei sintomi.....	18
3.3.2. Misure restrittive della libertà.....	20
3.4. Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze.....	22
3.4.1. Peso dei sintomi.....	22
3.4.2. Misure restrittive della libertà.....	23
3.5. Confronti annuali della qualità dei risultati.....	24
3.5.1. Risultati della misurazione non aggiustati.....	24
4. Qualità dei dati.....	26
4.1. HoNOS	26
4.2. BSCL.....	26
4.3. Misure restrittive della libertà.....	26
4.4. Confronti annuali della qualità dei dati	30
4.4.1. Tasso di risposta per l'HoNOS nell'anno in corso e in quello precedente.....	30
4.4.2. Tasso di risposta per la BSCL nell'anno in corso e in quello precedente.....	31
4.4.3. Quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà nell'anno in corso e in quello precedente.....	32
5. Descrizione prova a campione e <i>case-mix</i>.....	33

5.1.	Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	34
5.1.1.	Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento.....	34
5.1.2.	Età all'ammissione.....	34
5.1.3.	Sesso.....	35
5.1.4.	Diagnosi principale.....	35
5.1.5.	Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL).....	36
5.1.6.	Ricovero a fini assistenziali.....	36
5.1.7.	Nazionalità.....	37
5.1.8.	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa.....	37
5.1.9.	Stato civile.....	38
5.1.10.	Occupazione prima dell'ammissione.....	38
5.1.11.	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione.....	39
5.1.12.	Classe di stanza occupata.....	39
5.1.13.	Istanza ricoverante.....	40
5.1.14.	Durata della degenza.....	41
5.1.15.	Degenze di breve durata.....	42
5.1.16.	Casi esclusi (HoNOS).....	42
5.1.17.	Casi esclusi (BSCL).....	42
5.2.	Tipo di clinica 2: cliniche specializzate.....	43
5.2.1.	Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento.....	43
5.2.2.	Età all'ammissione.....	43
5.2.3.	Sesso.....	44
5.2.4.	Diagnosi principale.....	44
5.2.5.	Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL).....	45
5.2.6.	Ricovero a fini assistenziali.....	45
5.2.7.	Nazionalità.....	46
5.2.8.	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa.....	46
5.2.9.	Stato civile.....	47
5.2.10.	Occupazione prima dell'ammissione.....	47
5.2.11.	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione.....	48
5.2.12.	Classe di stanza occupata.....	48
5.2.13.	Istanza ricoverante.....	49
5.2.14.	Durata della degenza.....	50
5.2.15.	Degenze di breve durata.....	51
5.2.16.	Casi esclusi (HoNOS).....	51
5.2.17.	Casi esclusi (BSCL).....	51
5.3.	Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze.....	52
5.3.1.	Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento.....	52
5.3.2.	Età all'ammissione.....	52

5.3.3.	Sesso.....	52
5.3.4.	Diagnosi principale.....	53
5.3.5.	Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL).....	53
5.3.6.	Ricovero a fini assistenziali.....	54
5.3.7.	Nazionalità.....	54
5.3.8.	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa.....	55
5.3.9.	Stato civile.....	55
5.3.10.	Occupazione prima dell'ammissione.....	56
5.3.11.	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione.....	56
5.3.12.	Classe di stanza occupata.....	57
5.3.13.	Istanza ricoverante.....	57
5.3.14.	Durata della degenza.....	58
5.3.15.	Degenze di breve durata.....	58
5.3.16.	Casi esclusi (HoNOS).....	59
5.3.17.	Casi esclusi (BSCL).....	59
6.	Metodi.....	60
6.1.	Procedura.....	60
6.2.	Analisi secondo il tipo di clinica.....	61
6.3.	Analisi variabili confondenti.....	61
6.3.1.	Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	62
6.3.2.	Tipo di clinica 2: cliniche specializzate.....	62
6.3.3.	Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze.....	63
6.3.4.	Valutazione complessiva.....	63
6.4.	Aggiustamento secondo il rischio per i confronti tra cliniche.....	63
6.5.	Significatività delle differenze tra valore della clinica e valore normale.....	63
	Indice figurativo.....	65
	Indice delle tabelle.....	68
	Annesso.....	71
A1.	Informazioni generali in riguardo alla fornitura dati.....	72
	Età all'ammissione.....	73
	Sesso.....	76
	Diagnosi Principale.....	79
	HoNOS: Gravità all'ammissione (punteggio complessivo).....	84
	BSCL: Gravità all'ammissione (punteggio complessivo).....	87
	Ricovero a fini assistenziali.....	90
	Nazionalità.....	93
	Istruzione.....	96
	Rapporto comparativo nazionale «Psichiatria ospedaliera per adulti», 2015, versione 1.0	5

Stato civile.....	101
Occupazione prima dell'ammissione.....	106
Luogo di soggiorno prima dell'ammissione.....	109
Categoria di classe di stanza occupata.....	116
Istanza ricoverante.....	119
Durata della degenza.....	124
Degenze di breve durata.....	126
Casi esclusi (HoNOS).....	129
Casi esclusi (BSCL).....	132
A2. Risultato della misurazione (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	135
A3. Risultato della misurazione (cliniche specializzate).....	151
A4. Risultato della misurazione (cliniche per la cura di dipendenze).....	160
A5. Qualità dei dati.....	162
A6. Ausili alla lettura.....	171
A7. Glossario.....	176
A8. Bibliografia.....	179

1. Riepilogo

1.1. Obiettivo e scopo

L'ANQ si occupa di misurazioni della qualità nel settore stazionario di cliniche e ospedali svizzeri. Nel quadro del contratto nazionale di qualità, gli ospedali e le cliniche aderenti sono tenuti a partecipare a tali misurazioni. Per la psichiatria, l'ANQ ha incaricato le cliniche psichiatriche universitarie dell'UPK Basilea di fungere da istituto di analisi.

Le cliniche psichiatriche rilevano dal 1° luglio 2012 dati sugli indicatori di qualità dell'ANQ, oltre a quelli sociodemografici (dati di base e dati supplementari psichiatria) definiti dall'Ufficio federale di statistica (UST). L'annuale rapporto comparativo nazionale consente a enti finanziatori e fornitori di prestazioni di operare un confronto tra cliniche sulla scorta dei risultati seguenti:

- peso dei sintomi e relativo cambiamento durante la degenza, dal punto di vista del personale di cura (HoNOS¹) e del paziente (BSCL²);
- frequenza delle misure restrittive della libertà (EFM³);
- soddisfazione dei pazienti: al momento, viene ancora rilevata dalle cliniche con strumenti individuali. Nel 2017, è prevista l'introduzione del questionario breve dell'ANQ valido a livello nazionale.

Le cliniche ricevono a scadenza semestrale un riscontro sulla qualità dei dati rilevati, il quale contiene informazioni sulla completezza dei set di dati parziali e sull'analizzabilità in vista di confronti tra cliniche, nonché indicazioni sulle possibilità di miglioramento.

La Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) costituisce il fondamento per le misurazioni nazionali dell'ANQ, le analisi comparative e la pubblicazione trasparente dei risultati. Sulla base di questo rapporto, nel 2016 vengono pubblicati in modo trasparente per la seconda volta risultati nazionali sul peso dei sintomi e per la prima volta sull'adozione di misure restrittive della libertà. Per entrambi gli indicatori sono così soddisfatte le direttive del contratto nazionale di qualità e, di riflesso, quelle della LAMal.

Il rapporto è stato redatto sulla scorta dell'attuale concetto di analisi⁴. Esso comprende dunque le modifiche suggerite dai partner dell'ANQ in occasione della consultazione 2016. Rispetto all'analisi dei dati 2014, in quella dei dati 2015 sono state incluse per la prima volta variabili di struttura volte a tenere conto dell'eterogeneità nel settore della psichiatria. La psichiatria per adulti è stata dunque suddivisa in tre tipi di clinica mediante criteri definiti e i rispettivi dati sono stati analizzati separatamente:

- cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta;
- cliniche specializzate;
- cliniche per la cura di dipendenze.

Sono state altresì apportate modifiche al metodo di analisi delle misure restrittive della libertà. Questi risultati non vengono più rappresentati aggiustati secondo il rischio, così le cliniche possono utilizzarli

¹ HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales), vedi www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/20140128_HoNOS-konzentrierter-Ratingbogen_DE.pdf

² BSCL (Brief Symptom Checklist), vedi www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/120611_Info-Instrument_BSCL_DT_v2.pdf

³ EFM (strumento di rilevamento misure restrittive della libertà), vedi www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/20141120_Instrument-EFM_DT_v3.pdf

⁴ Concetto di analisi, vedi www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/20160714_Auswertungskonzept_EP_DE_Version_6_1_final.pdf

meglio per confronti in seno al loro tipo e per ottimizzazioni interne. Al momento di interpretare i risultati, è pertanto essenziale considerare la confrontabilità delle rispettive cliniche.

1.2. Risultati

1.2.1. Qualità dei dati

Nel 2015, 65 cliniche su 66 hanno rilevato dati nella psichiatria ospedaliera per adulti. L'analisi comprendeva il periodo dall'inizio della misurazione (1° luglio 2012) alla dimissione (1° gennaio – 31 dicembre 2015).

Rispetto all'anno precedente, nel 2015 la qualità dei dati si presenta come segue. Per quanto riguarda l'HoNOS, è rimasta invariata: analogamente all'anno precedente, l'85% delle cliniche ha raggiunto il tasso di risposta fissato dall'ANQ (80%) di dati analizzabili, rispettivamente di drop-out legittimi. Con la BSCL, il 91% (anno precedente 95%) delle cliniche ha raggiunto un tasso di risposta del 40% di dati analizzabili, rispettivamente di drop-out legittimi. In media, infine, il 99% delle misure restrittive della libertà è stato rilevato correttamente (anno precedente 97%).

Salta all'occhio che soltanto il 28,8% dei casi rilevati con la BSCL abbia potuto essere considerato nell'analisi (anno precedente 29,2%). Con l'HoNOS, questa percentuale sale al 67,8% (anno precedente 65,6%).

1.2.2. Indicatori «peso dei sintomi» e «misure restrittive della libertà» secondo il tipo di clinica

32 cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica acuta

- Dal punto di vista del personale di cura (valore differenziale HoNOS⁵), il 41% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 31% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 28% un risultato inferiore alla media complessiva.
- Dal punto di vista dei pazienti (valore differenziale BSCL⁶), il 9% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo, il 72% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 19% un risultato inferiore alla media complessiva.
- In questo tipo di clinica, per il 7,9% dei pazienti è stata adottata almeno una misura restrittiva della libertà.

24 cliniche specializzate

- Dal punto di vista del personale di cura (valore differenziale HoNOS), il 29% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 38% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 33% un risultato inferiore alla media complessiva.
- Dal punto di vista dei pazienti (valore differenziale BSCL), il 17% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo, il 58% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 12,5% un risultato inferiore alla media complessiva. Il 12,5% delle cliniche aveva meno di trenta casi analizzabili. Per questi istituti non è stata calcolata la significatività.
- In questo tipo di clinica, per lo 0,6% dei pazienti è stata adottata almeno una misura restrittiva della libertà.

⁵ Valore differenziale HoNOS: unità di misura del cambiamento del peso dei sintomi dal punto di vista del personale di cura

⁶ Valore differenziale BSCL: unità di misura del cambiamento del peso dei sintomi dal punto di vista dei pazienti

Nove cliniche per la cura di dipendenze

- Dal punto di vista del personale di cura (valore differenziale HoNOS), il 33% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo di questo tipo di clinica, il 45% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo e il 22% un risultato inferiore alla media complessiva.
- Dal punto di vista dei pazienti (valore differenziale BSCL), l'11% delle cliniche presenta un risultato significativamente superiore al valore medio complessivo e l'89% un risultato che non si discosta dal valore medio complessivo. Nessuna clinica si trova sotto la media complessiva.
- In questo tipo di clinica, per nessun paziente (0%) è stata adottata almeno una misura restrittiva della libertà.

1.3. Commento

Per quanto riguarda il peso dei sintomi, si constata che la media dei risultati è cresciuta di nuovo (vedi [punto 3.5.1](#) Valori medi complessivi non aggiustati). Trattandosi del quarto anno di misurazioni, è lecito supporre che si tratti di una tendenza positiva. Sia dal punto di vista del personale di cura, sia da quello dei pazienti, le cure psichiatriche sono dunque riuscite a ridurre sempre più il peso dei sintomi nel corso della degenza. Ciò dimostra che è stato avviato un processo positivo, al quale le misurazioni della qualità dell'ANQ forniscono impulsi importanti e preziosi. Per entrambi gli strumenti (HoNOS e BSCL), si stanno valutando possibilità di incrementare la qualità dei dati e, in particolare, il tasso di casi da includere.

I dati sulle misure restrittive della libertà abbracciano tre anni di rilevamento. Come ci si attendeva, il tasso di casi rilevati è ulteriormente aumentato⁷, grazie anche alle formazioni e, in parte, al coinvolgimento di un giurista e allo svolgimento di una perizia del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti. Il rilevamento con lo strumento EFM è stato così consolidato in seno alle cliniche. I riscontri e i processi di formazione permetteranno verosimilmente di rafforzare questa tendenza. A tale scopo, è stato costituito un gruppo di esperti.

Importante

Un'interpretazione delle cifre concernenti le misure restrittive della libertà è ammessa solo nel contesto dei concetti delle cliniche. Un basso numero di misure non significa infatti automaticamente una qualità migliore. Alcune cliniche adottano più spesso brevi misure restrittive della libertà, altre puntano su meno misure, ma attuate più a lungo. L'importante è che queste misure siano ponderate, motivate e documentate, e che rispettino le direttive della protezione dei minori e degli adulti.

⁷ In alcune cliniche, il rilevamento è ancora in fase di sviluppo. In singoli casi, dunque, un tasso elevato di misure può semplicemente significare che l'istituto in questione documenta i provvedimenti in modo più ampio. Occorre altresì considerare che si tratta di un'autodichiarazione delle cliniche.

2. Introduzione

Le cliniche psichiatre in Svizzera che hanno aderito al contratto nazionale di qualità rilevano dal 1° luglio 2012 i dati sulla qualità prescritti dall'ANQ. Il rilevamento è effettuato con gli strumenti, nei momenti e secondo le procedure indicati dall'ANQ.

Indicatore	Autovalutazione da parte dei pazienti	Valutazione della persona curante
Statistica medica		
Rilevamento durante la degenza, registrazione al massimo entro due mesi dopo la dimissione		Set dati di base UST Dati supplementari psichiatria UST
Peso dei sintomi		
Viene rilevata la differenza tra l'ammissione e la dimissione per ogni paziente	BSCL (forma abbreviata del questionario SCL-90)	HoNOS
Misure restrittive della libertà		
Vengono rilevate tutte le misure restrittive della libertà		EFM/MRL

Il 14 luglio 2016 (versione 6.1), l'ANQ ha pubblicato il concetto di analisi attualmente in vigore. Tale documento definisce le analisi e i rapporti sui risultati, segnatamente l'annuale rapporto comparativo nazionale concernente le misurazioni dell'anno precedente. Il suo scopo principale è quello di fornire a pazienti, enti finanziatori, fornitori di prestazioni e opinione pubblica le basi per una valutazione comparativa del peso dei sintomi rilevato con l'HoNOS e la BSCL, e delle misure restrittive della libertà.

Il rapporto comparativo nazionale riguardante il 2015 fornisce ragguagli sui risultati delle misurazioni nazionali della qualità dell'ANQ nella psichiatria ospedaliera per adulti e comprende le analisi dei dati di tutti i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Alle misurazioni 2015 hanno preso parte 66 cliniche, 65 delle quali hanno fornito dati.

Le analisi comparative sul peso dei sintomi e il suo cambiamento nel corso della degenza sono integrate nell'attuale rapporto e presentate dal punto di vista del personale di cura (HoNOS) e dei pazienti (BSCL). Il documento comprende altresì i risultati delle misure restrittive della libertà rilevate con lo strumento EFM/MRL e conclusioni sulla qualità dei dati rilevati. Nella parte principale, i risultati centrali sono raffigurati prevalentemente con l'ausilio di diagrammi. L'annesso riporta i valori esatti e ausili per la lettura dei diagrammi, nonché analisi più approfondite, pure sotto forma di diagramma.

I nomi delle cliniche sono sostituiti da numeri. Le cliniche sono ovviamente a conoscenza del numero che le rappresenta. I risultati principali vengono comunicati in forma elettronica e trasparente, come previsto dal concetto di pubblicazione.

3. Confronti tra cliniche sulla qualità dei risultati

Di seguito, sono presentati i risultati essenziali. I risultati della misurazione per HoNOS e BSCL sono aggiustati per le principali variabili confondenti con la procedura descritta al [punto 6.3](#). I risultati concernenti le misure restrittive della libertà sono analizzate senza aggiustamento.

Un risultato terapeutico centrale è il cambiamento del peso dei sintomi tra ammissione e dimissione. Il peso dei sintomi viene rilevato con la valutazione da parte di terzi (responsabile del caso) nel questionario HoNOS e con l'autovalutazione da parte del paziente nel questionario BSCL. L'indicatore è la differenza tra la misurazione al momento dell'ammissione e quella al momento della dimissione. I risultati della misurazione vengono ripuliti dall'influsso delle variabili di disturbo.

Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, le cliniche vengono confrontate tra loro in base al tasso di pazienti per i quali sono stati adottati uno o più di questi provvedimenti.

Ogni clinica è rappresentata dal suo valore medio (HoNOS e BSCL) o dal suo tasso (casi con misure restrittive della libertà) e con l'intervallo di confidenza (IC)⁸ del 95%.

Il riferimento è sempre costituito dai valori residui del peso dei sintomi (HoNOS e BSCL) e dal tasso non aggiustato per le misure restrittive della libertà dell'intero campione con intervallo di confidenza. Una rapida consultazione permette di scoprire se una determinata clinica si trova nella media (la sua barra di errore interseca il riferimento complessivo), al di sotto o al di sopra della media (la barra di errore è completamente sotto o sopra il riferimento complessivo). In più, vengono riferiti i risultati di test di significatività statistica della differenza tra il valore della clinica e il valore dell'intero campione (cfr. diagramma a barre di errore negli [ausili alla lettura](#)). Il risultato dei test di significatività non deve sempre coincidere con la valutazione degli intervalli di confidenza.

3.1.1. Peso dei sintomi

Per entrambe le dimensioni del peso dei sintomi, i valori positivi rivelano una differenza maggiore del peso dei sintomi rispetto alle altre cliniche, quelli negativi un risultato al di sotto delle attese. Un punto dato grigio scuro indica inoltre un risultato della misurazione significativamente superiore alla media in base al livello di significatività definito, un punto dato grigio chiaro un risultato della misurazione significativamente inferiore alla media. Un punto dato grigio indica che il risultato della misurazione della clinica non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media. Le cliniche con meno di trenta casi analizzabili sono contrassegnate con un * e rappresentate con un punto dato bianco senza significatività e intervalli di confidenza, poiché nei campioni di piccole dimensioni la rappresentatività dei dati non è garantita. I valori delle cliniche appaiono in ordine crescente secondo il tasso di risposta. Il valore nominale viene indicato come linea verticale nel diagramma. Il settore per i valori il cui tasso di risposta è insufficiente è blu.

3.1.2. Panoramica dei risultati concernenti il peso dei sintomi

Le tabelle offrono una rapida panoramica degli indicatori di base aggregati nel rapporto comparativo nazionale (con aggiustamento, in base al livello di significatività).

- Valutazione da parte di terzi: valore differenziale HoNOS
- Autovalutazione: valore differenziale BSCL

⁸ Un intervallo di confidenza 95% è una stima statistica e descrive l'intervallo in cui il valore effettivo si pone con una probabilità di errore del 5%. Le misure sono sempre influenzate da accidentalità, per esempio pazienti presenti durante la raccolta dei dati, variazioni stagionali, errori di misura. Pertanto, i valori misurati indicano solo approssimativamente il valore reale. Il valore reale si pone con una probabilità di errore del 5% nell'intervallo di confidenza 95%.

La posizione di una clinica rispetto all'intero campione è segnalata secondo un codice cromatico: per le due dimensioni del peso dei sintomi, un campo grigio scuro indica un risultato della misurazione significativamente superiore alla media in base al livello di significatività definito, un campo grigio chiaro un risultato della misurazione significativamente inferiore alla media. Un campo grigio indica che il risultato della misurazione della clinica non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media. Le cliniche con meno di trenta casi analizzabili sono contrassegnate da un * e rappresentate con un campo bianco (senza significatività). Le cliniche con tasso di risposta inferiore al valore nominale sono contrassegnate da un # e da una cornice blu. La rappresentatività dei loro risultati è dunque limitata.

3.1.3. Misure restrittive della libertà

Queste figure rappresentano il tasso di casi in cui è stata adottata una misura restrittiva della libertà (asse delle Y). Per le misure restrittive della libertà, un punto dato grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva, mentre un punto dato grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente superiore alla media complessiva. Un punto grigio indica che la quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media.

Le analisi sulle misure restrittive della libertà includono solo le cliniche che hanno annunciato almeno un caso e i valori medi sono stati calcolati solo considerando questi casi.

Vengono valutati anche i casi per i quali si dispone di una documentazione lacunosa.

Per le cliniche con meno di trenta casi analizzabili e/o una significatività incerta⁹, non vengono rappresentate le significatività né gli intervalli di confidenza, in quanto campioni troppo piccoli non garantiscono la rappresentatività dei dati. Le relative cifre sono riportate nelle figure e contrassegnate da un *.

Un valore basso non equivale necessariamente a un risultato favorevole, dato che in caso di elevato pericolo per sé stessi o per altre persone l'adozione di misure restrittive della libertà è considerata imprescindibile. Occorre inoltre considerare che le cliniche presentano circostanze differenti (p.es. obbligo di ammissione dei pazienti), un altro aspetto che può influenzare la quota di misure restrittive della libertà. I dati vengono inoltre inviati all'ANQ sotto forma di autodichiarazione delle cliniche: in singoli casi, valori elevati possono anche essere un indicatore di un'ampia documentazione delle misurazioni.

3.1.4. Panoramica dei risultati concernenti le misure restrittive della libertà

La figura della pagina seguente offre una rapida panoramica dei quattro tipi di misura restrittiva della libertà e dell'indicatore di base «Quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà» (non aggiustamento, in base al livello di significatività):

- quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà (FM);
- isolamento (intensità (frequenza*durata)/caso);
- immobilizzazione (intensità (frequenza*durata)/caso);
- medicazione forzata (orale e iniezione, frequenza/caso);
- restrizione movimento (in sedia e a letto, frequenza/caso).

⁹ In caso di significatività incerta, il test «chi²» non è indicato a causa della diversa ripartizione dei tassi tra il valore complessivo delle cliniche e la singola clinica.

Per le misure restrittive della libertà, un campo grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva delle cliniche che hanno registrato almeno una misura restrittiva della libertà, mentre un campo grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente superiore alla media. Un campo grigio indica che la quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante dalla media complessiva.

3.2. Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

3.2.1. Peso dei sintomi




Figura 1: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)




Figura 2: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Clinica	HoNOS	BSCL	Clinica	HoNOS	BSCL
	Risultato della misuraz.	Risultato della misuraz.		Risultato della misuraz.	Risultato della misuraz.
03			35		
06			36		
07	#		37		
08			39		
12			40		
13			42		
17			43		
18			46	#	
21			48		#
22			49		
24			51		
26	#		52		
28			54		
30			56		
32			58		
34			66	#	#

Leggenda
Divergenza significativa verso l'alto
Nessuna divergenza significativa
* < 30 casi validi => significatività non calcolata
Divergenza significativa verso il basso
Tasso di risposta inferiore al 80% (HoNOS) rispettivamente 40% (BSCL)
Nessun dato fornito

Tabella 1: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Al tipo di clinica 1 «Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta» sono state assegnate 32 cliniche.

HoNOS: 13 cliniche hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era superiore alla media dell'intero gruppo).

Nove cliniche hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era inferiore alla media dell'intero gruppo)-

Le altre dieci cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale HoNOS, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

BSCL: Tre cliniche hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era superiore alla media dell'intero gruppo).

Sei cliniche hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era inferiore alla media dell'intero gruppo).

Le altre 23 cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale BSCL, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

3.2.2. Misure restrittive della libertà




Figura 3: misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Cli- nica	MRL	Isolamento	Immo- bilizzazione	Medicazione forzata	Restrizione movimento
	quota di casi affetti	intensità/ caso	intensità/ caso	frequenza/ caso	frequenza/ caso
03					
06				*	*
07					*
08			*		*
12		*		*	
13					
17			*		
18	*			*	
21			*		
22			*		*
24					
26					
28			*		
30			*	*	*
32			*	*	
34					*
35					
36			*	*	*
37			*	*	
39			*		
40			*	*	
42					*
43					
46			*		*
48					*
49					
51			*		*
52			*		*
54			*		
56			*		*
58			*		*
66	*			*	

Leggenda					
FM: divergenza significativa verso il basso					
Nessuna divergenza significativa					
* < 30 casi validi o significatività incicura					
FM: divergenza significativa verso l'alto					
Nessun caso secondo quanto comunicato dalla clinica					
Nessun dato fornito					

Tabella 2: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Tutte le 32 cliniche del tipo «Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta» hanno adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento 2015. Una clinica (26) non ha tuttavia fornito dati.

Nel complesso, il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche di questo tipo (che hanno notificato almeno un caso) è pari al/all'8,3%.

13 cliniche presentano valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la probabilità di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era inferiore alla media dell'intero gruppo, ovvero tutte le cliniche del tipo «Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta»).

Dieci cliniche presentano valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la probabilità di essere interessati da una misura restrittiva della libertà era superiore alla media dell'intero gruppo)¹⁰.

Due cliniche avevano ripartizioni sfavorevoli dei valori, il che può comportare una rappresentatività limitata dei dati e un test di significatività dagli esiti incerti. Per questi istituti non sono stati calcolati significatività e intervalli di confidenza.

Le altre sei cliniche registrano un risultato che non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

Tra le cliniche di questo tipo, il rapporto tra i ricoveri a scopo di assistenza e l'attuazione di una o più misure restrittive della libertà è pari a $\phi = 0.264^{11}$ (significatività <0.001 su ambo i fronti).

¹⁰ I dati vengono inviati all'ANQ sotto forma di autodichiarazione delle cliniche: in singoli casi, valori elevati possono anche essere un indicatore di un'ampia documentazione delle misurazioni.

¹¹ Il coefficiente di correlazione phi abbraccia un settore che va da -1 (rapporto perfettamente negativo: più ricoveri, meno misure, risp. più misure, meno ricoveri) a 0 (nessun rapporto), a +1 (rapporto perfettamente positivo: più ricoveri, più misure, risp. più misure, più ricoveri).

3.3. Tipo di clinica 2: cliniche specializzate

3.3.1. Peso dei sintomi




Figura 4: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (cliniche specializzate)




Figura 5: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (cliniche specializzate)

Clinica	HoNOS	BSCL	Clinica	HoNOS	BSCL
	Risultato della misuraz.	Risultato della misuraz.		Risultato della misuraz.	Risultato della misuraz.
01			44		
02			45		
09			47	#	*
10			50		
14			57		
15			59		
19			60		
23			61		
25	#	#	62		
27		*	63		
29			65	#	#
33			67		*#
38					

Leggenda
Divergenza significativa verso l'alto
Nessuna divergenza significativa
* < 30 casi validi => significatività non calcolata
Divergenza significativa verso il basso
Tasso di risposta inferiore al 80% (HoNOS) rispettivamente 40% (BSCL)
Nessun dato fornito

Tabella 3: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)

Al tipo di clinica 2 «Cliniche specializzate» sono state assegnate 25 cliniche.

Una clinica (14) non ha fornito dati entro il giorno di riferimento.

HoNOS: Sette cliniche hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era superiore alla media dell'intero gruppo).

Otto cliniche hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era inferiore alla media dell'intero gruppo).

Le altre nove cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale HoNOS, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.


BSCL: Quattro cliniche hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era superiore alla media dell'intero gruppo).

Tre cliniche hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era inferiore alla media dell'intero gruppo).

Tre cliniche avevano meno di trenta casi analizzabili. Per questi istituti non sono stati calcolati gli intervalli di confidenza e le significatività, dato che con prove a campione così piccole la rappresentatività dei dati non è garantita.

Le altre 14 cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale BSCL, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

3.3.2. Misure restrittive della libertà



Le cliniche seguenti non hanno fornito dati sulle misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ):

01, 02, 09, 10, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 38, 45, 47, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 67

Figura 6: misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Cli-nica	Isolamento	Isolamento	Immo-bilizzazione	Medicazione forzata	Restrizione movimento	Cli-nica	Isolamento	Isolamento	Immo-bilizzazione	Medicazione forzata	Restrizione movimento
	intensità/ caso	intensità/ caso	intensità/ caso	frequenza/ caso	frequenza/ caso		intensità/ caso	intensità/ caso	intensità/ caso	frequenza/ caso	frequenza/ caso
01						57					
02						59					
09						60					
10						61					
14						62					
15						63		*		*	
19						65					
23						67					
25											
27											
29											
33	*		*	*							
38											
44	*	*			*						
45											
47											
50		*	*	*							

Leggenda

FM: divergenza significativa verso il basso

Nessuna divergenza significativa

* < 30 casi validi o significatività incicura

FM: divergenza significativa verso l'alto

Nessun caso secondo quanto comunicato dalla clinica

Nessun dato fornito

Tabella 4: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Una clinica (14) non ha fornito dati entro il giorno di riferimento.

20 cliniche hanno comunicato che nel periodo di rilevamento 2015 non sono state adottate misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ). Quattro cliniche hanno adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) nel periodo di rilevamento 2015.

Nel complesso, il tasso di casi con almeno una misura restrittiva della libertà in seno alle cliniche di questo tipo (che hanno notificato almeno un caso) è pari al/all'2,4%.

Due cliniche avevano ripartizioni sfavorevoli dei valori, il che può comportare una rappresentatività limitata dei dati e un test di significatività dagli esiti incerti. Per questi istituti non sono stati calcolati significatività e intervalli di confidenza.

Le altre due cliniche registrano un risultato che non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

Tra le cliniche di questo tipo, il rapporto tra i ricoveri a scopo di assistenza e l'attuazione di una o più misure restrittive della libertà è pari a $\phi = 0,117^{12}$ (significatività $<0,001$ su ambo i fronti).

¹² Il coefficiente di correlazione phi abbraccia un settore che va da -1 (rapporto perfettamente negativo: più ricoveri, meno misure, risp. più misure, meno ricoveri) a 0 (nessun rapporto), a +1 (rapporto perfettamente positivo: più ricoveri, più misure, risp. più misure, più ricoveri).

3.4. Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze

3.4.1. Peso dei sintomi




Figura 7: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)




Figura 8: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Clinica	HoNOS	BSCL
	Risultato della misuraz.	Risultato della misuraz.
04	#	
05		
11		
16		
20	#	
31		
53		
55		
68		

Leggenda
Divergenza significativa verso l'alto
Nessuna divergenza significativa
* < 30 casi validi => significatività non calcolata
Divergenza significativa verso il basso
Tasso di risposta inferiore al 80% (HoNOS) rispettivamente 40% (BSCL)
Nessun dato fornito

Tabella 5: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Al tipo di clinica 3 «Cliniche per la cura di dipendenze» sono state assegnate nove cliniche.

HoNOS: Tre cliniche hanno valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era superiore alla media dell'intero gruppo).

Due cliniche hanno valori che divergono significativamente verso il basso rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con l'HoNOS era inferiore alla media dell'intero gruppo).

Le altre quattro cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale HoNOS, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

BSCL: Una clinica ha valori che divergono significativamente verso l'alto rispetto al valore medio complessivo (la riduzione del peso dei sintomi aggiustata per il *case-mix* e rilevata con la BSCL era superiore alla media dell'intero gruppo).

Le altre otto cliniche registrano un risultato che, a livello di valore differenziale BSCL, non si distingue significativamente dal valore medio complessivo.

3.4.2. Misure restrittive della libertà

Secondo le loro indicazioni, nessuna clinica per la cura di dipendenze ha adottato misure restrittive della libertà (come definite dall'ANQ) per i casi del periodo di analisi.

3.5. Confronti annuali della qualità dei risultati

In seguito alle modifiche del metodo di analisi, nel 2015 i confronti con gli anni precedenti sono possibili solo per i risultati non aggiustati.

3.5.1. Risultati della misurazione non aggiustati

La tabella seguente con i risultati non aggiustati mostra che il risultato medio della misurazione con l'HoNOS è passato da 6.36 punti (differenza tra l'HoNOS al momento dell'ammissione e al momento della dimissione con un cambiamento massimo di ± 48 punti) nel 2012 (solo secondo semestre) a 6.43 punti nel 2013, a 7.30 punti nel 2014 e a 7.39 punti nel 2015.

Nell'autovalutazione da parte dei pazienti, invece, la differenza media del peso dei sintomi tra l'ammissione e la dimissione è passata per l'intero campione da 29.78 punti nel 2012 a 30.82 punti nel 2013, a 31.18 punti nel 2014 e a 31.68 punti nel 2015 (differenza tra la BSCL al momento dell'ammissione e al momento della dimissione con un cambiamento massimo di ± 212 punti).

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (tutte le cliniche)

Periodo di rilevamento	Totale	HoNOS ammissione	BSCL ammissione	valore differenziale HoNOS			valore differenziale BSCL		
	Numero	Valore medio	Valore medio	Validi	Valore medio	DS	Validi	Valore medio	DS
2012 (2° sem.)	24460	17.23	65.64	13804	6.36	7.33	5607	29.78	35.62
2013	64648	17.00	66.59	42241	6.43	7.01	18347	30.82	34.75
2014	67214	17.39	67.43	44111	7.30	7.02	19610	31.18	34.04
2015	69066	17.49	67.60	46812	7.39	6.87	19863	31.68	33.34

Tabella 6: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (tutte le cliniche)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Periodo di rilevamento	Totale	HoNOS ammissione	BSCL ammissione	valore differenziale HoNOS			valore differenziale BSCL		
	Numero	Valore medio	Valore medio	Validi	Valore medio	DS	Validi	Valore medio	DS
2015	60304	17.64	68.66	39605	7.46	7.04	14741	32.72	34.13

Tabella 7: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)

Periodo di rilevamento	Totale	HoNOS ammissione	BSCL ammissione	valore differenziale HoNOS			valore differenziale BSCL		
	Numero	Valore medio	Valore medio	Validi	Valore medio	DS	Validi	Valore medio	DS
2015	6873	16.85	69.11	5654	7.69	5.68	3964	31.47	31.57

Tabella 8: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)

Risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Periodo di rilevamento	Totale	HoNOS ammissione	BSCL ammissione	valore differenziale HoNOS			valore differenziale BSCL		
	Numero	Valore medio	Valore medio	Validi	Valore medio	DS	Validi	Valore medio	DS
2015	1889	15.21	44.84	1553	4.68	5.74	1158	19.06	25.66

Tabella 9: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)

Nel 2015, il 7,0% dei pazienti è stato interessato da una o più misure restrittive della libertà. Nel 2014, questa percentuale si fermava al 6,9%, nel 2013 al 6,8%.

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)

Periodo di rilevamento	Quota di casi affetti					
	Totale		Casi senza MRL		Casi con almeno una MRL	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
2013	64648	100.00%	60253	93.2%	4395	6.8%
2014	67214	100.00%	62571	93.1%	4643	6.9%
2015	69066	100.00%	64255	93.0%	4811	7.0%

Tabella 10: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Periodo di rilevamento	Quota di casi affetti					
	Totale		Casi senza MRL		Casi con almeno una MRL	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
2015	60304	100.00%	55536	92.1%	4768	7.9%

Tabella 11: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Periodo di rilevamento	Quota di casi affetti					
	Totale		Casi senza MRL		Casi con almeno una MRL	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
2015	6873	100.00%	6830	99.4%	43	0.6%

Tabella 12: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)

Risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze)

Periodo di rilevamento	Quota di casi affetti					
	Totale		Casi senza MRL		Casi con almeno una MRL	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%
2015	1889	100.00%	1889	100.00%	0	0.0%

Tabella 13: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze)

4. Qualità dei dati

La completezza e la qualità dei dati fondamentali sono importanti per la rappresentatività dei risultati. Per questo, nei diagrammi seguenti viene rappresentata la quota dei casi complessivamente utili per il confronto tra cliniche. Si fa distinzione tra casi analizzabili (barre verdi), *drop-out* documentati correttamente e non influenzabili (p.es. a causa di una dimissione dopo meno di sette giorni dall'ammissione; barre gialle), *drop-out* documentati e influenzabili (barre grigio chiaro), dati lacunosi, ossia disponibili ma non analizzabili (barre grigio scuro) e set di dati mancanti del tutto e senza spiegazione (barre nere). Queste ultime tre categorie sono particolarmente sfavorevoli, mentre i *drop-out* non influenzabili non tangono la buona qualità dei dati.

La valutazione della qualità dei set di dati avviene separatamente per le singole analisi. Un set di dati, per esempio, può essere analizzabile per i confronti tra cliniche sulla base dell'HoNOS, ma non per quelli sulla base della BSCL. È dunque possibile che il numero di casi analizzabili diverga secondo l'analisi e anche secondo il singolo tipo di misura restrittiva della libertà.

4.1. HoNOS

L'ANQ auspica per l'80% dei pazienti in cura questionari HoNOS di ammissione e dimissione analizzabili oppure *drop-out* documentati correttamente e non influenzabili.

Per la valutazione centrale del peso dei sintomi da parte del personale di cura con l'HoNOS, 56 cliniche su 66 (l'85%) hanno raggiunto il tasso dell'80% o più auspicato dall'ANQ di casi per i quali sono stati rilevati e forniti la misurazione al momento dell'ammissione, al momento della dimissione e i dati necessari della statistica medica, oppure documentati come *drop-out* non influenzabili. Tre cliniche hanno documentato sufficientemente meno del 50% dei loro casi e una clinica non ha fornito dati. In alcune cliniche, molti set di dati HoNOS mancano del tutto senza spiegazione.

4.2. BSCL

Per la BSCL, ossia la valutazione del peso dei sintomi da parte dei pazienti, esistono più motivi legittimi per i quali non può essere fornito un set di dati, tra cui la lingua del paziente. Per questo, il numero delle risposte è inferiore. 60 cliniche su 66 (il 91%) hanno raggiunto il valore auspicato dall'ANQ del 40% di coppie di questionari con le necessarie indicazioni sociodemografiche, rispettivamente di *drop-out* non influenzabili documentati correttamente. Il tasso di *drop-out* influenzabili e non influenzabili, e il numero di set di dati non documentati sono in parte ancora molto alti anche per la BSCL.

4.3. Misure restrittive della libertà

Nelle misure restrittive della libertà, 24 cliniche su 35 (il 69%) hanno fornito il 100% delle misure notificate in qualità analizzabile. Nelle altre, mancava una parte delle indicazioni (p.es. la data dell'inizio o l'ora della fine della misura) nello 0,2-70% delle misure.




Figura 9: qualità dei dati: quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS




Figura 10: qualità dei dati: quota di casi analizzabili per calcoli BSCL




Figura 11: qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà

4.4. Confronti annuali della qualità dei dati

4.4.1. Tasso di risposta per l'HoNOS nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 12: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS

4.4.2. Tasso di risposta per la BSCL nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 13: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL

4.4.3. Quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà nell'anno in corso e in quello precedente




Figura 14: confronto annuale della qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le MRL

5. Descrizione prova a campione e *case-mix*

In questo capitolo, si descrive la clientela di pazienti delle singole cliniche oggetto di queste analisi. Oltre al numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento, qui vengono rappresentate tutte le variabili rilevanti per il confronto tra cliniche (vedi [punto 6.3](#)). Inoltre, è rappresentato il punteggio complessivo medio BSCL e HoNOS al momento dell'ammissione.

Queste analisi si riferiscono ai casi effettivamente trattati e documentati senza aggiustamento. Per motivi di chiarezza, la maggior parte delle variabili è comunicata soltanto per l'intero campione dei tre tipi di clinica. [L'annesso A1](#) riporta i valori di tutte le cliniche riferiti a tutte le caratteristiche.

5.1. Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 15: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.2. Età all'ammissione



Figura 16: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.3. Sesso




Figura 17: quota di casi per fascia di sesso nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.4. Diagnosi principale




Figura 18: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 19: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Esempio di lettura: i pazienti della clinica 07 presentano un risultato medio HoNOS all'ammissione di 14 punti (vedi rombo azzurro nella colonna 07), inferiore al punteggio HoNOS all'ammissione dell'entità totale (= 17, linea orizzontale blu). Il risultato medio BSCL all'ammissione dei pazienti della clinica 07 è di 55 punti (vedi cerchio verde nella colonna 07), a sua volta inferiore al punteggio medio BSCL all'ammissione dell'entità totale (= 64, linea orizzontale verde).

5.1.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 20: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.7. Nazionalità




Figura 21: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 22: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.9. Stato civile




Figura 23: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 24: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 25: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.12. Classe di stanza occupata




Figura 26: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.13. Istanza ricoverante




Figura 27: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

5.1.14. Durata della degenza




Figura 28: durata della degenza (in giorni) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

In questo rapporto, la durata della degenza¹³ viene calcolata come segue: data della dimissione-data dell'ammissione-congedo amministrativo). Essa si riferisce solamente a pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 (inizio della misurazione) e dimessi nel periodo di rilevamento (1° gennaio - 31 dicembre 2015). Non può quindi essere superiore a 1278 giorni. Per i pazienti lungodegenti (ammessi a partire dal 1° luglio 2012), la durata della cura potrà essere rappresentata solo in rapporti successivi.

¹³ Sulla scorta della consultazione 2014, la durata della degenza viene descritta anche con il valore medio, oltre che con la mediana. Questi valori sono riportati nella relativa tabella nell'annesso.

5.1.15. Degenze di breve durata



Figura 29: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

5.1.16. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 30: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.1.17. Casi esclusi (BSCL)




Figura 31: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.2. Tipo di clinica 2: cliniche specializzate

5.2.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 32: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche specializzate

5.2.2. Età all'ammissione




Figura 33: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate

5.2.3. Sesso




Figura 34: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate

5.2.4. Diagnosi principale




Figura 35: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate

5.2.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 36: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche specializzate

Esempio di lettura: i pazienti della clinica 15 presentano un risultato medio HoNOS all'ammissione di 12 punti (vedi rombo azzurro nella colonna 15), inferiore al punteggio HoNOS all'ammissione dell'entità totale (= 17, linea orizzontale blu). Il risultato medio BSCL all'ammissione dei pazienti della clinica 15 è di 66.5 punti (vedi cerchio verde nella colonna 15), leggermente superiore al punteggio medio BSCL all'ammissione dell'entità totale (=66, linea orizzontale verde).

5.2.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 37: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate

5.2.7. Nazionalità




Figura 38: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate

5.2.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 39: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate

5.2.9. Stato civile




Figura 40: stato civile nelle cliniche specializzate

5.2.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 41: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate

5.2.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 42: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate

5.2.12. Classe di stanza occupata




Figura 43: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate

5.2.13. Istanza ricoverante




Figura 44: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate

5.2.14. Durata della degenza




Figura 45: durata della degenza (in giorni) nelle cliniche specializzate

In questo rapporto, la durata della degenza¹⁴ viene calcolata come segue: data della dimissione-data dell'ammissione-congedo amministrativo). Essa si riferisce solamente a pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 (inizio della misurazione) e dimessi nel periodo di rilevamento (1° gennaio - 31 dicembre 2015). Non può quindi essere superiore a 1278 giorni. Per i pazienti lungodegenti (am-messi a partire dal 1° luglio 2012), la durata della cura potrà essere rappresentata solo in rapporti successivi.

¹⁴ Sulla scorta della consultazione 2014, la durata della degenza viene descritta anche con il valore medio, oltre che con la mediana. Questi valori sono riportati nella relativa tabella nell'annesso.

5.2.15. Degenze di breve durata




Figura 46: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

5.2.16. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 47: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche specializzate

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.2.17. Casi esclusi (BSCL)




Figura 48: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche specializzate

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.3. Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze

5.3.1. Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento




Figura 49: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.2. Età all'ammissione




Figura 50: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.3. Sesso




Figura 51: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.4. Diagnosi principale




Figura 52: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.5. Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS e BSCL)




Figura 53: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

Esempio di lettura: i pazienti della clinica 20 presentano un risultato medio HoNOS all'ammissione di 12 punti (vedi rombo azzurro nella colonna 20), inferiore al punteggio HoNOS all'ammissione dell'entità totale (= 15, linea orizzontale blu). Il risultato medio BSCL all'ammissione dei pazienti della clinica 20 è di 52 punti (vedi cerchio verde nella colonna 20), superiore al punteggio medio BSCL all'ammissione dell'entità totale (= 36, linea orizzontale verde).

5.3.6. Ricovero a fini assistenziali




Figura 54: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.7. Nazionalità




Figura 55: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.8. Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa




Figura 56: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.9. Stato civile




Figura 57: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.10. Occupazione prima dell'ammissione




Figura 58: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.11. Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 59: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.12. Classe di stanza occupata



Figura 60: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.13. Istanza ricoverante




Figura 61: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze

5.3.14. Durata della degenza




Figura 62: durata della degenza (in giorni) nelle cliniche per la cura di dipendenze

In questo rapporto, la durata della degenza¹⁵ viene calcolata come segue: data della dimissione-data dell'ammissione-congedo amministrativo). Essa si riferisce solamente a pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 (inizio della misurazione) e dimessi nel periodo di rilevamento (1° gennaio - 31 dicembre 2015). Non può quindi essere superiore a 1278 giorni. Per i pazienti lungodegenti (am-messi a partire dal 1°luglio 2012), la durata della cura potrà essere rappresentata solo in rapporti successivi.

5.3.15. Degenze di breve durata




Figura 63: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

¹⁵ Sulla scorta della consultazione 2014, la durata della degenza viene descritta anche con il valore medio, oltre che con la mediana. Questi valori sono riportati nella relativa tabella nell'annesso.

5.3.16. Casi esclusi (HoNOS)




Figura 64: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

5.3.17. Casi esclusi (BSCL)




Figura 65: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati BSCL lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), i *drop-out* e/o quelli riguardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.

6. Metodi

La procedura metodica è stata sviluppata dall'istituto di analisi in stretto coordinamento con il Comitato dell'ANQ per la qualità Psichiatria, sulla base delle direttive dell'ANQ e dello stato della scienza e delle esperienze derivanti da altri sistemi di gestione della qualità (cfr. p.es. BQS, procedure GQ Reha, [Kuhl et al. 2008](#)). Si è inoltre fatto ricorso alle esperienze acquisite con le misurazioni nazionali per perfezionare la metodica, ove necessario. Le esperienze saranno usate anche per migliorare le direttive per l'attuazione e per la qualità dei dati, e per ottimizzare l'*inter-rater reliability* tramite formazioni e altre misure di accompagnamento.

6.1. Procedura

Il rilevamento dei dati è responsabilità delle cliniche, le quali si rifanno alle direttive dell'ANQ riportate nei documenti «Manuale per rilevatori» e «Definizione dei dati». La qualità dei dati forniti è decisiva per avere analisi significative e affidabili. Le cliniche sono state informate dall'ANQ in occasione di incontri di formazione e tramite diversi documenti, una newsletter e un sito internet con domande frequenti (FAQ) in merito a fondamenti, svolgimento e aspetti tecnici del rilevamento, della gestione e del trasferimento dei dati. Hanno altresì beneficiato della consulenza dell'istituto di analisi riguardo al rilevamento e alla fornitura dei dati, mentre nel novembre 2012 e da marzo 2013 hanno ricevuto analisi semestrali sulla qualità dei dati con proposte per l'ottimizzazione. Questi riscontri contenevano, oltre alle informazioni sulla completezza dei set di dati parziali forniti e la loro analizzabilità per i confronti nazionali tra cliniche, anche le indicazioni sul potenziale di miglioramento della qualità dei dati.

Nelle cliniche vengono rilevati cinque set di dati riferiti ai casi:

- indicazioni generali e set minimo di dati UST (definiti dall'UST);
- dati supplementari psichiatria UST (definiti dall'UST);
- peso dei sintomi come valutazione da parte di terzi con il questionario di documentazione del caso Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Adults al momento dell'ammissione e della dimissione ([Wing et al., 1998](#));
- peso dei sintomi come autovalutazione con il questionario dei pazienti Brief Symptom Checklist BSCL al momento dell'ammissione e della dimissione (precedente denominazione: Brief Symptom Inventory BSI, forma abbreviata della checklist dei sintomi SCL-90; [Derogatis & Melisaratos, 1983](#));
- misure restrittive della libertà con il questionario di documentazione del caso EFM/MRL (sviluppato dall'ANQ sulla base dello strumento costrizione BM secondo il progetto pilota ANQ ([ANQ, 2011](#)) e il benchmark ZM regione Lago di Costanza ([Martin et al., 2007](#)) integrato con item specifici della gerontopsichiatria). Si rilevano isolamenti, immobilizzazioni, medicazioni forzate e misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto.

Un importante fattore per la qualità della cura è il cambiamento del peso dei sintomi, misurato sia con l'HoNOS sia con la BSCL. Altri outcome sono la frequenza, rispettivamente l'intensità dei diversi tipi di misure restrittive della libertà.

La definizione del caso corrisponde a quella dell'Ufficio federale di statistica.¹⁶ L'unità di rilevamento è un caso di cura. Le cliniche forniscono dati per tutti i pazienti adulti trattati in ospedali psichiatrici nel periodo di rilevamento. Per l'analisi attuale sono stati considerati i pazienti ammessi dal 1° luglio 2012 e dimessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, poiché i dati delle misurazioni sia all'ammissione sia

¹⁶ http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/inforthek/erhebungen_quellen/blank/blank/mkh/02.Document.90752.pdf

alla dimissione erano disponibili solo per questi pazienti e quindi solo per questi si potevano calcolare i valori dei risultati delle misurazioni.

Le degenze inferiori agli otto giorni sono considerate nei rilevamenti ANQ ma, nell'impossibilità di svolgere misurazioni significative al momento della dimissione con gli strumenti HoNOS e BSCL, vengono escluse dai confronti tra cliniche.

Per l'aggiustamento dei risultati è necessario disporre, oltre che delle misurazioni del peso dei sintomi all'ammissione e alla dimissione, anche dei dati per le variabili confondenti rilevanti. Dall'analisi sono stati esclusi i casi senza valori per i predittori potenzialmente importanti (età, sesso, gruppo di diagnosi, gravità all'ammissione (HoNOS o BSCL)). Le variabili di categoria come i gruppi di diagnosi sono stati trasformati in variabili dummy. Le analisi statistiche sono state eseguite con il software IBM SPSS Statistics versione 23 (IBM Corp., 2015).

Tutte le cliniche partecipanti sono state inserite nel confronto nazionale, indipendentemente dal numero di casi trattati o documentati. Una clinica con un numero basso di casi ben documentati viene resa distinguibile nei diagrammi a causa del maggiore grado di incertezza dei risultati calcolati.

Oltre al rapporto comparativo nazionale, le cliniche ricevono un rapporto specifico non pubblico con ulteriori analisi non aggiustate.

6.2. Analisi secondo il tipo di clinica

L'analisi è stratificata secondo tre tipi di clinica. I nove criteri per l'assegnazione ai gruppi sono stati definiti da un gruppo di esperti dell'ANQ¹⁷.

- Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta (soddisfano tutti i 9 criteri)
- Cliniche specializzate (<9 criteri)
- Cliniche per la cura di dipendenze (>90% diagnosi principale F1 (dipendenza))

6.3. Analisi variabili confondenti

Con l'analisi delle variabili confondenti si è appurato quali caratteristiche dei pazienti dovevano essere considerate confondenti, poiché avevano un'influenza sostanziale sul risultato delle misurazioni e quindi - se le cliniche differivano nella composizione dei loro pazienti per quanto riguarda le relative variabili - avrebbero potuto portare a distorsioni dei confronti tra cliniche. Sulla scorta di ponderazioni contenutistiche, è stato stilato un elenco di caratteristiche dei pazienti e dei casi, e ne è stata valutata l'influenza sul risultato della misurazione.

Tra le variabili dei set di dati rilevati, le seguenti sono state identificate come potenzialmente rilevanti:

- età all'ammissione;
- sesso;
- diagnosi principale;
- gravità della malattia al momento dell'ammissione (HoNOS, risp. BSCL);
- ricovero a fini assistenziali;
- nazionalità;
- formazione scolastica o professionale più elevata conclusa;
- stato civile;
- occupazione prima dell'ammissione;

¹⁷ V. concetto di analisi ANQ misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti, versione 6.1

- luogo di soggiorno prima dell'ammissione;
- classe die stanza occupata (comune, semiprivato, privato);
- istanza ricoverante;
- durata della degenza.

6.3.1. Tipo di clinica 1: fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS

Per il risultato della misurazione rilevato con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): età; HoNOS complessivo (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F0, F1, F4, F5, F6, F7, F8, F99, altro); nazionalità; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, lavoro domestico nella propria economia domestica, in formazione, programma di riabilitazione, AI/AVS o rendita); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (nessuna, scuola dell'obbligo, scuola specializzata o professionale superiore, sconosciuto); stato civile (coniugato/a convivente, coniugato/a separato/a, divorziato/a); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (domicilio con assistenza SPITEX, casa di cura, casa per anziani, clinica psichiatrica, altro); classe die stanza occupata (semiprivato o privato); istanza ricoverante (paziente stesso/familiare, sconosciuto); durata della degenza. Nel complesso, le variabili hanno chiarito il 34,5% della varianza.

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

Per il risultato della misurazione rilevato con la BSCL, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): età; BSCL complessiva (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F1, F2, F4, F6); nazionalità; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, AI/AVS o rendita); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (nessuno, scuola dell'obbligo, sconosciuto); stato civile (vedovo/a); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (casa di cura, casa per anziani, clinica psichiatrica); classe die stanza occupata (semiprivato). I predittori considerati hanno chiarito il 37,0% della varianza.

6.3.2. Tipo di clinica 2: cliniche specializzate

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS

Per il risultato della misurazione rilevato con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): HoNOS complessivo (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F8); ricovero a fini assistenziali; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, lavoro domestico nella propria economia domestica, AI/AVS o rendita); stato civile (coniugato/a convivente); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (casa per anziani, altro stabilimento ospedaliero, altro); classe die stanza occupata (semiprivato o privato); istanza ricoverante (paziente stesso/familiare); durata della degenza. Nel complesso, le variabili hanno chiarito il 29,8% della varianza.

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

Per il risultato della misurazione rilevato con la BSCL, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): BSCL complessiva (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F1, F2); nazionalità; occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno, sconosciuto); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (nessuno, scuola dell'obbligo); classe die stanza occupata (semiprivato o privato); istanza ricoverante (autorità giudiziarie). I predittori considerati hanno chiarito il 32,3% della varianza.

6.3.3. Tipo di clinica 3: cliniche per la cura di dipendenze

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale HoNOS

Per il risultato della misurazione rilevato con l'HoNOS, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): HoNOS complessivo (valore all'ammissione); occupazione prima dell'ammissione (occupato a tempo parziale, occupato a tempo pieno); formazione scolastica o professionale più elevata conclusa (scuola dell'obbligo); stato civile (coniugato/a convivente); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (altro stabilimento ospedaliero); durata della degenza. Nel complesso, le variabili hanno chiarito il 35,1% della varianza.

Risultato della misurazione del peso dei sintomi: valore differenziale BSCL

Per il risultato della misurazione rilevato con la BSCL, le variabili seguenti hanno avuto un'influenza statisticamente significativa (livello di significatività $\alpha < 0,01$): BSCL complessiva (valore all'ammissione); appartenenza a singoli gruppi di diagnosi (F1, F6); luogo di soggiorno prima dell'ammissione (domicilio con assistenza SPITEX, casa di cura); stanza ricoverante (servizio sociosanitario). I predittori considerati hanno chiarito il 44,0% della varianza.

6.3.4. Valutazione complessiva

Per l'aggiustamento dei risultati, tutte le variabili potenzialmente rilevanti sono state inserite nei modelli di regressione finali, dato che singoli predittori, pur non esercitando un'influenza statisticamente significativa sull'outcome nell'intero campione, risultavano significativi per singole cliniche.

6.4. Aggiustamento secondo il rischio per i confronti tra cliniche

Al fine di consentire confronti quanto più equi possibile della qualità dei risultati del peso dei sintomi, i parametri outcome calcolati a tale scopo devono essere ripuliti dall'influenza delle variabili confondenti sulle quali la clinica non può agire. È il caso in primis della composizione del collettivo di pazienti in cura, il cosiddetto *case-mix*. I risultati ripuliti dall'influenza delle variabili confondenti sono definiti "aggiustati" (cfr. al riguardo [Farin et al., 2005](#); [Iezzoni, 1995, 2004](#)). Il rapporto comprende anche i risultati non aggiustati per rappresentare gli outcome delle cliniche con il loro *case-mix* effettivo.

L'aggiustamento secondo il rischio è effettuato con una procedura analitica della regressione: con l'ausilio dei dati dell'intero campione, viene stimato il valore atteso per ogni singolo caso in base alla caratteristica delle variabili confondenti. Questo valore è confrontato con il valore effettivo del risultato di ogni caso di cura. La differenza rappresenta il "valore residuo", ossia ciò che rimane dopo avere eliminato le influenze delle variabili confondenti dai valori grezzi ottenuti. I valori così calcolati sono confrontabili per diverse cliniche in quanto tengono in considerazione le particolarità della struttura dei pazienti.

Per la rappresentazione dei risultati dei confronti tra cliniche si opta per diagrammi a barre di errore: sull'asse delle ordinate y figura la differenza tra il risultato atteso e quello effettivo della cura di ciascuna clinica (valori residui standardizzati). Per ogni clinica, il valore medio del valore residuo di tutti i suoi casi è rappresentato con l'intervallo di confidenza 95%. Il riferimento è costituito dal valore residuo medio dell'intero campione, che per motivi di semplificazione del calcolo ha sempre il valore "0", con il suo intervallo di confidenza 95% ([Brandstätter, 1999](#); [Cumming & Finch, 2005](#); cfr. esempio di lettura «Diagramma a barre di errore» nell'annesso «[Ausili alla lettura](#)»).

6.5. Significatività delle differenze tra valore della clinica e valore normale

Per agevolare l'interpretazione dei risultati, sono stati calcolati i valori medi dei risultati delle cliniche, gli intervalli di confidenza e l'eventuale divergenza statisticamente significativa dei valori delle cliniche rispetto al valore medio svizzero. A tale scopo, per ogni valore (valore medio dei residui standardizzati

di tutti i casi analizzabili della clinica in questione) è stato effettuato un test t per verificare se tale valore diverge con una sicurezza di almeno il 95% dal valore medio complessivo dei residui standardizzati (valore 0). Per quanto riguarda le misure restrittive della libertà, sono stati calcolati test χ^2 , i quali confrontano il tasso di casi nella rispettiva clinica con quello di tutte le cliniche del tipo in questione.

Il livello di significatività è stato fissato a $\alpha_{\text{test}} \leq 0.05$. Per le cliniche con pochissimi casi oppure con ripartizioni sfavorevoli dei valori non sono stati svolti test di significatività.

Indice figurativo

Figura 1: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	14
Figura 2: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	14
Figura 3: misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)	16
Figura 4: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (cliniche specializzate).....	18
Figura 5: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (cliniche specializzate)	18
Figura 6: misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)	20
Figura 7: peso dei sintomi con il valore differenziale HoNOS (cliniche per la cura di dipendenze)	22
Figura 8: peso dei sintomi con il valore differenziale BSCL (cliniche per la cura di dipendenze).....	22
Figura 9: qualità dei dati: quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS.....	27
Figura 10: qualità dei dati: quota di casi analizzabili per calcoli BSCL	28
Figura 11: qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le misure restrittive della libertà	29
Figura 12: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli HoNOS	30
Figura 13: confronto annuale della qualità dei dati: tasso di risposta per calcoli BSCL	31
Figura 14: confronto annuale della qualità dei dati: quota di registrazioni documentate correttamente per le MRL.....	32
Figura 15: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	34
Figura 16: quota di casi per fascia di età nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	34
Figura 17: quota di casi per fascia di sesso nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	35
Figura 18: quota di casi per fascia di diagnosi principale nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	35
Figura 19: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	36
Figura 20: ricovero a fini assistenziali nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	36
Figura 21: quota di casi per fascia di nazionalità nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	37
Figura 22: distribuzione dell'istruzione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	37
Figura 23: stato civile nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	38
Figura 24: occupazione prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	38
Figura 25: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	39
Figura 26: classe di stanza occupata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	39

Figura 27: istanza ricoverante nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	40
Figura 28: durata della degenza (in giorni) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta..	41
Figura 29: quota di degenze di breve durata nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	42
Figura 30: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	42
Figura 31: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	42
Figura 32: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche specializzate.....	43
Figura 33: quota di casi per fascia di età nelle cliniche specializzate	43
Figura 34: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche specializzate	44
Figura 35: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche specializzate.....	44
Figura 36: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche specializzate	45
Figura 37: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche specializzate.....	45
Figura 38: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche specializzate.....	46
Figura 39: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche specializzate.....	46
Figura 40: stato civile nelle cliniche specializzate.....	47
Figura 41: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate.....	47
Figura 42: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche specializzate.....	48
Figura 43: classe di stanza occupata nelle cliniche specializzate	48
Figura 44: istanza ricoverante nelle cliniche specializzate	49
Figura 45: durata della degenza (in giorni) nelle cliniche specializzate.....	50
Figura 46: quota di degenze di breve durata nelle cliniche specializzate	51
Figura 47: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche specializzate	51
Figura 48: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche specializzate	51
Figura 49: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento nelle cliniche per la cura di dipendenze	52
Figura 50: quota di casi per fascia di età nelle cliniche per la cura di dipendenze	52
Figura 51: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche per la cura di dipendenze	52
Figura 52: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche per la cura di dipendenze	53
Figura 53: gravità all'ammissione (punteggio totale HoNOS e BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze	53
Figura 54: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche per la cura di dipendenze	54
Figura 55: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche per la cura di dipendenze	54
Figura 56: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche per la cura di dipendenze	55
Figura 57: stato civile nelle cliniche per la cura di dipendenze	55

Figura 58: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze	56
Figura 59: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche per la cura di dipendenze	56
Figura 60: classe di stanza occupata nelle cliniche per la cura di dipendenze	57
Figura 61: istanza ricoverante nelle cliniche per la cura di dipendenze	57
Figura 62: durata della degenza (in giorni) nelle cliniche per la cura di dipendenze	58
Figura 63: quota di degenze di breve durata nelle cliniche per la cura di dipendenze.....	58
Figura 64: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze	59
Figura 65: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze	59
Figura 66: quota di casi per fascia di età nelle cliniche	73
Figura 67: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche	76
Figura 68: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche.....	79
Figura 69: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche	84
Figura 70: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche	87
Figura 71: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche	90
Figura 72: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche	93
Figura 73: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche	96
Figura 74: stato civile nelle cliniche	101
Figura 75: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche.....	106
Figura 76: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche.....	109
Figura 77: classe di stanza occupata nelle cliniche.....	116
Figura 78: istanza ricoverante nelle cliniche	119
Figura 79: quota di degenze di breve durata nelle cliniche	126
Figura 80: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS).....	129
Figura 81: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)	132

Indice delle tabelle

Tabella 1: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	15
Tabella 2: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	16
Tabella 3: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)	19
Tabella 4: panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà (cliniche specializzate)	20
Tabella 5: panoramica tabellare generale HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	23
Tabella 6: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (tutte le cliniche)	24
Tabella 7: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	24
Tabella 8: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche specializzate)	24
Tabella 9: risultati della misurazione non aggiustati: HoNOS e BSCL (cliniche per la cura di dipendenze)	24
Tabella 10: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (tutte le cliniche)	25
Tabella 11: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta).....	25
Tabella 12: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche specializzate).....	25
Tabella 13: risultati della misurazione non aggiustati: Misure restrittive della libertà (cliniche per la cura di dipendenze).....	25
Tabella 14: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento	72
Tabella 15: quota di casi per fascia di età nelle cliniche.....	75
Tabella 16: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche.....	78
Tabella 17: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi).....	81
Tabella 18: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)	83
Tabella 19: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche.....	86
Tabella 20: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche	89
Tabella 21: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche	92
Tabella 22: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche	95
Tabella 23: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi).....	98
Tabella 24: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)	100
Tabella 25: stato civile nelle cliniche (numero di casi).....	103
Tabella 26: stato civile nelle cliniche (quota di casi)	105
Tabella 27: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi).....	108
Tabella 28: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)	112

Tabella 29: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)	115
Tabella 30: classe di stanza occupata nelle cliniche	118
Tabella 31: istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)	121
Tabella 32: istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi).....	123
Tabella 33: durata della degenza nelle cliniche	125
Tabella 34: quota di degenze di breve durata nelle cliniche.....	128
Tabella 35: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)	131
Tabella 36: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL).....	134
Tabella 37: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	135
Tabella 38: test di significatività: (valore differenziale HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	136
Tabella 39: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	137
Tabella 40: test di significatività: (valore differenziale BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	138
Tabella 41: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	139
Tabella 42: Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	142
Tabella 43: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	143
Tabella 44: test di significatività: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	144
Tabella 45: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	145
Tabella 46: test di significatività: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	146
Tabella 47: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta.....	147
Tabella 48: test di significatività: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	148
Tabella 49: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	149
Tabella 50: test di significatività: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	150
Tabella 51: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nelle cliniche specializzate	151
Tabella 52: test di significatività: (valore differenza HoNOS) nelle cliniche specializzate	152
Tabella 53: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nelle cliniche specializzate.....	153

Tabella 54: test di significatività: (valore differenza BSCL) nelle cliniche specializzate.....	154
Tabella 55: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate.....	155
Tabella 56: Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti) nelle cliniche specializzate	155
Tabella 57: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nelle cliniche specializzate	156
Tabella 58: Test di significatività: isolamento (intensità) nelle cliniche specializzate.....	156
Tabella 59: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate....	157
Tabella 60: Test di significatività: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate	157
Tabella 61: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate	158
Tabella 62: Test di significatività: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate	158
Tabella 63: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate	159
Tabella 64: Test di significatività: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate	159
Tabella 65: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nelle cliniche per la cura di dipendenze	160
Tabella 66: test di significatività: (valore differenza HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze	160
Tabella 67: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nelle cliniche per la cura di dipendenze	161
Tabella 68: test di significatività: (valore differenza BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze	161
Tabella 69: qualità dei dati per HoNOS totale (quota di casi)	163
Tabella 70: qualità dei dati per HoNOS totale (numero di casi).....	165
Tabella 71: qualità dei dati per BSCL totale (quota di casi).....	167
Tabella 72: qualità dei dati per BSCL totale (numero di casi).....	169
Tabella 73: qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso	170

Annesso

L'annesso contiene tabelle con i valori numerici relativi Tutti analisi descritte nella parte principale, altri diagrammi più dettagliati, ausilii alla lettura, glossario e la bibliografia citata.

A1. Informazioni generali in riguardo alla fornitura dati

Numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento

		Numero Casi				Numero Casi	
		Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1. - 31.12.2015 («Completo»)				Ammissione a partire dal 1.7.2012, dimissione fino a 1.1. - 31.12.2015 («Completo»)	
		Numero				Numero	
	Tutti		69066				6873
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale		60304	Cliniche specializzate	Totale		6873
	03		3082		01		714
	06		715		02		435
	07		963		09		81
	08		2738		10		58
	12		760		14		.
	13		2462		15		138
	17		1284		19		288
	18		263		23		530
	21		1871		25		193
	22		3016		27		140
	24		2203		29		330
	26		3030		33		229
	28		1778		38		365
	30		2325		44		380
	32		780		45		181
	34		1268		47		124
	35		2191		50		435
	36		609		57		489
	37		1898		59		213
	39		1957		60		326
	40		1606		61		180
	42		973		62		37
	43		1386		63		751
	46		3913		65		210
	48		1061		67		46
	49		1727	Cliniche per la cura di dipendenze	Totale		1889
	51		1301		04		167
	52		5141		05		157
	54		3108		11		389
	56		2467		16		263
	58		2010		20		147
	66		418		31		83
					53		134
					55		492
					68		57

Tabella 14: numero di casi conclusi nel periodo di rilevamento

Età all'ammissione




Figura 66: quota di casi per fascia di età nelle cliniche

Quota di casi per fascia di età nelle cliniche

	Età all'ammissione								
	fino 17 anni		18 - 64 anni		da 65 anni		Indicazione mancata		
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
Tutti	674	1.0%	57607	83.4%	10783	15.6%	2	.0%	
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	529	.9%	49966	82.9%	9807	16.3%	2	.0%
03	11	.4%	2373	77.0%	698	22.6%	0	0.0%	
06	6	.8%	584	81.7%	125	17.5%	0	0.0%	
07	4	.4%	828	86.0%	131	13.6%	0	0.0%	
08	0	0.0%	2362	86.3%	376	13.7%	0	0.0%	
12	2	.3%	657	86.4%	101	13.3%	0	0.0%	
13	3	.1%	1963	79.7%	494	20.1%	2	.1%	
17	0	0.0%	1096	85.4%	188	14.6%	0	0.0%	
18	1	.4%	231	87.8%	31	11.8%	0	0.0%	
21	3	.2%	1468	78.5%	400	21.4%	0	0.0%	
22	3	.1%	2576	85.4%	437	14.5%	0	0.0%	
24	36	1.6%	1792	81.3%	375	17.0%	0	0.0%	
26	28	.9%	2525	83.3%	477	15.7%	0	0.0%	
28	49	2.8%	1447	81.4%	282	15.9%	0	0.0%	
30	0	0.0%	2057	88.5%	268	11.5%	0	0.0%	
32	8	1.0%	561	71.9%	211	27.1%	0	0.0%	
34	4	.3%	1088	85.8%	176	13.9%	0	0.0%	
35	12	.5%	1874	85.5%	305	13.9%	0	0.0%	
36	11	1.8%	513	84.2%	85	14.0%	0	0.0%	
37	31	1.6%	1519	80.0%	348	18.3%	0	0.0%	
39	9	.5%	1554	79.4%	394	20.1%	0	0.0%	
40	14	.9%	1466	91.3%	126	7.8%	0	0.0%	
42	6	.6%	799	82.1%	168	17.3%	0	0.0%	
43	29	2.1%	1107	79.9%	250	18.0%	0	0.0%	
46	19	.5%	3228	82.5%	666	17.0%	0	0.0%	
48	12	1.1%	883	83.2%	166	15.6%	0	0.0%	
49	0	0.0%	1427	82.6%	300	17.4%	0	0.0%	
51	4	.3%	1083	83.2%	214	16.4%	0	0.0%	
52	68	1.3%	4406	85.7%	667	13.0%	0	0.0%	
54	68	2.2%	2567	82.6%	473	15.2%	0	0.0%	
56	39	1.6%	2026	82.1%	402	16.3%	0	0.0%	
58	49	2.4%	1606	79.9%	355	17.7%	0	0.0%	
66	0	0.0%	300	71.8%	118	28.2%	0	0.0%	
Cliniche specializzate	Totale	120	1.7%	5833	84.9%	920	13.4%	0	0.0%
01	0	0.0%	632	88.5%	82	11.5%	0	0.0%	
02	4	.9%	376	86.4%	55	12.6%	0	0.0%	
09	12	14.8%	67	82.7%	2	2.5%	0	0.0%	
10	5	8.6%	53	91.4%	0	0.0%	0	0.0%	
14	
15	1	.7%	112	81.2%	25	18.1%	0	0.0%	
19	6	2.1%	257	89.2%	25	8.7%	0	0.0%	
23	10	1.9%	464	87.5%	56	10.6%	0	0.0%	
25	21	10.9%	165	85.5%	7	3.6%	0	0.0%	

	Età all'ammissione								
	fino 17 anni		18 - 64 anni		da 65 anni		Indicazione mancata		
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
27	2	1.4%	123	87.9%	15	10.7%	0	0.0%	
29	0	0.0%	325	98.5%	5	1.5%	0	0.0%	
33	9	3.9%	197	86.0%	23	10.0%	0	0.0%	
38	0	0.0%	328	89.9%	37	10.1%	0	0.0%	
44	4	1.1%	272	71.6%	104	27.4%	0	0.0%	
45	0	0.0%	136	75.1%	45	24.9%	0	0.0%	
47	21	16.9%	103	83.1%	0	0.0%	0	0.0%	
50	20	4.6%	372	85.5%	43	9.9%	0	0.0%	
57	0	0.0%	412	84.3%	77	15.7%	0	0.0%	
59	0	0.0%	207	97.2%	6	2.8%	0	0.0%	
60	0	0.0%	243	74.5%	83	25.5%	0	0.0%	
61	0	0.0%	149	82.8%	31	17.2%	0	0.0%	
62	3	8.1%	34	91.9%	0	0.0%	0	0.0%	
63	1	.1%	615	81.9%	135	18.0%	0	0.0%	
65	0	0.0%	153	72.9%	57	27.1%	0	0.0%	
67	1	2.2%	38	82.6%	7	15.2%	0	0.0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	25	1.3%	1808	95.7%	56	3.0%	0	0.0%
04	22	13.2%	145	86.8%	0	0.0%	0	0.0%	
05	0	0.0%	154	98.1%	3	1.9%	0	0.0%	
11	0	0.0%	366	94.1%	23	5.9%	0	0.0%	
16	1	.4%	260	98.9%	2	.8%	0	0.0%	
20	0	0.0%	147	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
31	0	0.0%	79	95.2%	4	4.8%	0	0.0%	
53	2	1.5%	132	98.5%	0	0.0%	0	0.0%	
55	0	0.0%	474	96.3%	18	3.7%	0	0.0%	
68	0	0.0%	51	89.5%	6	10.5%	0	0.0%	

Tabella 15: quota di casi per fascia di età nelle cliniche

Sesso




Figura 67: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

Quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

		Sesso					
		Uomo		Donna		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
	Tutti	33724	48.8%	35340	51.2%	2	.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	30066	49.9%	30236	50.1%	2	.0%
	03	1588	51.5%	1494	48.5%	0	0.0%
	06	356	49.8%	359	50.2%	0	0.0%
	07	468	48.6%	495	51.4%	0	0.0%
	08	1370	50.0%	1368	50.0%	0	0.0%
	12	269	35.4%	491	64.6%	0	0.0%
	13	1305	53.0%	1155	46.9%	2	.1%
	17	645	50.2%	639	49.8%	0	0.0%
	18	108	41.1%	155	58.9%	0	0.0%
	21	940	50.2%	931	49.8%	0	0.0%
	22	1399	46.4%	1617	53.6%	0	0.0%
	24	1157	52.5%	1046	47.5%	0	0.0%
	26	1541	50.9%	1489	49.1%	0	0.0%
	28	908	51.1%	870	48.9%	0	0.0%
	30	1273	54.8%	1052	45.2%	0	0.0%
	32	378	48.5%	402	51.5%	0	0.0%
	34	669	52.8%	599	47.2%	0	0.0%
	35	1133	51.7%	1058	48.3%	0	0.0%
	36	322	52.9%	287	47.1%	0	0.0%
	37	995	52.4%	903	47.6%	0	0.0%
	39	974	49.8%	983	50.2%	0	0.0%
	40	660	41.1%	946	58.9%	0	0.0%
	42	449	46.1%	524	53.9%	0	0.0%
	43	782	56.4%	604	43.6%	0	0.0%
	46	1892	48.4%	2021	51.6%	0	0.0%
	48	505	47.6%	556	52.4%	0	0.0%
	49	785	45.5%	942	54.5%	0	0.0%
	51	665	51.1%	636	48.9%	0	0.0%
	52	2704	52.6%	2437	47.4%	0	0.0%
	54	1506	48.5%	1602	51.5%	0	0.0%
	56	1172	47.5%	1295	52.5%	0	0.0%
	58	964	48.0%	1046	52.0%	0	0.0%
	66	184	44.0%	234	56.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	2293	33.4%	4580	66.6%	0	0.0%
	01	265	37.1%	449	62.9%	0	0.0%
	02	152	34.9%	283	65.1%	0	0.0%
	09	14	17.3%	67	82.7%	0	0.0%
	10	42	72.4%	16	27.6%	0	0.0%
	14
	15	56	40.6%	82	59.4%	0	0.0%
	19	75	26.0%	213	74.0%	0	0.0%
	23	185	34.9%	345	65.1%	0	0.0%
	25	80	41.5%	113	58.5%	0	0.0%
	27	70	50.0%	70	50.0%	0	0.0%
	29	146	44.2%	184	55.8%	0	0.0%

	Sesso						
	Uomo		Donna		Indicazione mancata		
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
33	113	49.3%	116	50.7%	0	0.0%	
38	104	28.5%	261	71.5%	0	0.0%	
44	197	51.8%	183	48.2%	0	0.0%	
45	77	42.5%	104	57.5%	0	0.0%	
47	4	3.2%	120	96.8%	0	0.0%	
50	0	0.0%	435	100.0%	0	0.0%	
57	183	37.4%	306	62.6%	0	0.0%	
59	63	29.6%	150	70.4%	0	0.0%	
60	57	17.5%	269	82.5%	0	0.0%	
61	60	33.3%	120	66.7%	0	0.0%	
62	3	8.1%	34	91.9%	0	0.0%	
63	260	34.6%	491	65.4%	0	0.0%	
65	64	30.5%	146	69.5%	0	0.0%	
67	23	50.0%	23	50.0%	0	0.0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1365	72.3%	524	27.7%	0	0.0%
04	125	74.9%	42	25.1%	0	0.0%	
05	117	74.5%	40	25.5%	0	0.0%	
11	259	66.6%	130	33.4%	0	0.0%	
16	210	79.8%	53	20.2%	0	0.0%	
20	109	74.1%	38	25.9%	0	0.0%	
31	61	73.5%	22	26.5%	0	0.0%	
53	108	80.6%	26	19.4%	0	0.0%	
55	343	69.7%	149	30.3%	0	0.0%	
68	33	57.9%	24	42.1%	0	0.0%	

Tabella 16: quota di casi per fascia di sesso nelle cliniche

Diagnosi Principale




Figura 68: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche

Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)

		Gruppi di diagnosi principale riunite									
		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazi- one mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
	Tutti	3617	14475	12279	21960	8613	733	4960	1082	1141	206
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	3592	12205	11852	18019	7557	282	4447	1042	1103	205
	03	265	760	559	704	420	10	165	57	142	0
	06	70	149	122	221	53	4	59	18	19	0
	07	30	213	215	298	99	4	71	11	17	5
	08	109	458	791	666	376	11	201	33	93	0
	12	3	67	31	518	130	3	7	0	1	0
	13	175	656	489	533	271	5	146	79	106	2
	17	60	276	146	610	136	2	36	14	0	4
	18	3	45	41	112	33	4	23	1	1	0
	21	186	454	296	529	178	11	189	14	14	0
	22	135	671	608	877	444	13	207	35	26	0
	24	78	500	413	577	329	8	186	49	63	0
	26	145	522	704	916	207	14	273	36	89	124
	28	106	443	286	522	203	12	112	19	75	0
	30	107	634	486	564	289	7	160	58	8	12
	32	97	130	141	172	133	1	70	17	3	16
	34	74	274	260	454	90	5	63	34	14	0
	35	145	497	395	665	283	3	137	26	40	0
	36	34	142	116	137	104	4	54	4	14	0
	37	191	476	338	467	278	3	85	58	1	1
	39	112	497	337	556	144	9	200	14	87	1
	40	10	210	116	686	410	22	129	21	2	0
	42	30	125	219	315	157	1	103	16	7	0
	43	49	327	371	260	81	26	159	62	51	0
	46	265	738	881	989	393	17	393	89	112	36
	48	29	151	282	236	153	3	164	23	16	4
	49	152	125	401	725	165	11	77	46	25	0
	51	53	250	284	452	117	1	65	13	66	0
	52	286	1168	1269	1320	671	19	338	70	0	0
	54	225	456	542	957	562	9	287	70	0	0
	56	166	456	340	1046	260	1	167	31	0	0
	58	160	274	307	786	333	34	97	19	0	0
	66	42	61	66	149	55	5	24	5	11	0
Cliniche specializzate	Totale	25	401	422	3937	1053	451	506	39	38	1
	01	0	0	5	578	97	18	14	2	0	0
	02	0	2	1	276	115	21	11	1	8	0
	09	1	0	0	24	18	34	3	0	1	0
	10	0	0	50	3	2	0	2	1	0	0
	14
	15	4	6	18	87	10	1	8	3	1	0
	19	0	0	0	213	52	6	15	1	1	0
	23	4	73	40	285	50	17	58	3	0	0
	25	0	0	0	0	0	46	146	0	0	1

	Gruppi di diagnosi principale riunite									
	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazi- one mancata
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
27	0	24	23	41	38	0	11	1	2	0
29	0	0	0	298	30	1	0	1	0	0
33	1	42	39	96	27	1	14	4	5	0
38	0	0	0	282	14	69	0	0	0	0
44	8	72	64	105	54	1	67	8	1	0
45	1	13	19	93	45	0	10	0	0	0
47	0	0	0	0	3	121	0	0	0	0
50	1	1	55	254	59	10	53	2	0	0
57	2	4	8	382	84	1	7	1	0	0
59	0	50	18	68	46	8	19	4	0	0
60	0	1	14	158	134	3	4	0	12	0
61	0	4	2	128	38	4	1	2	1	0
62	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
63	1	97	62	439	73	14	60	5	0	0
65	2	11	4	127	63	0	3	0	0	0
67	0	1	0	0	1	38	0	0	6	0
Cliniche per la cura di dipen- denze	Totale	0	1869	5	4	3	0	7	1	0
04	0	163	0	0	0	0	3	1	0	0
05	0	151	0	1	1	0	4	0	0	0
11	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	262	0	1	0	0	0	0	0	0
20	0	138	5	2	2	0	0	0	0	0
31	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 17: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (numero di casi)

Quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)

		Gruppi di diagnosi principale riunite									
		F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Tutti	5%	21%	18%	32%	12%	1%	7%	2%	2%	0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	6%	20%	20%	30%	13%	0%	7%	2%	2%	0%
	03	9%	25%	18%	23%	14%	0%	5%	2%	5%	0%
	06	10%	21%	17%	31%	7%	1%	8%	3%	3%	0%
	07	3%	22%	22%	31%	10%	0%	7%	1%	2%	1%
	08	4%	17%	29%	24%	14%	0%	7%	1%	3%	0%
	12	0%	9%	4%	68%	17%	0%	1%	0%	0%	0%
	13	7%	27%	20%	22%	11%	0%	6%	3%	4%	0%
	17	5%	21%	11%	48%	11%	0%	3%	1%	0%	0%
	18	1%	17%	16%	43%	13%	2%	9%	0%	0%	0%
	21	10%	24%	16%	28%	10%	1%	10%	1%	1%	0%
	22	4%	22%	20%	29%	15%	0%	7%	1%	1%	0%
	24	4%	23%	19%	26%	15%	0%	8%	2%	3%	0%
	26	5%	17%	23%	30%	7%	0%	9%	1%	3%	4%
	28	6%	25%	16%	29%	11%	1%	6%	1%	4%	0%
	30	5%	27%	21%	24%	12%	0%	7%	2%	0%	1%
	32	12%	17%	18%	22%	17%	0%	9%	2%	0%	2%
	34	6%	22%	21%	36%	7%	0%	5%	3%	1%	0%
	35	7%	23%	18%	30%	13%	0%	6%	1%	2%	0%
	36	6%	23%	19%	22%	17%	1%	9%	1%	2%	0%
	37	10%	25%	18%	25%	15%	0%	4%	3%	0%	0%
	39	6%	25%	17%	28%	7%	0%	10%	1%	4%	0%
	40	1%	13%	7%	43%	26%	1%	8%	1%	0%	0%
	42	3%	13%	23%	32%	16%	0%	11%	2%	1%	0%
	43	4%	24%	27%	19%	6%	2%	11%	4%	4%	0%
	46	7%	19%	23%	25%	10%	0%	10%	2%	3%	1%
	48	3%	14%	27%	22%	14%	0%	15%	2%	2%	0%
	49	9%	7%	23%	42%	10%	1%	4%	3%	1%	0%
	51	4%	19%	22%	35%	9%	0%	5%	1%	5%	0%
	52	6%	23%	25%	26%	13%	0%	7%	1%	0%	0%
	54	7%	15%	17%	31%	18%	0%	9%	2%	0%	0%
	56	7%	18%	14%	42%	11%	0%	7%	1%	0%	0%
	58	8%	14%	15%	39%	17%	2%	5%	1%	0%	0%
	66	10%	15%	16%	36%	13%	1%	6%	1%	3%	0%
Cliniche specializzate	Totale	0%	6%	6%	57%	15%	7%	7%	1%	1%	0%
	01	0%	0%	1%	81%	14%	3%	2%	0%	0%	0%
	02	0%	0%	0%	63%	26%	5%	3%	0%	2%	0%
	09	1%	0%	0%	30%	22%	42%	4%	0%	1%	0%
	10	0%	0%	86%	5%	3%	0%	3%	2%	0%	0%
	14
	15	3%	4%	13%	63%	7%	1%	6%	2%	1%	0%
	19	0%	0%	0%	74%	18%	2%	5%	0%	0%	0%
	23	1%	14%	8%	54%	9%	3%	11%	1%	0%	0%
	25	0%	0%	0%	0%	0%	24%	76%	0%	0%	1%

	Gruppi di diagnosi principale riunite									
	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7, F8, F9 e F99	Altre diagnosi	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
27	0%	17%	16%	29%	27%	0%	8%	1%	1%	0%
29	0%	0%	0%	90%	9%	0%	0%	0%	0%	0%
33	0%	18%	17%	42%	12%	0%	6%	2%	2%	0%
38	0%	0%	0%	77%	4%	19%	0%	0%	0%	0%
44	2%	19%	17%	28%	14%	0%	18%	2%	0%	0%
45	1%	7%	10%	51%	25%	0%	6%	0%	0%	0%
47	0%	0%	0%	0%	2%	98%	0%	0%	0%	0%
50	0%	0%	13%	58%	14%	2%	12%	0%	0%	0%
57	0%	1%	2%	78%	17%	0%	1%	0%	0%	0%
59	0%	23%	8%	32%	22%	4%	9%	2%	0%	0%
60	0%	0%	4%	48%	41%	1%	1%	0%	4%	0%
61	0%	2%	1%	71%	21%	2%	1%	1%	1%	0%
62	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
63	0%	13%	8%	58%	10%	2%	8%	1%	0%	0%
65	1%	5%	2%	60%	30%	0%	1%	0%	0%	0%
67	0%	2%	0%	0%	2%	83%	0%	0%	13%	0%
Cliniche per la cura di dipendenze Totale	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
04	0%	98%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	0%	0%
05	0%	96%	0%	1%	1%	0%	3%	0%	0%	0%
11	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	0%	94%	3%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
53	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
55	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
68	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabella 18: quota di casi per fascia di diagnosi principale nelle cliniche (quota di casi)

HoNOS: Gravità all'ammissione (punteggio complessivo)




Figura 69: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche

Gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche

		Punteggio totale HoNOS (ammissione)								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
	Tutti	17.49	7.29	0.00	12.00	17.00	22.00	48.00	64504	4562
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	17.64	7.43	0.00	12.00	17.00	22.00	48.00	56189	4115
	03	16.42	7.63	0.00	10.91	15.27	21.00	45.60	2782	300
	06	19.79	6.86	0.00	15.00	20.00	25.00	44.00	710	5
	07	14.71	5.74	1.33	11.00	14.00	18.00	41.00	854	109
	08	17.80	7.64	2.00	12.00	17.00	22.91	44.00	2594	144
	12	16.69	6.33	2.00	12.00	16.00	21.00	41.00	758	2
	13	19.66	7.00	3.00	15.00	19.00	24.00	48.00	2305	157
	17	18.15	8.04	0.00	12.00	17.00	24.00	48.00	1266	18
	18	19.13	6.56	3.00	14.00	19.00	23.00	38.18	228	35
	21	15.27	5.98	0.00	11.00	15.00	19.00	40.00	1708	163
	22	17.78	9.25	2.00	11.50	16.36	22.00	48.00	2884	132
	24	18.57	7.49	0.00	13.00	18.00	24.00	46.00	2113	90
	26	15.03	7.37	0.00	9.00	14.00	20.00	40.00	2448	582
	28	15.50	6.27	0.00	11.00	15.00	19.00	42.00	1767	11
	30	18.04	8.23	0.00	12.00	17.33	23.00	46.00	2035	290
	32	17.81	6.05	1.00	14.00	18.00	23.00	37.00	706	74
	34	16.80	5.68	2.00	13.00	16.36	21.00	42.00	1232	36
	35	20.12	7.39	0.00	15.00	20.00	25.00	48.00	2115	76
	36	16.80	5.28	4.00	13.00	17.00	20.00	37.00	600	9
	37	13.86	5.50	0.00	10.00	13.20	17.45	33.82	1794	104
	39	20.42	7.67	1.00	15.00	20.00	26.00	43.00	1941	16
	40	20.12	6.97	0.00	15.60	20.00	25.00	46.91	1586	20
	42	16.29	5.95	0.00	12.00	16.00	20.00	39.00	956	17
	43	18.17	7.38	1.00	13.00	18.00	23.00	41.00	1337	49
	46	16.11	7.43	0.00	10.91	15.00	20.73	48.00	3394	519
	48	14.51	6.78	0.00	9.82	14.00	18.67	38.00	981	80
	49	21.00	7.19	1.00	16.00	21.00	26.00	45.82	1606	121
	51	19.74	6.93	0.00	15.00	20.00	24.00	41.00	1284	17
	52	19.14	7.14	0.00	14.00	19.00	24.00	43.00	4808	333
	54	14.79	6.95	0.00	10.00	14.00	19.00	43.20	2699	409
	56	19.60	6.17	0.00	15.00	19.00	24.00	47.00	2440	27
	58	17.28	6.68	0.00	13.00	17.00	22.00	39.60	1936	74
	66	20.44	9.08	1.00	13.00	20.00	27.00	46.00	322	96
Cliniche specializzate	Totale	16.85	6.11	0.00	13.00	17.00	21.00	46.00	6567	306
	01	18.85	4.72	3.00	16.00	18.00	22.00	38.67	708	6
	02	19.03	7.17	4.00	14.00	19.00	23.00	38.00	432	3
	09	21.77	7.20	6.00	17.00	21.00	28.00	40.00	81	0
	10	20.25	6.13	10.00	16.00	20.00	24.00	33.00	51	7
	14
	15	12.58	5.78	1.00	8.00	12.00	16.00	27.00	133	5
	19	15.87	5.13	1.00	13.00	15.80	19.00	29.00	286	2
	23	17.68	5.13	2.00	14.00	18.00	21.00	36.00	522	8
	25	16.83	8.26	0.00	11.00	17.00	22.00	39.00	164	29
	27	15.35	4.82	6.00	12.00	15.27	18.55	28.00	120	20
	29	17.05	4.94	3.00	13.00	17.00	20.00	35.00	319	11

	Punteggio totale HoNOS (ammissione)									
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca	
33	15.71	6.17	0.00	11.00	15.50	20.00	31.00	224	5	
38	18.73	6.52	4.00	14.00	18.00	22.50	38.00	364	1	
44	16.27	5.86	0.00	12.00	17.00	20.00	31.00	380	0	
45	16.11	5.29	5.00	12.00	16.00	20.00	35.00	181	0	
47	8.10	4.56	2.00	4.36	7.00	10.91	25.00	95	29	
50	16.64	6.77	1.00	12.00	16.00	20.00	46.00	423	12	
57	15.27	4.41	5.00	12.00	15.00	18.00	36.00	489	0	
59	19.27	6.23	2.00	15.00	19.00	23.00	41.00	203	10	
60	16.88	6.19	1.00	13.00	16.00	21.00	35.00	303	23	
61	19.56	6.27	4.00	15.00	20.00	24.00	34.91	179	1	
62	23.89	3.09	19.00	21.00	24.00	26.00	30.00	37	0	
63	14.43	5.15	2.00	11.00	14.00	18.00	29.00	650	101	
65	15.75	4.94	4.00	12.00	16.00	19.00	30.00	186	24	
67	9.62	5.82	0.00	4.00	9.00	13.00	22.00	37	9	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	15.21	6.56	0.00	10.00	15.00	20.00	40.00	1748	141
04	12.39	4.73	3.00	10.00	12.00	15.00	27.00	62	105	
05	13.89	4.81	1.09	10.00	14.00	17.45	26.00	157	0	
11	15.91	6.39	4.00	11.00	15.00	20.00	40.00	387	2	
16	20.97	5.08	4.00	18.00	21.00	24.00	35.00	263	0	
20	12.84	5.71	0.00	9.00	12.00	17.00	25.00	118	29	
31	10.56	4.65	4.00	7.00	10.00	13.00	27.00	82	1	
53	10.62	6.10	1.00	6.00	9.00	14.00	33.00	131	3	
55	15.52	6.15	2.00	11.00	15.00	20.00	40.00	491	1	
68	10.11	6.48	0.00	6.00	8.00	15.00	27.00	57	0	

Tabella 19: gravità all'ammissione (punteggio complessivo HoNOS) nelle cliniche

BSCL: Gravità all'ammissione (punteggio complessivo)




Figura 70: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche

Gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche

		Punteggio totale BSCL (ammissione)								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca
	Tutti	67.60	42.15	0.00	33.25	63.00	97.00	212.00	35303	33763
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	68.66	42.82	0.00	34.00	64.00	99.00	212.00	28246	32058
	03	70.21	43.36	0.00	35.00	65.00	100.00	193.65	1113	1969
	06	76.15	42.98	0.00	42.00	73.00	108.08	179.00	470	245
	07	62.28	42.59	0.00	28.00	55.00	89.69	203.00	520	443
	08	69.99	43.02	0.00	35.00	67.13	103.00	192.00	1064	1674
	12	75.33	38.39	2.00	45.00	73.55	101.58	194.00	547	213
	13	63.19	42.52	0.00	28.00	57.66	90.50	212.00	952	1510
	17	64.21	37.17	0.00	34.00	60.00	91.00	203.00	982	302
	18	81.09	39.65	0.00	51.00	75.00	113.00	193.00	169	94
	21	71.17	44.68	0.00	34.00	67.00	103.00	206.90	821	1050
	22	75.38	43.24	0.00	40.00	73.00	106.00	212.00	1475	1541
	24	59.11	44.75	0.00	22.00	49.76	89.00	212.00	1341	862
	26	69.85	45.61	0.00	30.00	65.00	102.00	212.00	1559	1471
	28	61.95	41.35	0.00	28.00	57.00	89.00	204.00	1044	734
	30	61.46	42.32	0.00	27.00	53.00	91.00	198.00	1005	1320
	32	63.17	45.90	0.00	24.00	57.00	98.00	176.00	349	431
	34	72.84	42.47	0.00	39.00	72.50	101.96	202.58	700	568
	35	73.09	44.43	0.00	37.00	68.29	104.34	212.00	1076	1115
	36	71.63	41.48	0.00	39.00	70.00	98.79	185.00	340	269
	37	64.03	40.85	0.00	33.00	59.00	91.00	192.00	745	1153
	39	59.66	37.86	0.00	29.00	53.00	85.00	210.00	1274	683
	40	72.77	35.21	0.00	45.00	70.00	96.00	178.00	1359	247
	42	64.71	44.48	0.00	28.00	56.00	99.00	191.00	680	293
	43	57.63	44.68	0.00	21.00	50.00	87.00	212.00	593	793
	46	67.47	43.74	0.00	31.00	63.00	97.00	212.00	1217	2696
	48	62.75	45.49	0.00	22.00	53.00	96.83	199.00	337	724
	49	73.51	47.07	0.00	33.63	68.00	105.00	212.00	977	750
	51	64.48	39.30	0.00	34.00	59.00	91.00	212.00	561	740
	52	71.16	42.19	0.00	38.00	67.00	102.00	200.00	1397	3744
	54	77.33	43.04	0.00	43.00	75.00	107.02	212.00	1057	2051
	56	76.16	42.76	0.00	42.00	73.00	105.00	212.00	1505	962
	58	73.63	41.24	0.00	44.00	72.00	102.00	195.00	835	1175
	66	60.41	38.74	0.00	30.14	52.00	83.00	174.00	182	236
Cliniche specializzate	Totale	69.11	38.90	0.00	39.75	66.00	95.81	200.57	5389	1484
	01	73.07	35.55	1.00	46.00	71.00	94.00	190.00	670	44
	02	72.62	42.39	0.00	38.00	68.00	103.00	199.00	345	90
	09	71.00	33.71	7.00	47.00	72.00	90.00	171.00	63	18
	10	58.51	35.98	1.00	27.00	56.00	82.00	135.00	55	3
	14
	15	71.42	39.56	0.00	39.00	66.50	97.00	190.00	106	32
	19	72.32	36.08	3.00	45.00	71.00	98.00	170.00	263	25
	23	73.92	39.46	0.00	42.00	70.00	101.00	188.00	451	79
	25	53.48	28.91	4.00	35.00	52.00	67.00	135.00	125	68
	27	68.35	42.68	3.00	34.00	74.00	97.00	178.00	57	83
	29	63.89	31.25	1.00	40.00	62.00	84.00	184.00	295	35

	Punteggio totale BSCL (ammissione)									
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Percentile 25	Mediana	Percentile 75	Massimo	N valido	Manca	
33	37.82	44.00	0.00	0.00	25.00	69.00	164.00	211	18	
38	77.76	35.01	6.00	50.50	74.00	101.00	200.57	336	29	
44	51.77	35.23	0.00	23.00	44.00	75.00	154.00	359	21	
45	75.11	42.09	0.00	42.00	69.00	102.00	194.00	132	49	
47	69.70	31.81	15.00	46.00	65.50	96.00	143.00	58	66	
50	73.13	39.17	4.00	42.00	71.00	99.00	181.00	287	148	
57	73.59	36.65	1.00	46.64	71.00	98.87	179.00	382	107	
59	73.77	42.97	0.00	37.00	72.00	107.04	185.50	101	112	
60	79.85	38.03	0.00	51.00	78.00	107.00	173.00	290	36	
61	56.96	30.54	7.00	30.00	54.50	79.00	140.00	142	38	
62	61.26	35.13	6.00	32.00	57.00	87.00	138.00	35	2	
63	73.96	41.62	0.00	41.00	71.00	102.00	200.00	473	278	
65	66.22	41.11	0.00	34.50	59.50	90.00	190.18	136	74	
67	45.42	33.34	4.00	27.00	30.00	58.00	119.00	17	29	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	44.84	33.63	0.00	18.00	36.00	66.00	182.68	1668	221
04	39.28	32.95	1.00	16.00	30.00	59.00	148.00	61	106	
05	40.81	33.64	0.00	14.00	31.00	61.00	154.00	155	2	
11	39.79	32.43	1.00	16.00	30.00	59.00	154.00	366	23	
16	46.61	32.63	0.00	23.19	38.00	67.27	182.68	237	26	
20	55.60	36.27	0.00	27.00	52.00	81.00	162.00	135	12	
31	35.33	28.71	0.00	15.00	29.50	44.00	123.00	82	1	
53	57.07	37.49	0.00	27.00	50.50	80.00	162.00	124	10	
55	45.50	33.07	0.00	19.00	37.00	66.63	165.00	452	40	
68	43.18	28.74	2.00	22.00	38.50	54.50	166.00	56	1	

Tabella 20: gravità all'ammissione (punteggio complessivo BSCL) nelle cliniche

Ricovero a fini assistenziali¹⁸




Figura 71: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche

¹⁸ La comparabilità tra le diverse regioni linguistiche della Svizzera non è garantita entro al 31.12.2015; l'Ufficio federale di statistica ha unificato la definizione dal 2017.

Ricovero a fini assistenziali nelle cliniche

		Ricovero a fini assistenziali					
		senza PLSA		con PLSA		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Tutti		57587	83.4%	10512	15.2%	967	1.4%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	49427	82.0%	10435	17.3%	442	.7%
	03	2585	83.9%	497	16.1%	0	0.0%
	06	694	97.1%	21	2.9%	0	0.0%
	07	961	99.8%	2	.2%	0	0.0%
	08	2018	73.7%	720	26.3%	0	0.0%
	12	754	99.2%	6	.8%	0	0.0%
	13	1856	75.4%	604	24.5%	2	.1%
	17	1116	86.9%	168	13.1%	0	0.0%
	18	259	98.5%	4	1.5%	0	0.0%
	21	1571	84.0%	300	16.0%	0	0.0%
	22	2721	90.2%	295	9.8%	0	0.0%
	24	2203	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	26	3003	99.1%	27	.9%	0	0.0%
	28	1601	90.0%	175	9.8%	2	.1%
	30	1738	74.8%	584	25.1%	3	.1%
	32	746	95.6%	34	4.4%	0	0.0%
	34	1032	81.4%	236	18.6%	0	0.0%
	35	1635	74.6%	548	25.0%	8	.4%
	36	474	77.8%	135	22.2%	0	0.0%
	37	1492	78.6%	404	21.3%	2	.1%
	39	1653	84.5%	304	15.5%	0	0.0%
	40	1484	92.4%	122	7.6%	0	0.0%
	42	791	81.3%	182	18.7%	0	0.0%
	43	857	61.8%	529	38.2%	0	0.0%
	46	3913	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	48	611	57.6%	450	42.4%	0	0.0%
	49	1650	95.5%	70	4.1%	7	.4%
	51	855	65.7%	446	34.3%	0	0.0%
	52	3726	72.5%	1415	27.5%	0	0.0%
	54	2034	65.4%	1074	34.6%	0	0.0%
	56	1940	78.6%	527	21.4%	0	0.0%
	58	1454	72.3%	556	27.7%	0	0.0%
	66	0	0.0%	0	0.0%	418	100.0%
Cliniche specializzate	Totale	6423	93.5%	73	1.1%	377	5.5%
	01	714	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02	435	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	09	80	98.8%	1	1.2%	0	0.0%
	10	58	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14
	15	138	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	19	209	72.6%	0	0.0%	79	27.4%
	23	530	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	25	189	97.9%	1	.5%	3	1.6%
	27	133	95.0%	3	2.1%	4	2.9%
	29	329	99.7%	0	0.0%	1	.3%

	Ricovero a fini assistenziali						
	senza PLSA		con PLSA		Indicazione mancata		
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
33	204	89.1%	25	10.9%	0	0.0%	
38	365	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
44	370	97.4%	10	2.6%	0	0.0%	
45	179	98.9%	1	.6%	1	.6%	
47	123	99.2%	0	0.0%	1	.8%	
50	407	93.6%	28	6.4%	0	0.0%	
57	489	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
59	210	98.6%	3	1.4%	0	0.0%	
60	247	75.8%	1	.3%	78	23.9%	
61	180	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
62	37	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
63	751	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
65	0	0.0%	0	0.0%	210	100.0%	
67	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1737	92.0%	4	.2%	148	7.8%
	04	167	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	05	156	99.4%	1	.6%	0	0.0%
	11	388	99.7%	0	0.0%	1	.3%
	16	261	99.2%	2	.8%	0	0.0%
	20	0	0.0%	0	0.0%	147	100.0%
	31	83	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	53	134	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	55	491	99.8%	1	.2%	0	0.0%
	68	57	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

Tabella 21: ricovero a fini assistenziali nelle cliniche

Nazionalità




Figura 72: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche

Quota di casi per fasica di nazionalità nelle cliniche

		Nazionalità			
		Svizzera		Altri	
		Numero	%	Numero	%
	Tutti	53542	77.5%	15524	22.5%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	46290	76.8%	14014	23.2%
	03	2394	77.7%	688	22.3%
	06	611	85.5%	104	14.5%
	07	710	73.7%	253	26.3%
	08	2306	84.2%	432	15.8%
	12	731	96.2%	29	3.8%
	13	2288	92.9%	174	7.1%
	17	1108	86.3%	176	13.7%
	18	223	84.8%	40	15.2%
	21	1521	81.3%	350	18.7%
	22	2101	69.7%	915	30.3%
	24	1742	79.1%	461	20.9%
	26	1828	60.3%	1202	39.7%
	28	1413	79.5%	365	20.5%
	30	1797	77.3%	528	22.7%
	32	598	76.7%	182	23.3%
	34	903	71.2%	365	28.8%
	35	1611	73.5%	580	26.5%
	36	420	69.0%	189	31.0%
	37	1436	75.7%	462	24.3%
	39	1517	77.5%	440	22.5%
	40	1304	81.2%	302	18.8%
	42	661	67.9%	312	32.1%
	43	1141	82.3%	245	17.7%
	46	2560	65.4%	1353	34.6%
	48	715	67.4%	346	32.6%
	49	1315	76.1%	412	23.9%
	51	1006	77.3%	295	22.7%
	52	3597	70.0%	1544	30.0%
	54	2479	79.8%	629	20.2%
	56	2250	91.2%	217	8.8%
	58	1639	81.5%	371	18.5%
	66	365	87.3%	53	12.7%
Cliniche specializzate	Totale	5704	83.0%	1169	17.0%
	01	593	83.1%	121	16.9%
	02	307	70.6%	128	29.4%
	09	77	95.1%	4	4.9%
	10	55	94.8%	3	5.2%
	14
	15	126	91.3%	12	8.7%
	19	278	96.5%	10	3.5%
	23	429	80.9%	101	19.1%
	25	148	76.7%	45	23.3%
	27	110	78.6%	30	21.4%
	29	301	91.2%	29	8.8%

	Nazionalità				
	Svizzera		Altri		
	Numero	%	Numero	%	
33	183	79.9%	46	20.1%	
38	306	83.8%	59	16.2%	
44	241	63.4%	139	36.6%	
45	130	71.8%	51	28.2%	
47	113	91.1%	11	8.9%	
50	367	84.4%	68	15.6%	
57	440	90.0%	49	10.0%	
59	174	81.7%	39	18.3%	
60	289	88.7%	37	11.3%	
61	179	99.4%	1	.6%	
62	35	94.6%	2	5.4%	
63	590	78.6%	161	21.4%	
65	187	89.0%	23	11.0%	
67	46	100.0%	0	0.0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1548	81.9%	341	18.1%
	04	130	77.8%	37	22.2%
	05	125	79.6%	32	20.4%
	11	341	87.7%	48	12.3%
	16	220	83.7%	43	16.3%
	20	107	72.8%	40	27.2%
	31	69	83.1%	14	16.9%
	53	100	74.6%	34	25.4%
	55	410	83.3%	82	16.7%
	68	46	80.7%	11	19.3%

Tabella 22: quota di casi per fascia di nazionalità nelle cliniche

Istruzione




Figura 73: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche

Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)

		Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							Indicazio- ne manca- ta
		nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professiona- le a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializ- zata o profssio- nale supe- riore	università, scuola universita- ria	scono- sciuto	
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
	Tutti	2876	13839	22445	2305	5050	3794	17777	980
Fornitori di pre- stazioni di base e della medicina acuta	Totale	2697	12215	18714	1890	4128	2919	17264	477
	03	194	455	1061	50	265	106	951	0
	06	62	269	295	5	47	14	23	0
	07	41	335	161	16	53	20	334	3
	08	141	367	571	88	354	140	1077	0
	12	12	103	426	26	106	84	3	0
	13	80	361	829	39	228	62	861	2
	17	45	221	611	58	180	116	53	0
	18	12	57	114	2	11	11	56	0
	21	126	475	663	61	280	83	183	0
	22	114	623	806	149	185	192	947	0
	24	131	873	641	120	133	93	212	0
	26	0	0	0	0	0	0	3030	0
	28	115	428	662	54	155	63	299	2
	30	53	317	603	35	63	55	1196	3
	32	43	148	131	23	34	27	374	0
	34	65	262	529	20	64	48	280	0
	35	38	455	851	51	97	57	634	8
	36	23	90	200	10	20	12	254	0
	37	108	597	737	18	103	39	295	1
	39	74	440	769	74	122	60	418	0
	40	54	512	762	50	149	79	0	0
	42	5	373	303	66	143	57	26	0
	43	103	691	377	101	51	53	10	0
	46	163	593	508	162	136	286	2065	0
	48	51	111	256	30	50	53	477	33
	49	92	547	794	83	94	67	43	7
	51	63	185	478	20	73	61	421	0
	52	339	1182	2031	256	385	423	525	0
	54	146	535	980	71	166	164	1046	0
	56	80	356	908	59	165	162	737	0
	58	124	254	657	93	216	232	434	0
	66	0	0	0	0	0	0	0	418
Cliniche specia- lizzate	Totale	131	1206	2700	381	818	810	472	355
	01	13	66	334	43	107	115	36	0
	02	11	100	253	22	24	13	12	0
	09	4	24	34	6	7	6	0	0
	10	2	28	15	8	3	2	0	0
	14
	15	3	23	88	2	3	2	17	0
	19	2	28	106	9	33	14	17	79

	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa								
	nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
23	28	147	223	31	51	50	0	0	
25	0	191	1	0	0	0	0	1	
27	11	48	39	1	12	3	22	4	
29	0	16	128	7	102	75	1	1	
33	4	44	87	4	5	10	29	46	
38	6	34	193	24	55	45	8	0	
44	1	89	72	58	63	97	0	0	
45	9	75	52	12	25	5	1	2	
47	2	18	35	30	22	16	0	1	
50	16	98	157	17	26	20	101	0	
57	4	8	449	0	1	9	18	0	
59	10	36	105	5	22	12	23	0	
60	1	24	86	26	42	70	66	11	
61	1	12	64	3	72	12	16	0	
62	1	8	12	10	1	5	0	0	
63	2	86	147	61	139	221	95	0	
65	0	0	0	0	0	0	0	210	
67	0	3	20	2	3	8	10	0	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	48	418	1031	34	104	65	41	148
04	12	74	78	1	2	0	0	0	
05	9	36	92	4	8	7	1	0	
11	0	71	294	2	11	10	0	1	
16	3	113	139	0	6	0	2	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	147	
31	0	12	58	0	6	6	1	0	
53	9	40	46	3	3	3	30	0	
55	15	60	290	21	63	36	7	0	
68	0	12	34	3	5	3	0	0	

Tabella 23: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (numero di casi)

Distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)

		Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa							Indicazio- ne manca- ta
		nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professiona- le a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializ- zata o profssio- nale supe- riore	università, scuola universita- ria	scono- sciuto	
		%	%	%	%	%	%	%	
	Tutti	4%	20%	32%	3%	7%	5%	26%	1%
Fornitori di pre- stazioni di base e della medicina acuta	Totale	4%	20%	31%	3%	7%	5%	29%	1%
	03	6%	15%	34%	2%	9%	3%	31%	0%
	06	9%	38%	41%	1%	7%	2%	3%	0%
	07	4%	35%	17%	2%	6%	2%	35%	0%
	08	5%	13%	21%	3%	13%	5%	39%	0%
	12	2%	14%	56%	3%	14%	11%	0%	0%
	13	3%	15%	34%	2%	9%	3%	35%	0%
	17	4%	17%	48%	5%	14%	9%	4%	0%
	18	5%	22%	43%	1%	4%	4%	21%	0%
	21	7%	25%	35%	3%	15%	4%	10%	0%
	22	4%	21%	27%	5%	6%	6%	31%	0%
	24	6%	40%	29%	5%	6%	4%	10%	0%
	26	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
	28	6%	24%	37%	3%	9%	4%	17%	0%
	30	2%	14%	26%	2%	3%	2%	51%	0%
	32	6%	19%	17%	3%	4%	3%	48%	0%
	34	5%	21%	42%	2%	5%	4%	22%	0%
	35	2%	21%	39%	2%	4%	3%	29%	0%
	36	4%	15%	33%	2%	3%	2%	42%	0%
	37	6%	31%	39%	1%	5%	2%	16%	0%
	39	4%	22%	39%	4%	6%	3%	21%	0%
	40	3%	32%	47%	3%	9%	5%	0%	0%
	42	1%	38%	31%	7%	15%	6%	3%	0%
	43	7%	50%	27%	7%	4%	4%	1%	0%
	46	4%	15%	13%	4%	3%	7%	53%	0%
	48	5%	10%	24%	3%	5%	5%	45%	3%
	49	5%	32%	46%	5%	5%	4%	2%	0%
	51	5%	14%	37%	2%	6%	5%	32%	0%
	52	7%	23%	40%	5%	7%	8%	10%	0%
	54	5%	17%	32%	2%	5%	5%	34%	0%
	56	3%	14%	37%	2%	7%	7%	30%	0%
	58	6%	13%	33%	5%	11%	12%	22%	0%
	66	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Cliniche specia- lizzate	Totale	2%	18%	39%	6%	12%	12%	7%	5%
	01	2%	9%	47%	6%	15%	16%	5%	0%
	02	3%	23%	58%	5%	6%	3%	3%	0%
	09	5%	30%	42%	7%	9%	7%	0%	0%
	10	3%	48%	26%	14%	5%	3%	0%	0%
	14
	15	2%	17%	64%	1%	2%	1%	12%	0%
	19	1%	10%	37%	3%	11%	5%	6%	27%

	Formazione scolastica o professionale più elevata conclusa								
	nessuna istruzione scolastica terminata	scuola dell'obbligo	tirocinio o scuola professionale a tempo pieno	scuola di maturità	scuola specializzata o professionale superiore	università, scuola universitaria	sconosciuto	Indicazione mancata	
	%	%	%	%	%	%	%	%	
23	5%	28%	42%	6%	10%	9%	0%	0%	
25	0%	99%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	
27	8%	34%	28%	1%	9%	2%	16%	3%	
29	0%	5%	39%	2%	31%	23%	0%	0%	
33	2%	19%	38%	2%	2%	4%	13%	20%	
38	2%	9%	53%	7%	15%	12%	2%	0%	
44	0%	23%	19%	15%	17%	26%	0%	0%	
45	5%	41%	29%	7%	14%	3%	1%	1%	
47	2%	15%	28%	24%	18%	13%	0%	1%	
50	4%	23%	36%	4%	6%	5%	23%	0%	
57	1%	2%	92%	0%	0%	2%	4%	0%	
59	5%	17%	49%	2%	10%	6%	11%	0%	
60	0%	7%	26%	8%	13%	21%	20%	3%	
61	1%	7%	36%	2%	40%	7%	9%	0%	
62	3%	22%	32%	27%	3%	14%	0%	0%	
63	0%	11%	20%	8%	19%	29%	13%	0%	
65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
67	0%	7%	43%	4%	7%	17%	22%	0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	3%	22%	55%	2%	6%	3%	2%	8%
04	7%	44%	47%	1%	1%	0%	0%	0%	
05	6%	23%	59%	3%	5%	4%	1%	0%	
11	0%	18%	76%	1%	3%	3%	0%	0%	
16	1%	43%	53%	0%	2%	0%	1%	0%	
20	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
31	0%	14%	70%	0%	7%	7%	1%	0%	
53	7%	30%	34%	2%	2%	2%	22%	0%	
55	3%	12%	59%	4%	13%	7%	1%	0%	
68	0%	21%	60%	5%	9%	5%	0%	0%	

Tabella 24: distribuzione dell'istruzione nelle cliniche (quota di casi)

Stato civile




Figura 74: stato civile nelle cliniche

Stato civile nelle cliniche (numero di casi)

		Stato civile						
		nubi- le/celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
	Tutti	31836	16853	2860	3469	10695	2450	903
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	28381	14272	2459	3199	9357	2187	449
	03	1328	898	49	243	536	28	0
	06	362	168	13	46	125	1	0
	07	455	241	64	54	145	3	1
	08	1436	598	80	98	342	184	0
	12	297	283	20	24	133	3	0
	13	1021	530	83	121	333	372	2
	17	529	406	86	68	189	6	0
	18	123	62	18	11	49	0	0
	21	780	499	74	130	376	12	0
	22	1451	609	182	126	439	209	0
	24	1026	548	103	106	386	34	0
	26	1483	760	82	131	567	7	0
	28	834	438	58	116	255	75	2
	30	1230	490	113	92	325	72	3
	32	315	206	0	73	151	35	0
	34	596	340	59	49	190	34	0
	35	1116	461	108	105	377	16	8
	36	266	155	34	21	90	38	5
	37	868	518	39	141	330	2	0
	39	824	497	53	141	337	105	0
	40	841	415	68	38	236	8	0
	42	350	297	71	58	196	1	0
	43	737	290	82	48	222	7	0
	46	1866	937	225	221	630	34	0
	48	507	237	84	56	167	7	3
	49	723	356	169	115	335	22	7
	51	627	365	54	71	181	3	0
	52	3024	834	156	183	903	41	0
	54	1426	704	125	140	398	315	0
	56	1044	630	43	281	97	372	0
	58	896	500	64	92	317	141	0
	66	0	0	0	0	0	0	418
Cliniche specializzate	Totale	2493	2274	302	238	1015	245	306
	01	215	282	29	0	161	27	0
	02	119	204	17	25	70	0	0
	09	54	18	4	1	4	0	0
	10	57	1	0	0	0	0	0
	14
	15	52	62	3	5	16	0	0
	19	88	84	11	2	22	2	79
	23	256	141	27	15	91	0	0
	25	121	25	10	0	36	0	1
	27	56	26	12	11	17	14	4

	Stato civile							
	nubi- le/celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
29	95	132	26	2	54	20	1	
33	98	67	20	8	32	4	0	
38	158	110	20	11	66	0	0	
44	125	153	15	37	50	0	0	
45	41	78	6	11	45	0	0	
47	113	8	1	0	1	0	1	
50	204	125	14	12	79	1	0	
57	108	242	18	24	84	13	0	
59	93	75	12	1	20	12	0	
60	95	91	12	16	55	47	10	
61	20	41	7	5	14	93	0	
62	33	2	1	0	1	0	0	
63	280	284	35	51	93	8	0	
65	0	0	0	0	0	0	210	
67	12	23	2	1	4	4	0	
Cliniche per la cura di dipen- denze	Totale	962	307	99	32	323	18	148
04	151	5	1	1	9	0	0	
05	91	26	5	1	34	0	0	
11	174	82	31	13	88	0	1	
16	217	15	10	2	19	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	147	
31	30	20	11	2	20	0	0	
53	93	10	11	0	17	3	0	
55	185	132	29	9	122	15	0	
68	21	17	1	4	14	0	0	

Tabella 25: stato civile nelle cliniche (numero di casi)

Stato civile nelle cliniche (quota di casi)

		Stato civile						
		nubi- le/celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%
	Tutti	46%	24%	4%	5%	15%	4%	1%
Fornitori di pre- stazioni di base e della medicina acuta	Totale	47%	24%	4%	5%	16%	4%	1%
	03	43%	29%	2%	8%	17%	1%	0%
	06	51%	23%	2%	6%	17%	0%	0%
	07	47%	25%	7%	6%	15%	0%	0%
	08	52%	22%	3%	4%	12%	7%	0%
	12	39%	37%	3%	3%	18%	0%	0%
	13	41%	22%	3%	5%	14%	15%	0%
	17	41%	32%	7%	5%	15%	0%	0%
	18	47%	24%	7%	4%	19%	0%	0%
	21	42%	27%	4%	7%	20%	1%	0%
	22	48%	20%	6%	4%	15%	7%	0%
	24	47%	25%	5%	5%	18%	2%	0%
	26	49%	25%	3%	4%	19%	0%	0%
	28	47%	25%	3%	7%	14%	4%	0%
	30	53%	21%	5%	4%	14%	3%	0%
	32	40%	26%	0%	9%	19%	4%	0%
	34	47%	27%	5%	4%	15%	3%	0%
	35	51%	21%	5%	5%	17%	1%	0%
	36	44%	25%	6%	3%	15%	6%	1%
	37	46%	27%	2%	7%	17%	0%	0%
	39	42%	25%	3%	7%	17%	5%	0%
	40	52%	26%	4%	2%	15%	0%	0%
	42	36%	31%	7%	6%	20%	0%	0%
	43	53%	21%	6%	3%	16%	1%	0%
	46	48%	24%	6%	6%	16%	1%	0%
	48	48%	22%	8%	5%	16%	1%	0%
	49	42%	21%	10%	7%	19%	1%	0%
	51	48%	28%	4%	5%	14%	0%	0%
	52	59%	16%	3%	4%	18%	1%	0%
	54	46%	23%	4%	5%	13%	10%	0%
	56	42%	26%	2%	11%	4%	15%	0%
	58	45%	25%	3%	5%	16%	7%	0%
	66	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Cliniche specia- lizzate	Totale	36%	33%	4%	3%	15%	4%	4%
	01	30%	39%	4%	0%	23%	4%	0%
	02	27%	47%	4%	6%	16%	0%	0%
	09	67%	22%	5%	1%	5%	0%	0%
	10	98%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
	14
	15	38%	45%	2%	4%	12%	0%	0%
	19	31%	29%	4%	1%	8%	1%	27%
	23	48%	27%	5%	3%	17%	0%	0%
	25	63%	13%	5%	0%	19%	0%	1%
	27	40%	19%	9%	8%	12%	10%	3%

	Stato civile							Indicazione mancata
	nubi- le/celibe	coniugato/a, convivente	coniugato/a, separato/a	vedovo/a	divorziato/a	sconosciuto		
	%	%	%	%	%	%	%	
29	29%	40%	8%	1%	16%	6%	0%	
33	43%	29%	9%	3%	14%	2%	0%	
38	43%	30%	5%	3%	18%	0%	0%	
44	33%	40%	4%	10%	13%	0%	0%	
45	23%	43%	3%	6%	25%	0%	0%	
47	91%	6%	1%	0%	1%	0%	1%	
50	47%	29%	3%	3%	18%	0%	0%	
57	22%	49%	4%	5%	17%	3%	0%	
59	44%	35%	6%	0%	9%	6%	0%	
60	29%	28%	4%	5%	17%	14%	3%	
61	11%	23%	4%	3%	8%	52%	0%	
62	89%	5%	3%	0%	3%	0%	0%	
63	37%	38%	5%	7%	12%	1%	0%	
65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
67	26%	50%	4%	2%	9%	9%	0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	51%	16%	5%	2%	17%	1%	8%
04	90%	3%	1%	1%	5%	0%	0%	
05	58%	17%	3%	1%	22%	0%	0%	
11	45%	21%	8%	3%	23%	0%	0%	
16	83%	6%	4%	1%	7%	0%	0%	
20	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
31	36%	24%	13%	2%	24%	0%	0%	
53	69%	7%	8%	0%	13%	2%	0%	
55	38%	27%	6%	2%	25%	3%	0%	
68	37%	30%	2%	7%	25%	0%	0%	

Tabella 26: stato civile nelle cliniche (quota di casi)

Occupazione prima dell'ammissione




Figura 75: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche

Occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

		occu- pato a tempo parziale	occu- pato a tempo pieno	inoccu- pato o disoccu- pato	lavoro dome- stico nello propria econo- mia dome- stica	in for- mazione (scuola, tirocinio, studio)	pro- gramma di riabi- litazione	AI, AVS o altra rendita	lavoro in ambito protetto	scono- sciuto
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
	Tutti	5997	8091	27918	13526	2728	663	23655	2634	9900
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	4856	6615	25061	11219	2317	602	21798	2398	9514
	03	248	361	984	261	73	10	1334	148	112
	06	43	57	116	22	13	7	376	23	91
	07	57	83	313	5	24	3	437	15	106
	08	323	266	858	125	128	18	937	79	247
	12	171	176	211	92	34	4	191	10	8
	13	267	293	594	178	102	35	994	169	232
	17	207	333	738	753	48	36	454	76	35
	18	27	32	59	58	5	1	108	25	7
	21	161	230	541	154	70	16	840	133	32
	22	215	324	699	45	82	7	1211	72	338
	24	260	330	1544	50	88	28	760	40	69
	26	0	2	2	0	0	0	9	0	3017
	28	161	282	574	120	107	15	626	84	50
	30	159	262	603	146	60	15	816	137	86
	32	24	24	57	57	133	133	3	3	637
	34	122	195	367	98	48	2	439	20	94
	35	206	348	1629	381	57	2	854	59	493
	36	46	64	144	41	14	0	253	21	31
	37	205	320	1370	1200	86	18	942	296	17
	39	155	233	1563	814	74	33	694	131	553
	40	179	227	507	124	86	16	507	65	66
	42	86	127	157	60	21	3	507	3	6
	43	77	86	953	361	68	24	902	116	65
	46	148	372	833	26	223	39	1666	22	556
	48	37	71	125	3	29	2	422	6	333
	49	98	111	247	15	36	6	922	10	161
	51	189	216	868	459	57	20	412	66	206
	52	566	625	3943	1931	166	43	1608	224	675
	54	184	227	2697	1291	138	22	1193	152	665
	56	0	1	328	1559	160	26	869	155	332
	58	235	337	1437	790	87	18	512	38	194
Cliniche specializzate	Totale	980	1076	1888	1851	368	46	1663	151	254
	01	178	165	356	640	32	8	162	14	0
	02	84	35	170	21	13	2	100	7	1
	09	9	14	22	11	22	1	9	5	0
	10	9	2	20	0	11	0	19	13	0
	14
	15	21	21	19	14	2	4	46	12	3
	19	55	34	29	17	9	1	46	13	2

	occu- pato a tempo parziale	occu- pato a tempo pieno	inoccu- pato o disoccu- pato	lavoro dome- stico nello propria econo- mia dome- stica	in for- mazione (scuola, tirocinio, studio)	pro- gramma di riabi- litazione	AI, AVS o altra rendita	lavoro in ambito protetto	scono- sciuto	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
23	78	57	174	56	24	6	183	20	1	
25	12	33	75	0	38	0	34	0	1	
27	11	8	30	4	11	3	59	3	3	
29	108	155	55	189	7	1	22	2	0	
33	21	22	32	36	5	3	61	12	0	
38	78	101	186	321	38	3	78	12	1	
44	23	53	105	4	10	0	168	4	4	
45	9	13	41	0	1	1	121	3	1	
47	2	18	27	1	43	0	15	0	0	
50	58	50	121	31	38	1	115	16	8	
57	0	0	23	276	7	1	43	0	3	
59	36	28	149	142	5	5	48	6	7	
60	61	33	45	50	10	1	84	7	80	
61	40	57	29	29	1	4	43	1	2	
62	2	9	4	3	17	1	3	0	0	
63	78	159	165	3	22	0	192	0	119	
67	7	9	11	3	2	0	12	1	18	
Cliniche per la cura di dipen- denze	Totale	161	400	969	456	43	15	194	85	132
04	15	29	84	7	21	0	19	7	0	
05	15	28	107	58	0	5	22	6	4	
11	50	83	180	12	0	0	56	21	0	
16	4	47	160	3	7	7	8	27	0	
31	6	22	45	0	1	0	9	1	0	
53	5	19	106	46	3	3	6	5	43	
55	65	149	275	328	9	0	58	16	85	
68	1	23	12	2	2	0	16	2	0	

Tabella 27: occupazione prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione




Figura 76: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

		Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
		domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
	Tutti	45977	1265	1649	5966	1844	7173	293	2744	2151	4
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	38710	1229	1641	5782	1344	6785	277	2585	1947	4
	03	2084	131	122	389	39	153	4	116	44	0
	06	448	3	8	120	4	110	0	18	4	0
	07	503	2	24	100	16	304	1	13	0	0
	08	1544	129	78	282	61	110	8	102	424	0
	12	667	10	3	5	32	31	0	12	0	0
	13	1068	135	60	297	68	477	3	84	268	2
	17	1018	17	28	73	38	79	1	21	9	0
	18	198	0	1	17	14	24	0	7	2	0
	21	1196	51	25	263	37	195	4	100	0	0
	22	2255	14	23	260	10	137	1	135	181	0
	24	1647	25	72	286	8	71	12	81	1	0
	26	1089	154	122	161	16	1156	3	262	67	0
	28	1381	39	24	157	12	72	8	77	8	0
	30	1675	9	47	210	107	222	19	31	3	2
	32	468	8	33	77	1	11	8	15	159	0
	34	962	10	19	118	8	82	6	48	15	0
	35	1397	10	67	173	16	146	28	43	311	0
	36	434	4	9	51	6	72	6	20	7	0
	37	1323	27	29	265	31	138	13	70	2	0
	39	1437	58	40	185	26	130	2	66	13	0
	40	1354	25	10	74	39	74	1	14	15	0
	42	817	4	0	27	19	99	1	5	1	0

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione										
	domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
43	441	153	41	89	52	511	10	83	6	0	
46	2062	0	148	489	171	828	0	196	19	0	
48	646	0	89	3	80	215	1	16	11	0	
49	909	0	126	114	33	493	6	45	1	0	
51	864	11	27	151	17	163	7	57	4	0	
52	3135	96	153	580	250	295	62	374	196	0	
54	2143	59	97	390	45	43	26	305	0	0	
56	1745	34	58	235	47	135	24	81	108	0	
58	1485	11	57	141	36	118	12	82	68	0	
66	315	0	1	0	5	91	0	6	0	0	
Cliniche specializzate	Totale	5987	30	1	110	190	290	0	62	203	0
01	680	1	0	3	6	4	0	7	13	0	
02	424	1	0	4	3	3	0	0	0	0	
09	73	0	0	1	4	3	0	0	0	0	
10	30	0	0	7	21	0	0	0	0	0	
14	
15	118	2	0	4	1	9	0	3	1	0	
19	249	4	0	9	10	1	0	5	10	0	
23	478	6	0	20	10	9	0	7	0	0	
25	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	116	1	0	7	4	2	0	3	7	0	
29	325	0	0	1	4	0	0	0	0	0	
33	173	0	0	5	10	32	0	2	7	0	
38	320	6	0	3	17	13	0	4	2	0	
44	341	3	1	8	8	19	0	0	0	0	

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione										
	domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
45	149	0	0	4	3	25	0	0	0	0	
47	99	0	0	0	2	18	0	5	0	0	
50	413	0	0	8	6	7	0	1	0	0	
57	317	0	0	2	18	17	0	3	132	0	
59	167	5	0	21	7	4	0	8	1	0	
60	280	0	0	3	2	10	0	2	29	0	
61	173	1	0	0	2	3	0	1	0	0	
62	29	0	0	0	1	3	0	3	1	0	
63	597	0	0	0	48	98	0	8	0	0	
65	197	0	0	0	3	10	0	0	0	0	
67	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1280	6	7	74	310	98	16	97	1	0
04	114	0	0	12	24	0	5	12	0	0	
05	52	0	2	0	90	5	3	5	0	0	
11	241	0	0	3	102	42	0	1	0	0	
16	193	0	1	24	11	1	1	32	0	0	
20	100	0	0	18	16	5	3	5	0	0	
31	35	0	1	0	34	13	0	0	0	0	
53	89	6	0	9	1	2	4	22	1	0	
55	420	0	3	6	32	11	0	20	0	0	
68	36	0	0	2	0	19	0	0	0	0	

Tabella 28: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (numero di casi)

Luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)

		Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
		domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Tutti	67%	2%	2%	9%	3%	10%	0%	4%	3%	0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	64%	2%	3%	10%	2%	11%	0%	4%	3%	0%
	03	68%	4%	4%	13%	1%	5%	0%	4%	1%	0%
	06	63%	0%	1%	17%	1%	15%	0%	3%	1%	0%
	07	52%	0%	2%	10%	2%	32%	0%	1%	0%	0%
	08	56%	5%	3%	10%	2%	4%	0%	4%	15%	0%
	12	88%	1%	0%	1%	4%	4%	0%	2%	0%	0%
	13	43%	5%	2%	12%	3%	19%	0%	3%	11%	0%
	17	79%	1%	2%	6%	3%	6%	0%	2%	1%	0%
	18	75%	0%	0%	6%	5%	9%	0%	3%	1%	0%
	21	64%	3%	1%	14%	2%	10%	0%	5%	0%	0%
	22	75%	0%	1%	9%	0%	5%	0%	4%	6%	0%
	24	75%	1%	3%	13%	0%	3%	1%	4%	0%	0%
	26	36%	5%	4%	5%	1%	38%	0%	9%	2%	0%
	28	78%	2%	1%	9%	1%	4%	0%	4%	0%	0%
	30	72%	0%	2%	9%	5%	10%	1%	1%	0%	0%
	32	60%	1%	4%	10%	0%	1%	1%	2%	20%	0%
	34	76%	1%	1%	9%	1%	6%	0%	4%	1%	0%
	35	64%	0%	3%	8%	1%	7%	1%	2%	14%	0%
	36	71%	1%	1%	8%	1%	12%	1%	3%	1%	0%
	37	70%	1%	2%	14%	2%	7%	1%	4%	0%	0%
	39	73%	3%	2%	9%	1%	7%	0%	3%	1%	0%
	40	84%	2%	1%	5%	2%	5%	0%	1%	1%	0%
	42	84%	0%	0%	3%	2%	10%	0%	1%	0%	0%

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione									
	domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
43	32%	11%	3%	6%	4%	37%	1%	6%	0%	0%
46	53%	0%	4%	12%	4%	21%	0%	5%	0%	0%
48	61%	0%	8%	0%	8%	20%	0%	2%	1%	0%
49	53%	0%	7%	7%	2%	29%	0%	3%	0%	0%
51	66%	1%	2%	12%	1%	13%	1%	4%	0%	0%
52	61%	2%	3%	11%	5%	6%	1%	7%	4%	0%
54	69%	2%	3%	13%	1%	1%	1%	10%	0%	0%
56	71%	1%	2%	10%	2%	5%	1%	3%	4%	0%
58	74%	1%	3%	7%	2%	6%	1%	4%	3%	0%
66	75%	0%	0%	0%	1%	22%	0%	1%	0%	0%
Cliniche specializzate Totale	87%	0%	0%	2%	3%	4%	0%	1%	3%	0%
01	95%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	2%	0%
02	97%	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
09	90%	0%	0%	1%	5%	4%	0%	0%	0%	0%
10	52%	0%	0%	12%	36%	0%	0%	0%	0%	0%
14
15	86%	1%	0%	3%	1%	7%	0%	2%	1%	0%
19	86%	1%	0%	3%	3%	0%	0%	2%	3%	0%
23	90%	1%	0%	4%	2%	2%	0%	1%	0%	0%
25	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	83%	1%	0%	5%	3%	1%	0%	2%	5%	0%
29	98%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
33	76%	0%	0%	2%	4%	14%	0%	1%	3%	0%
38	88%	2%	0%	1%	5%	4%	0%	1%	1%	0%
44	90%	1%	0%	2%	2%	5%	0%	0%	0%	0%

	Luogo di soggiorno prima dell'ammissione										
	domicilio	domicilio con assistenza SPI-TEX	casa di cura	casa per anziani, altro stabilimento sanitario	clinica psichiatrica	altro stabilimento ospedaliero	penitenziario	altro	sconosciuto	Indicazione mancata	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
45	82%	0%	0%	2%	2%	14%	0%	0%	0%	0%	
47	80%	0%	0%	0%	2%	15%	0%	4%	0%	0%	
50	95%	0%	0%	2%	1%	2%	0%	0%	0%	0%	
57	65%	0%	0%	0%	4%	3%	0%	1%	27%	0%	
59	78%	2%	0%	10%	3%	2%	0%	4%	0%	0%	
60	86%	0%	0%	1%	1%	3%	0%	1%	9%	0%	
61	96%	1%	0%	0%	1%	2%	0%	1%	0%	0%	
62	78%	0%	0%	0%	3%	8%	0%	8%	3%	0%	
63	79%	0%	0%	0%	6%	13%	0%	1%	0%	0%	
65	94%	0%	0%	0%	1%	5%	0%	0%	0%	0%	
67	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	68%	0%	0%	4%	16%	5%	1%	5%	0%	0%
04	68%	0%	0%	7%	14%	0%	3%	7%	0%	0%	
05	33%	0%	1%	0%	57%	3%	2%	3%	0%	0%	
11	62%	0%	0%	1%	26%	11%	0%	0%	0%	0%	
16	73%	0%	0%	9%	4%	0%	0%	12%	0%	0%	
20	68%	0%	0%	12%	11%	3%	2%	3%	0%	0%	
31	42%	0%	1%	0%	41%	16%	0%	0%	0%	0%	
53	66%	4%	0%	7%	1%	1%	3%	16%	1%	0%	
55	85%	0%	1%	1%	7%	2%	0%	4%	0%	0%	
68	63%	0%	0%	4%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	

Tabella 29: luogo di soggiorno prima dell'ammissione nelle cliniche (quota di casi)

Categoria di classe di stanza occupata




Figura 77: classe di stanza occupata nelle cliniche

Classe di stanza occupata nelle cliniche

		Classe									
		comune		semiprivata		privata		sconosciuto		Indicazione mancata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
	Tutti	64192	92.9%	3058	4.4%	1751	2.5%	61	.1%	4	.0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	57578	95.5%	1757	2.9%	917	1.5%	48	.1%	4	.0%
	03	3005	97.5%	54	1.8%	18	.6%	5	.2%	0	0.0%
	06	683	95.5%	25	3.5%	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%
	07	963	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	08	2592	94.7%	100	3.7%	33	1.2%	13	.5%	0	0.0%
	12	577	75.9%	147	19.3%	36	4.7%	0	0.0%	0	0.0%
	13	2381	96.7%	60	2.4%	3	.1%	16	.6%	2	.1%
	17	1055	82.2%	172	13.4%	51	4.0%	6	.5%	0	0.0%
	18	261	99.2%	1	.4%	0	0.0%	1	.4%	0	0.0%
	21	1761	94.1%	76	4.1%	34	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	22	2757	91.4%	162	5.4%	97	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
	24	2203	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	26	3030	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	28	1719	96.7%	47	2.6%	12	.7%	0	0.0%	0	0.0%
	30	2321	99.8%	2	.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	.1%
	32	778	99.7%	0	0.0%	2	.3%	0	0.0%	0	0.0%
	34	1268	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	35	2191	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	36	585	96.1%	15	2.5%	9	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
	37	1898	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	39	1948	99.5%	2	.1%	0	0.0%	7	.4%	0	0.0%
	40	1472	91.7%	106	6.6%	28	1.7%	0	0.0%	0	0.0%
	42	875	89.9%	50	5.1%	48	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
	43	1386	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	46	3851	98.4%	43	1.1%	19	.5%	0	0.0%	0	0.0%
	48	1061	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	49	1720	99.6%	0	0.0%	7	.4%	0	0.0%	0	0.0%
	51	1225	94.2%	51	3.9%	25	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
	52	4932	95.9%	118	2.3%	91	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
	54	2956	95.1%	128	4.1%	24	.8%	0	0.0%	0	0.0%
	56	2100	85.1%	152	6.2%	215	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
	58	1607	80.0%	246	12.2%	157	7.8%	0	0.0%	0	0.0%
	66	417	99.8%	0	0.0%	1	.2%	0	0.0%	0	0.0%
Cliniche specializzate	Totale	4725	68.7%	1301	18.9%	834	12.1%	13	.2%	0	0.0%
	01	456	63.9%	192	26.9%	66	9.2%	0	0.0%	0	0.0%
	02	381	87.6%	37	8.5%	17	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
	09	69	85.2%	12	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	10	58	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	14
	15	129	93.5%	8	5.8%	1	.7%	0	0.0%	0	0.0%
	19	268	93.1%	19	6.6%	1	.3%	0	0.0%	0	0.0%
	23	504	95.1%	21	4.0%	5	.9%	0	0.0%	0	0.0%
	25	193	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

	Classe										
	comune		semiprivata		privata		sconosciuto		Indicazione mancata		
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	
27	137	97.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
29	227	68.8%	74	22.4%	29	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
33	220	96.1%	7	3.1%	2	.9%	0	0.0%	0	0.0%	
38	238	65.2%	94	25.8%	33	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	
44	148	38.9%	37	9.7%	195	51.3%	0	0.0%	0	0.0%	
45	164	90.6%	10	5.5%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	
47	124	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
50	369	84.8%	53	12.2%	13	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	
57	0	0.0%	271	55.4%	218	44.6%	0	0.0%	0	0.0%	
59	199	93.4%	11	5.2%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	
60	258	79.1%	53	16.3%	15	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	
61	125	69.4%	36	20.0%	19	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	
62	36	97.3%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
63	302	40.2%	272	36.2%	166	22.1%	11	1.5%	0	0.0%	
65	90	42.9%	80	38.1%	38	18.1%	2	1.0%	0	0.0%	
67	30	65.2%	10	21.7%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1889	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
04	167	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
05	157	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
11	389	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
16	263	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
20	147	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
31	83	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
53	134	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
55	492	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
68	57	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

Tabella 30: classe di stanza occupata nelle cliniche

Istanza ricoverante




Figura 78: istanza ricoverante nelle cliniche

Istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)

		Istanza ricoverante								
		Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
		Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
	Tutti	13612	899	51069	624	466	416	834	1142	4
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	12115	882	44223	486	343	390	791	1070	4
	03	628	19	2327	17	5	19	63	4	0
	06	349	14	337	3	1	2	9	0	0
	07	190	3	748	5	2	10	5	0	0
	08	167	18	2428	18	10	11	70	16	0
	12	27	0	717	12	2	0	2	0	0
	13	134	0	2264	8	19	1	28	6	2
	17	38	3	1222	10	0	1	3	7	0
	18	20	0	239	1	0	2	0	1	0
	21	240	13	1526	30	19	7	36	0	0
	22	1435	338	1131	40	10	2	24	36	0
	24	465	42	1578	26	5	37	48	2	0
	26	25	0	2943	0	0	24	12	26	0
	28	323	11	1050	0	12	8	60	314	0
	30	166	6	2090	15	14	18	14	0	2
	32	44	1	571	0	4	4	9	147	0
	34	361	3	842	11	4	14	31	2	0
	35	654	6	1451	9	14	40	17	0	0
	36	221	15	353	2	3	3	10	2	0
	37	417	16	1323	71	6	3	61	1	0
	39	652	43	1164	12	3	5	66	12	0
	40	137	13	1410	35	3	2	6	0	0
	42	18	3	909	0	40	1	2	0	0
	43	465	86	716	4	81	9	25	0	0
	46	604	0	3030	8	0	3	32	236	0
	48	79	0	916	0	0	28	14	24	0
	49	267	8	1415	23	1	2	9	2	0
	51	210	4	1048	10	13	3	13	0	0
	52	1873	56	3025	30	19	62	30	46	0
	54	882	32	2062	46	17	33	36	0	0
	56	536	88	1579	10	27	24	19	184	0
	58	437	8	1476	30	9	12	37	1	0
	66	51	33	333	0	0	0	0	1	0
Cliniche specializzate	Totale	524	17	6126	99	17	9	17	64	0
	01	11	0	653	23	0	0	0	27	0
	02	2	1	417	3	0	0	4	8	0
	09	9	0	61	11	0	0	0	0	0
	10	1	0	56	1	0	0	0	0	0
	14
	15	6	0	131	1	0	0	0	0	0
	19	5	0	280	2	1	0	0	0	0
	23	0	0	504	24	1	0	1	0	0
	25	0	0	193	0	0	0	0	0	0

	Istanza ricoverante									
	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata	
	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero	
27	59	7	71	0	0	0	3	0	0	
29	0	0	330	0	0	0	0	0	0	
33	42	3	171	0	4	7	2	0	0	
38	28	0	334	3	0	0	0	0	0	
44	103	1	267	4	4	0	1	0	0	
45	0	0	180	0	0	0	1	0	0	
47	0	0	124	0	0	0	0	0	0	
50	67	4	346	9	5	2	2	0	0	
57	36	0	442	11	0	0	0	0	0	
59	105	1	96	7	2	0	2	0	0	
60	12	0	286	0	0	0	1	27	0	
61	5	0	175	0	0	0	0	0	0	
62	8	0	29	0	0	0	0	0	0	
63	17	0	732	0	0	0	0	2	0	
65	0	0	210	0	0	0	0	0	0	
67	8	0	38	0	0	0	0	0	0	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	973	0	720	39	106	17	26	8	0
04	17	0	137	0	0	10	3	0	0	
05	61	0	76	9	1	1	9	0	0	
11	85	0	251	24	19	0	10	0	0	
16	263	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	10	0	57	0	77	2	1	0	0	
31	2	0	77	1	3	0	0	0	0	
53	121	0	1	0	0	3	1	8	0	
55	357	0	121	5	6	1	2	0	0	
68	57	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabella 31: istanza ricoverante nelle cliniche (numero di casi)

Istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)

		Istanza ricoverante								
		Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Tutti	20%	1%	74%	1%	1%	1%	1%	2%	0%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	20%	1%	73%	1%	1%	1%	1%	2%	0%
	03	20%	1%	76%	1%	0%	1%	2%	0%	0%
	06	49%	2%	47%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
	07	20%	0%	78%	1%	0%	1%	1%	0%	0%
	08	6%	1%	89%	1%	0%	0%	3%	1%	0%
	12	4%	0%	94%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
	13	5%	0%	92%	0%	1%	0%	1%	0%	0%
	17	3%	0%	95%	1%	0%	0%	0%	1%	0%
	18	8%	0%	91%	0%	0%	1%	0%	0%	0%
	21	13%	1%	82%	2%	1%	0%	2%	0%	0%
	22	48%	11%	38%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
	24	21%	2%	72%	1%	0%	2%	2%	0%	0%
	26	1%	0%	97%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
	28	18%	1%	59%	0%	1%	0%	3%	18%	0%
	30	7%	0%	90%	1%	1%	1%	1%	0%	0%
	32	6%	0%	73%	0%	1%	1%	1%	19%	0%
	34	28%	0%	66%	1%	0%	1%	2%	0%	0%
	35	30%	0%	66%	0%	1%	2%	1%	0%	0%
	36	36%	2%	58%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
	37	22%	1%	70%	4%	0%	0%	3%	0%	0%
	39	33%	2%	59%	1%	0%	0%	3%	1%	0%
	40	9%	1%	88%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
	42	2%	0%	93%	0%	4%	0%	0%	0%	0%
	43	34%	6%	52%	0%	6%	1%	2%	0%	0%
	46	15%	0%	77%	0%	0%	0%	1%	6%	0%
	48	7%	0%	86%	0%	0%	3%	1%	2%	0%
	49	15%	0%	82%	1%	0%	0%	1%	0%	0%
	51	16%	0%	81%	1%	1%	0%	1%	0%	0%
	52	36%	1%	59%	1%	0%	1%	1%	1%	0%
	54	28%	1%	66%	1%	1%	1%	1%	0%	0%
	56	22%	4%	64%	0%	1%	1%	1%	7%	0%
	58	22%	0%	73%	1%	0%	1%	2%	0%	0%
	66	12%	8%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cliniche specializzate	Totale	8%	0%	89%	1%	0%	0%	0%	1%	0%
	01	2%	0%	91%	3%	0%	0%	0%	4%	0%
	02	0%	0%	96%	1%	0%	0%	1%	2%	0%
	09	11%	0%	75%	14%	0%	0%	0%	0%	0%
	10	2%	0%	97%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
	14
	15	4%	0%	95%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	19	2%	0%	97%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
	23	0%	0%	95%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
	25	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	Istanza ricoverante								
	Paziente stesso, familiare	Servizio di soccorso	Medico	Terapista non medico	Servizio sociosanitario	Autorità giudiziarie	Altro	Sconosciuto	Indicazione mancata
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
27	42%	5%	51%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
29	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	18%	1%	75%	0%	2%	3%	1%	0%	0%
38	8%	0%	92%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
44	27%	0%	70%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
45	0%	0%	99%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
47	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	15%	1%	80%	2%	1%	0%	0%	0%	0%
57	7%	0%	90%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
59	49%	0%	45%	3%	1%	0%	1%	0%	0%
60	4%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	8%	0%
61	3%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
62	22%	0%	78%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
63	2%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
65	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	17%	0%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cliniche per la cura di dipendenze Totale	52%	0%	38%	2%	6%	1%	1%	0%	0%
04	10%	0%	82%	0%	0%	6%	2%	0%	0%
05	39%	0%	48%	6%	1%	1%	6%	0%	0%
11	22%	0%	65%	6%	5%	0%	3%	0%	0%
16	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	7%	0%	39%	0%	52%	1%	1%	0%	0%
31	2%	0%	93%	1%	4%	0%	0%	0%	0%
53	90%	0%	1%	0%	0%	2%	1%	6%	0%
55	73%	0%	25%	1%	1%	0%	0%	0%	0%
68	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabella 32: istanza ricoverante nelle cliniche (quota di casi)

Durata della degenza

Durata della degenza nelle cliniche

		Durata della degenza								
		Valore medio	+/- SD	Minimo	Per-centile 25	Mediana	Per-centile 75	Massimo	N valide	Manca
	Tutti	32	35	-1	8	22	44	846	69061	5
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	30	35	-1	7	20	41	846	60299	5
	03	29	29	0	8	21	42	353	3082	0
	06	32	38	0	6	18	44	302	715	0
	07	28	34	1	10	19	34	368	963	0
	08	28	40	0	5	16	35	834	2738	0
	12	38	20	1	24	37	50	144	760	0
	13	35	47	0	8	20	44	588	2462	0
	17	50	38	0	25	48	69	539	1284	0
	18	32	24	1	14	26	45	148	263	0
	21	37	39	0	10	25	51	406	1871	0
	22	27	31	0	4	16	40	231	3016	0
	24	26	32	0	8	17	30	316	2203	0
	26	25	42		6	13	28	797	3030	0
	28	31	32	0	8	23	44	313	1778	0
	30	36	53	0	7	20	45	846	2325	0
	32	38	42	0	14	25	45	341	780	0
	34	42	44	0	11	29	57	424	1268	0
	35	33	38	-1	7	20	45	407	2186	5
	36	32	41	0	8	19	40	367	609	0
	37	19	20	1	6	13	27	247	1898	0
	39	35	39	0	7	22	53	272	1957	0
	40	37	24	1	18	36	55	139	1606	0
	42	31	26	1	13	25	43	263	973	0
	43	31	33	1	8	20	41	376	1386	0
	46	25	27	0	8	17	33	518	3913	0
	48	21	31	0	5	10	23	280	1061	0
	49	26	35	0	7	15	32	573	1727	0
	51	34	44	0	9	27	44	772	1301	0
	52	27	29	0	5	17	37	320	5141	0
	54	22	24		5	12	31	161	3108	0
	56	31	26	0	10	25	46	302	2467	0
	58	28	25	0	9	23	41	289	2010	0
	66	31	24	0	12	27	43	129	418	0
Cliniche specializzate	Totale	42	28	0	22	40	56	278	6873	0
	01	46	17	1	37	47	56	118	714	0
	02	48	25	0	29	43	59	163	435	0
	09	60	30	1	44	58	86	113	81	0
	10	54	26	4	40	59	71	115	58	0
	15	34	26	3	15	27	47	130	138	0
	19	46	17	0	38	49	56	91	288	0
	23	43	21	1	30	44	56	114	530	0
	25	45	43	1	19	32	56	255	193	0
	27	21	29	0	5	11	26	208	140	0

	Durata della degenza									
	Valore medio	+/- SD	Minimo	Per-centile 25	Mediana	Per-centile 75	Massimo	N valide	Manca	
29	37	9	1	33	40	40	61	330	0	
33	30	29	0	9	21	41	159	229	0	
38	54	24	0	39	56	69	146	365	0	
44	35	31	1	13	28	48	177	380	0	
45	45	35	1	20	37	55	169	181	0	
47	41	29	0	15	37	61	118	124	0	
50	59	42	0	25	56	85	224	435	0	
57	47	22	1	32	47	62	110	489	0	
59	35	25	1	16	29	49	136	213	0	
60	41	25	1	21	39	60	131	326	0	
61	39	21	1	25	36	48	117	180	0	
62	115	48	4	89	116	152	187	37	0	
63	33	28	0	14	27	46	278	751	0	
65	22	12	1	14	20	29	78	210	0	
67	18	6	1	18	20	20	33	46	0	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	59	53	0	20	42	87	644	1889	0
	04	77	97	0	20	32	119	644	167	0
	05	112	63	0	68	112	168	244	157	0
	11	60	35	1	29	56	84	153	389	0
	16	31	22	0	11	28	44	89	263	0
	20	36	39	0	14	23	44	211	147	0
	31	76	33	1	56	96	98	128	83	0
	53	25	22	1	9	20	34	104	134	0
	55	68	48	1	27	61	102	238	492	0
	68	23	2	10	23	23	23	57	0	0

Tabella 33: durata della degenza nelle cliniche

Degenze di breve durata




Figura 79: quota di degenze di breve durata nelle cliniche

Quota di degenze di breve durata (<= 7 giorni) nelle cliniche

		Degenza di breve durata			
		Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni	
		Numero	%	Numero	%
	Tutti	52982	76.7%	16084	23.3%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	44951	74.5%	15353	25.5%
	03	2373	77.0%	709	23.0%
	06	496	69.4%	219	30.6%
	07	782	81.2%	181	18.8%
	08	1879	68.6%	859	31.4%
	12	715	94.1%	45	5.9%
	13	1890	76.8%	572	23.2%
	17	1152	89.7%	132	10.3%
	18	233	88.6%	30	11.4%
	21	1501	80.2%	370	19.8%
	22	1909	63.3%	1107	36.7%
	24	1669	75.8%	534	24.2%
	26	2098	69.2%	932	30.8%
	28	1369	77.0%	409	23.0%
	30	1724	74.2%	601	25.8%
	32	675	86.5%	105	13.5%
	34	1034	81.5%	234	18.5%
	35	1629	74.3%	562	25.7%
	36	473	77.7%	136	22.3%
	37	1296	68.3%	602	31.7%
	39	1426	72.9%	531	27.1%
	40	1416	88.2%	190	11.8%
	42	839	86.2%	134	13.8%
	43	1091	78.7%	295	21.3%
	46	2995	76.5%	918	23.5%
	48	646	60.9%	415	39.1%
	49	1273	73.7%	454	26.3%
	51	1017	78.2%	284	21.8%
	52	3492	67.9%	1649	32.1%
	54	1940	62.4%	1168	37.6%
	56	1989	80.6%	478	19.4%
	58	1583	78.8%	427	21.2%
	66	347	83.0%	71	17.0%
Cliniche specializzate	Totale	6300	91.7%	573	8.3%
	01	692	96.9%	22	3.1%
	02	427	98.2%	8	1.8%
	09	74	91.4%	7	8.6%
	10	55	94.8%	3	5.2%
	14
	15	124	89.9%	14	10.1%
	19	281	97.6%	7	2.4%
	23	495	93.4%	35	6.6%
	25	178	92.2%	15	7.8%
	27	88	62.9%	52	37.1%
	29	328	99.4%	2	.6%

	Degenza di breve durata				
	Degenza > 7 giorni		Degenza <= 7 giorni		
	Numero	%	Numero	%	
33	181	79.0%	48	21.0%	
38	349	95.6%	16	4.4%	
44	313	82.4%	67	17.6%	
45	169	93.4%	12	6.6%	
47	111	89.5%	13	10.5%	
50	387	89.0%	48	11.0%	
57	470	96.1%	19	3.9%	
59	188	88.3%	25	11.7%	
60	308	94.5%	18	5.5%	
61	172	95.6%	8	4.4%	
62	35	94.6%	2	5.4%	
63	638	85.0%	113	15.0%	
65	196	93.3%	14	6.7%	
67	41	89.1%	5	10.9%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1731	91.6%	158	8.4%
	04	147	88.0%	20	12.0%
	05	149	94.9%	8	5.1%
	11	372	95.6%	17	4.4%
	16	225	85.6%	38	14.4%
	20	128	87.1%	19	12.9%
	31	80	96.4%	3	3.6%
	53	105	78.4%	29	21.6%
	55	468	95.1%	24	4.9%
	68	57	100.0%	0	0.0%

Tabella 34: quota di degenze di breve durata nelle cliniche

Casi esclusi (HoNOS)

I casi dalla qualità dei dati insufficiente (indicazioni mancanti concernenti il sesso, l'età, la diagnosi principale oppure qualità dei dati HoNOS lacunosa, vedi rapporto sulla qualità dei dati), HoNOS drop-outs e/o quelli ri-guardanti degenze di breve durata sono esclusi dai confronti tra cliniche.




Figura 80: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

		Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (HoNOS)			
		validi		esclusi	
		Numero	%	Numero	%
	Tutti	46812	67.8%	22254	32.2%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	39605	65.7%	20699	34.3%
	03	2069	67.1%	1013	32.9%
	06	489	68.4%	226	31.6%
	07	456	47.4%	507	52.6%
	08	1760	64.3%	978	35.7%
	12	712	93.7%	48	6.3%
	13	1760	71.5%	702	28.5%
	17	1148	89.4%	136	10.6%
	18	216	82.1%	47	17.9%
	21	1211	64.7%	660	35.3%
	22	1774	58.8%	1242	41.2%
	24	1445	65.6%	758	34.4%
	26	1202	39.7%	1828	60.3%
	28	1354	76.2%	424	23.8%
	30	1416	60.9%	909	39.1%
	32	506	64.9%	274	35.1%
	34	942	74.3%	326	25.7%
	35	1547	70.6%	644	29.4%
	36	471	77.3%	138	22.7%
	37	1000	52.7%	898	47.3%
	39	1417	72.4%	540	27.6%
	40	1393	86.7%	213	13.3%
	42	806	82.8%	167	17.2%
	43	1025	74.0%	361	26.0%
	46	2266	57.9%	1647	42.1%
	48	550	51.8%	511	48.2%
	49	1097	63.5%	630	36.5%
	51	1001	76.9%	300	23.1%
	52	3315	64.5%	1826	35.5%
	54	1638	52.7%	1470	47.3%
	56	1965	79.7%	502	20.3%
	58	1506	74.9%	504	25.1%
	66	148	35.4%	270	64.6%
Cliniche specializzate	Totale	5654	82.3%	1219	17.7%
	01	665	93.1%	49	6.9%
	02	394	90.6%	41	9.4%
	09	71	87.7%	10	12.3%
	10	46	79.3%	12	20.7%
	14
	15	91	65.9%	47	34.1%
	19	271	94.1%	17	5.9%
	23	488	92.1%	42	7.9%
	25	86	44.6%	107	55.4%
	27	76	54.3%	64	45.7%

	Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (HoNOS)				
	validi		esclusi		
	Numero	%	Numero	%	
29	308	93.3%	22	6.7%	
33	155	67.7%	74	32.3%	
38	348	95.3%	17	4.7%	
44	312	82.1%	68	17.9%	
45	169	93.4%	12	6.6%	
47	67	54.0%	57	46.0%	
50	346	79.5%	89	20.5%	
57	468	95.7%	21	4.3%	
59	180	84.5%	33	15.5%	
60	289	88.7%	37	11.3%	
61	171	95.0%	9	5.0%	
62	35	94.6%	2	5.4%	
63	489	65.1%	262	34.9%	
65	94	44.8%	116	55.2%	
67	35	76.1%	11	23.9%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1553	82.2%	336	17.8%
04	46	27.5%	121	72.5%	
05	148	94.3%	9	5.7%	
11	366	94.1%	23	5.9%	
16	216	82.1%	47	17.9%	
20	88	59.9%	59	40.1%	
31	72	86.7%	11	13.3%	
53	95	70.9%	39	29.1%	
55	467	94.9%	25	5.1%	
68	55	96.5%	2	3.5%	

Tabella 35: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (HoNOS)

Quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)

		Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (BSCL)			
		validi		esclusi	
		Numero	%	Numero	%
	Tutti	19863	28.8%	49203	71.2%
Fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta	Totale	14741	24.4%	45563	75.6%
	03	451	14.6%	2631	85.4%
	06	280	39.2%	435	60.8%
	07	279	29.0%	684	71.0%
	08	532	19.4%	2206	80.6%
	12	331	43.6%	429	56.4%
	13	453	18.4%	2009	81.6%
	17	753	58.6%	531	41.4%
	18	163	62.0%	100	38.0%
	21	485	25.9%	1386	74.1%
	22	694	23.0%	2322	77.0%
	24	740	33.6%	1463	66.4%
	26	556	18.3%	2474	81.7%
	28	672	37.8%	1106	62.2%
	30	464	20.0%	1861	80.0%
	32	228	29.2%	552	70.8%
	34	398	31.4%	870	68.6%
	35	580	26.5%	1611	73.5%
	36	170	27.9%	439	72.1%
	37	302	15.9%	1596	84.1%
	39	617	31.5%	1340	68.5%
	40	993	61.8%	613	38.2%
	42	417	42.9%	556	57.1%
	43	330	23.8%	1056	76.2%
	46	472	12.1%	3441	87.9%
	48	102	9.6%	959	90.4%
	49	467	27.0%	1260	73.0%
	51	337	25.9%	964	74.1%
	52	550	10.7%	4591	89.3%
	54	357	11.5%	2751	88.5%
	56	980	39.7%	1487	60.3%
	58	482	24.0%	1528	76.0%
	66	106	25.4%	312	74.6%
Cliniche specializzate	Totale	3964	57.7%	2909	42.3%
	01	580	81.2%	134	18.8%
	02	261	60.0%	174	40.0%
	09	50	61.7%	31	38.3%
	10	46	79.3%	12	20.7%
	14
	15	68	49.3%	70	50.7%
	19	220	76.4%	68	23.6%
	23	354	66.8%	176	33.2%
	25	60	31.1%	133	68.9%
	27	18	12.9%	122	87.1%

	Casi validi/invalidi (vale a dire esclusi) dai confronti tra cliniche (BSCL)				
	validi		esclusi		
	Numero	%	Numero	%	
29	264	80.0%	66	20.0%	
33	44	19.2%	185	80.8%	
38	303	83.0%	62	17.0%	
44	271	71.3%	109	28.7%	
45	111	61.3%	70	38.7%	
47	21	16.9%	103	83.1%	
50	173	39.8%	262	60.2%	
57	282	57.7%	207	42.3%	
59	60	28.2%	153	71.8%	
60	269	82.5%	57	17.5%	
61	100	55.6%	80	44.4%	
62	30	81.1%	7	18.9%	
63	327	43.5%	424	56.5%	
65	41	19.5%	169	80.5%	
67	11	23.9%	35	76.1%	
Cliniche per la cura di dipendenze	Totale	1158	61.3%	731	38.7%
04	31	18.6%	136	81.4%	
05	104	66.2%	53	33.8%	
11	280	72.0%	109	28.0%	
16	141	53.6%	122	46.4%	
20	85	57.8%	62	42.2%	
31	65	78.3%	18	21.7%	
53	64	47.8%	70	52.2%	
55	335	68.1%	157	31.9%	
68	53	93.0%	4	7.0%	

Tabella 36: quota di casi esclusi dai confronti tra cliniche (BSCL)

A2. Risultato della misurazione (fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta)

Valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS

		Residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	39605	.00	.01	-0.010	0.010
	03	2069	-.09	.02	-0.138	-0.050
	06	489	-.07	.04	-0.151	0.011
	07	456	.42	.04	0.343	0.488
	08	1760	.16	.02	0.121	0.208
	12	712	.03	.03	-0.030	0.090
	13	1760	-.14	.02	-0.185	-0.091
	17	1148	.22	.03	0.159	0.287
	18	216	-.09	.07	-0.219	0.038
	21	1211	-.07	.02	-0.116	-0.022
	22	1774	.34	.03	0.282	0.395
	24	1445	.37	.03	0.325	0.424
	26	1202	.06	.03	0.012	0.116
	28	1354	-.10	.02	-0.146	-0.049
	30	1416	.16	.03	0.100	0.214
	32	506	.68	.04	0.608	0.746
	34	942	.07	.03	0.016	0.115
	35	1547	-.04	.02	-0.086	0.011
	36	471	.00	.03	-0.065	0.061
	37	1000	.33	.02	0.287	0.381
	39	1417	-.58	.03	-0.641	-0.521
	40	1393	-.07	.02	-0.115	-0.029
	42	806	.31	.03	0.263	0.366
	43	1025	.22	.04	0.132	0.302
	46	2266	.13	.02	0.094	0.170
	48	550	-.02	.04	-0.094	0.045
	49	1097	.00	.03	-0.062	0.061
	51	1001	.00	.03	-0.054	0.058
	52	3315	-.48	.02	-0.512	-0.444
	54	1638	.02	.02	-0.021	0.060
56	1965	.00	.02	-0.035	0.040	
58	1506	-.29	.02	-0.335	-0.240	
66	148	-.18	.09	-0.360	-0.003	

Tabella 37: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: (valore differenza HoNOS)

Clinica	Valore test = 0					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-4.173	2068	.000	-.09413	-.1685	-.0198
06	-1.698	488	.090	-.06993	-.2063	.0664
07	11.243	455	.000	.41561	.2932	.5380
08	7.413	1759	.000	.16440	.0913	.2375
12	.982	711	.327	.03016	-.0713	.1317
13	-5.740	1759	.000	-.13781	-.2169	-.0587
17	6.817	1147	.000	.22288	.1150	.3307
18	-1.384	215	.168	-.09075	-.3095	.1280
21	-2.887	1210	.004	-.06887	-.1476	.0098
22	11.695	1773	.000	.33838	.2430	.4337
24	14.956	1444	.000	.37451	.2919	.4571
26	2.396	1201	.017	.06362	-.0240	.1512
28	-3.937	1353	.000	-.09766	-.1795	-.0159
30	5.372	1415	.000	.15713	.0607	.2536
32	19.330	505	.000	.67691	.5610	.7928
34	2.608	941	.009	.06587	-.0175	.1492
35	-1.511	1546	.131	-.03749	-.1193	.0443
36	-.063	470	.950	-.00203	-.1083	.1042
37	13.910	999	.000	.33390	.2547	.4131
39	-18.951	1416	.000	-.58109	-.6822	-.4800
40	-3.278	1392	.001	-.07217	-.1448	.0004
42	12.000	805	.000	.31481	.2282	.4014
43	4.994	1024	.000	.21653	.0734	.3596
46	6.746	2265	.000	.13206	.0676	.1966
48	-.690	549	.490	-.02454	-.1422	.0931
49	-.011	1096	.992	-.00033	-.1033	.1027
51	.082	1000	.935	.00233	-.0919	.0966
52	-27.766	3314	.000	-.47805	-.5347	-.4213
54	.930	1637	.352	.01936	-.0492	.0879
56	.123	1964	.902	.00233	-.0604	.0651
58	-11.890	1505	.000	-.28788	-.3677	-.2081
66	-1.996	147	.048	-.18145	-.4868	.1239

Tabella 38: test di significatività: (valore differenziale HoNOS) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Autovalutazione: valore differenza BSCL

		Residuo standardizzato (valore differenza BSCL)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	14741	.00	.01	-0.016	0.016
	03	451	.02	.05	-0.071	0.107
	06	280	-.08	.07	-0.206	0.052
	07	279	.08	.06	-0.039	0.192
	08	532	-.02	.04	-0.104	0.059
	12	331	-.12	.05	-0.222	-0.016
	13	453	.06	.04	-0.028	0.146
	17	753	.03	.03	-0.041	0.095
	18	163	.03	.08	-0.128	0.195
	21	485	.07	.04	-0.016	0.160
	22	694	-.10	.04	-0.183	-0.025
	24	740	.12	.03	0.047	0.183
	26	556	-.03	.05	-0.122	0.058
	28	672	-.12	.04	-0.203	-0.047
	30	464	-.02	.05	-0.107	0.075
	32	228	.25	.07	0.112	0.378
	34	398	.07	.05	-0.034	0.172
	35	580	.02	.04	-0.064	0.106
	36	170	-.01	.08	-0.180	0.152
	37	302	.05	.05	-0.053	0.157
	39	617	-.13	.04	-0.201	-0.052
	40	993	.04	.02	-0.007	0.085
	42	417	-.03	.05	-0.133	0.082
	43	330	-.06	.06	-0.183	0.068
	46	472	.06	.05	-0.032	0.149
	48	102	.11	.10	-0.079	0.302
	49	467	.09	.05	-0.014	0.185
	51	337	.05	.05	-0.046	0.143
	52	550	.09	.04	0.015	0.160
	54	357	-.29	.06	-0.402	-0.175
	56	980	.05	.03	-0.017	0.113
	58	482	-.17	.05	-0.266	-0.079
	66	106	.07	.09	-0.097	0.239

Tabella 39: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: (valore differenza BSCL)

Clinica	Valore test = 0					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	.395	450	.693	.01796	-.1327	.1686
06	-1.172	279	.242	-.07712	-.2959	.1417
07	1.290	278	.198	.07608	-.1200	.2722
08	-.539	531	.590	-.02245	-.1603	.1154
12	-2.268	330	.024	-.11912	-.2935	.0553
13	1.336	452	.182	.05919	-.0875	.2059
17	.778	752	.437	.02709	-.0879	.1421
18	.406	162	.685	.03350	-.2432	.3102
21	1.613	484	.107	.07212	-.0759	.2202
22	-2.576	693	.010	-.10389	-.2372	.0294
24	3.297	739	.001	.11505	-.0002	.2303
26	-.689	555	.491	-.03170	-.1839	.1205
28	-3.129	671	.002	-.12494	-.2569	.0070
30	-.347	463	.729	-.01613	-.1702	.1380
32	3.609	227	.000	.24516	.0187	.4716
34	1.315	397	.189	.06901	-.1050	.2430
35	.482	579	.630	.02086	-.1224	.1641
36	-.165	169	.869	-.01400	-.2973	.2693
37	.970	301	.333	.05201	-.1261	.2302
39	-3.343	616	.001	-.12655	-.2517	-.0014
40	1.659	992	.097	.03897	-.0385	.1165
42	-.464	416	.643	-.02544	-.2071	.1562
43	-.902	329	.367	-.05761	-.2696	.1543
46	1.270	471	.205	.05870	-.0944	.2118
48	1.147	101	.254	.11169	-.2182	.4416
49	1.691	466	.092	.08552	-.0820	.2530
51	1.014	336	.311	.04886	-.1111	.2088
52	2.379	549	.018	.08780	-.0343	.2099
54	-4.984	356	.000	-.28825	-.4801	-.0964
56	1.445	979	.149	.04793	-.0615	.1574
58	-3.625	481	.000	-.17254	-.3301	-.0150
66	.829	105	.409	.07119	-.2194	.3618

Tabella 40: test di significatività: (valore differenziale BSCL) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti

		Misure restrittive della libertà – quota di casi affetti					
		Totale	Caso con almeno una misura restrittiva della libertà				
		Numero	Numero	%	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	57274	4768	8	0.115	8.099	8.551
	03	3082	392	13	0.600	11.543	13.895
	06	715	63	9	1.060	6.733	10.889
	07	963	92	10	0.947	7.697	11.410
	08	2738	190	7	0.486	5.987	7.891
	12	760	14	2	0.488	0.886	2.798
	13	2462	177	7	0.521	6.169	8.210
	17	1284	53	4	0.555	3.040	5.216
	18	263	2	1	.	.	.
	21	1871	151	8	0.630	6.836	9.305
	22	3016	145	5	0.390	4.044	5.571
	24	2203	249	11	0.675	9.981	12.625
	28	1778	179	10	0.714	8.669	11.466
	30	2325	47	2	0.292	1.449	2.594
	32	780	90	12	1.144	9.296	13.781
	34	1268	154	12	0.917	10.347	13.943
	35	2191	238	11	0.665	9.560	12.166
	36	609	53	9	1.142	6.464	10.942
	37	1898	357	19	0.897	17.051	20.567
	39	1957	158	8	0.616	6.867	9.281
	40	1606	105	7	0.617	5.329	7.747
	42	973	92	9	0.938	7.617	11.294
	43	1386	79	6	0.623	4.479	6.920
	46	3913	210	5	0.360	4.661	6.073
	48	1061	117	11	0.962	9.143	12.912
	49	1727	74	4	0.487	3.330	5.240
	51	1301	205	16	1.010	13.777	17.737
	52	5141	278	5	0.315	4.789	6.026
	54	3108	512	16	0.665	15.169	17.778
	56	2467	175	7	0.517	6.081	8.107
	58	2010	113	6	0.514	4.615	6.629
	66	418	4	1	.	.	.

Tabella 41: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti)

Clinica		MRL: Quota di casi affetti
03	Chi ²	77,973 ^a
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
06	Chi ²	,222 ^b
	df	1
	Asymp. Sig.	,638
07	Chi ²	1,905 ^c
	df	1
	Asymp. Sig.	,168
08	Chi ²	6,887 ^d
	df	1
	Asymp. Sig.	,009
12	Chi ²	41,851 ^e
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
13	Chi ²	4,160 ^f
	df	1
	Asymp. Sig.	,041
17	Chi ²	29,638 ^g
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
18	Chi ²	19,719 ^h
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
21	Chi ²	,159 ⁱ
	df	1
	Asymp. Sig.	,690
22	Chi ²	48,887 ^j
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
24	Chi ²	25,597 ^k
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
28	Chi ²	7,074 ^l
	df	1
	Asymp. Sig.	,008
30	Chi ²	121,043 ^m
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
32	Chi ²	10,555 ⁿ
	df	1
	Asymp. Sig.	,001
34	Chi ²	24,247 ^o
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
35	Chi ²	18,488 ^p
	df	1
	Asymp. Sig.	,000

Clinica		MRL: Quota di casi affetti
36	Chi ²	,114 ^q
	df	1
	Asymp. Sig.	,736
37	Chi ²	273,370 ^r
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
39	Chi ²	,162 ^s
	df	1
	Asymp. Sig.	,687
40	Chi ²	6,719 ^t
	df	1
	Asymp. Sig.	,010
42	Chi ²	1,629 ^u
	df	1
	Asymp. Sig.	,202
43	Chi ²	12,514 ^v
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
46	Chi ²	44,867 ^w
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
48	Chi ²	10,153 ^x
	df	1
	Asymp. Sig.	,001
49	Chi ²	36,934 ^y
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
51	Chi ²	94,164 ^z
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
52	Chi ²	57,333 ^{aa}
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
54	Chi ²	270,414 ^{ab}
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
56	Chi ²	4,900 ^{ac}
	df	1
	Asymp. Sig.	,027
58	Chi ²	19,242 ^{ad}
	df	1
	Asymp. Sig.	,000
66	Chi ²	29,733 ^{ae}
	df	1
	Asymp. Sig.	,000

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 256.6.

b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 59.5.

c. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 80.2.

Clinica	MRL: Quota di casi affetti
d.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 227.9.
e.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 63.3.
f.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 205.0.
g.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 106.9.
h.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 21.9.
i.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 155.8.
j.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 251.1.
k.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 183.4.
l.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 148.0.
m.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 193.6.
n.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 64.9.
o.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 105.6.
p.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 182.4.
q.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 50.7.
r.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 158.0.
s.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 162.9.
t.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 133.7.
u.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 81.0.
v.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 115.4.
w.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 325.8.
x.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 88.3.
y.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 143.8.
z.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 108.3.
aa.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 428.0.
ab.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 258.7.
ac.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 205.4.
ad.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 167.3.
ae.	0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 34.8.

Tabella 42: Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Misure restrittive della libertà: isolamento (intensità)

		Isolamento: intensità				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	3523	92.64	5.135	82.57	102.702
	03	218	60.20	9.404	41.77	78.633
	06	59	39.05	6.657	26.00	52.093
	07	70	240.20	59.943	122.71	357.684
	08	157	86.71	12.866	61.49	111.923
	12*	11	100.77	26.264	.	.
	13	114	188.04	33.930	121.54	254.546
	17	53	153.92	25.559	103.82	204.013
	18*	0
	21	142	20.82	3.518	13.92	27.714
	22	111	136.49	78.908	-18.17	291.151
	24	180	141.19	14.211	113.34	169.044
	28	143	105.23	61.463	-15.24	225.694
	30	39	63.87	19.238	26.17	101.579
	32	50	180.83	38.934	104.52	257.144
	34	130	79.66	16.880	46.58	112.750
	35	175	91.89	34.399	24.47	159.316
	36	49	102.17	26.678	49.88	154.462
	37	299	79.83	9.458	61.30	98.371
	39	100	128.60	21.037	87.37	169.832
	40	75	82.32	11.472	59.83	104.802
	42*	0
	43*	0
	46	139	220.40	22.317	176.66	264.137
	48	54	228.88	42.328	145.91	311.840
	49*	0
	51	190	118.33	29.424	60.66	176.002
	52	226	13.91	2.338	9.33	18.494
	54	505	54.90	4.520	46.04	63.757
	56	138	53.29	11.881	30.00	76.576
	58	96	17.22	2.703	11.92	22.518
	66*	0

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 43: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: isolamento (intensità)

Clinica	Valore test= 92.64					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-3.450	217	.001	-32.439	-50.97	-13.90
06	-8.051	58	.000	-53.595	-66.92	-40.27
07	2.462	69	.016	147.557	27.98	267.14
08	-0.461	156	.645	-5.935	-31.35	19.48
12*
13	2.812	113	.006	95.403	28.18	162.62
17	2.397	52	.020	61.277	9.99	112.57
18*
21	-20.413	141	.000	-71.822	-78.78	-64.87
22	0.556	110	.580	43.851	-112.53	200.23
24	3.417	179	.001	48.551	20.51	76.59
28	0.205	142	.838	12.587	-108.91	134.09
30	-1.495	38	.143	-28.768	-67.71	10.18
32	2.265	49	.028	88.194	9.95	166.43
34	-0.769	129	.443	-12.975	-46.37	20.42
35	-0.022	174	.983	-.745	-68.64	67.15
36	0.357	48	.722	9.533	-44.11	63.17
37	-1.354	298	.177	-12.806	-31.42	5.81
39	1.709	99	.091	35.960	-5.78	77.70
40	-0.900	74	.371	-10.323	-33.18	12.53
42*
43*
46	5.725	138	.000	127.757	83.63	171.88
48	3.219	53	.002	136.237	51.34	221.14
49*
51	0.873	189	.384	25.691	-32.35	83.73
52	-33.672	225	.000	-78.728	-83.34	-74.12
54	-8.350	504	.000	-37.742	-46.62	-28.86
56	-3.312	137	.001	-39.352	-62.85	-15.86
58	-27.902	95	.000	-75.420	-80.79	-70.05
66*

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Tabella 44: test di significatività: isolamento (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità)

		Immobilizzazione (intensità)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	597	77.56	9.257	59.42	95.703
	03	164	47.46	10.060	27.74	67.176
	06*	0
	07*	0
	08*	28	24.98	6.046	.	.
	12*	0
	13	64	165.57	49.533	68.49	262.658
	17*	17	41.58	12.376	.	.
	18*	0
	21*	4	44.75	16.889	.	.
	22*	1	7.75	.	.	.
	24	38	41.98	17.137	8.39	75.569
	28*	5	360.83	319.428	.	.
	30*	5	6.90	2.384	.	.
	32*	1	11.00	.	.	.
	34	63	75.13	41.984	-7.15	157.424
	35	85	39.92	6.520	27.14	52.703
	36*	6	44.83	31.311	.	.
	37*	28	408.47	61.703	.	.
	39*	10	104.88	74.555	.	.
	40*	4	79.55	52.348	.	.
	42	30	31.60	8.602	14.74	48.458
	43*	0
	46*	1	9.75	.	.	.
	48*	0
	49*	0
	51*	13	19.71	4.240	.	.
	52*	13	16.81	7.066	.	.
	54*	6	19.40	8.177	.	.
	56*	9	15.03	4.195	.	.
	58*	2	0.63	.375	.	.
	66*	0

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 45: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: immobilizzazione (intensità)

Clinica	Valore test= 77.56					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-2.992	163	.003	-30.102	-49.97	-10.24
06*
07*
08*
12*
13	1.777	63	.080	88.014	-10.97	187.00
17*
18*
21*
22*
24	-2.076	37	.045	-35.580	-70.30	-.86
28*
30*
32*
34	-0.058	62	.954	-2.425	-86.35	81.50
35	-5.772	84	.000	-37.637	-50.60	-24.67
36*
37*
39*
40*
42	-5.343	29	.000	-45.962	-63.56	-28.37
43*
46*
48*
49*
51*
52*
54*
56*
58*
66*

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Tabella 46: test di significatività: immobilizzazione (intensità) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza)

		medicazione forzata (frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1791	2.00	.087	1.83	2.173
	03	113	1.59	.105	1.39	1.799
	06*	17	1.35	.242	.	.
	07	44	1.41	.188	1.04	1.777
	08	112	1.47	.087	1.30	1.644
	12*	2	1.50	.500	.	.
	13	44	1.32	.133	1.06	1.579
	17	40	1.28	.107	1.06	1.485
	18*	2	1.00	.000	.	.
	21	90	1.97	.209	1.56	2.376
	22	41	1.15	.066	1.02	1.276
	24	89	1.58	.167	1.26	1.911
	28	62	1.21	.070	1.07	1.346
	30*	10	1.30	.153	.	.
	32*	15	1.13	.091	.	.
	34	52	1.37	.099	1.17	1.560
	35	83	2.07	.414	1.26	2.884
	36*	28	1.54	.209	.	.
	37*	18	1.44	.246	.	.
	39	52	1.33	.076	1.18	1.476
	40*	27	1.30	.117	.	.
	42	79	3.18	.415	2.36	3.991
	43	79	2.03	.256	1.52	2.527
	46	52	1.77	.416	0.95	2.585
	48	77	4.64	.763	3.14	6.131
	49	74	1.66	.153	1.36	1.962
	51	64	1.48	.122	1.25	1.723
	52	146	3.97	.819	2.37	5.577
	54	136	1.65	.130	1.39	1.902
	56	72	1.94	.211	1.53	2.358
	58	68	1.94	.208	1.53	2.350
	66*	3	1.00	.000	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili ($N < 30$) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 47: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: medicazione forzata (frequenza)

Clinica	Valore test= 2.00					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	-3.881	112	.000	-.407	-.61	-.20
06*
07	-3.149	43	.003	-.591	-.97	-.21
08	-6.061	111	.000	-.527	-.70	-.35
12*
13	-5.120	43	.000	-.682	-.95	-.41
17	-6.754	39	.000	-.725	-.94	-.51
18*
21	-0.160	89	.873	-.033	-.45	.38
22	-12.954	40	.000	-.854	-.99	-.72
24	-2.494	88	.014	-.416	-.75	-.08
28	-11.370	61	.000	-.790	-.93	-.65
30*
32*
34	-6.402	51	.000	-.635	-.83	-.44
35	0.175	82	.862	.072	-.75	.90
36*
37*
39	-8.821	51	.000	-.673	-.83	-.52
40*
42	2.834	78	.006	1.177	.35	2.00
43	0.099	78	.921	.025	-.48	.54
46	-0.555	51	.582	-.231	-1.07	.60
48	3.457	76	.001	2.636	1.12	4.16
49	-2.207	73	.030	-.338	-.64	-.03
51	-4.227	63	.000	-.516	-.76	-.27
52	2.410	145	.017	1.973	.35	3.59
54	-2.712	135	.008	-.353	-.61	-.10
56	-0.263	71	.793	-.056	-.48	.37
58	-0.282	67	.779	-.059	-.47	.36
66*

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Tabella 48: test di significatività: medicazione forzata (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Misure restrittive della libertà: restrizione della libertà di movimento (frequenza)

		restrizione della libertà di movimento (frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	736	12.12	.811	10.53	13.705
	03	157	16.32	1.551	13.28	19.359
	06*	2	2.50	1.500	.	.
	07*	15	11.80	5.950	.	.
	08*	6	1.00	.000	.	.
	12*	0
	13	49	5.94	1.015	3.95	7.928
	17*	0
	18*	0
	21*	0
	22*	26	3.88	.924	.	.
	24	70	12.00	1.454	9.15	14.849
	28	87	1.43	.122	1.19	1.664
	30*	12	38.50	20.381	.	.
	32	37	45.22	7.403	30.71	59.727
	34*	18	2.00	.548	.	.
	35	68	15.49	3.047	9.51	21.457
	36*	1	1.00	.	.	.
	37	50	12.36	1.680	9.07	15.653
	39	59	1.58	.088	1.40	1.748
	40*	0
	42*	13	4.69	1.848	.	.
	43*	0
	46*	6	1.00	.000	.	.
	48*	17	29.29	5.169	.	.
	49*	0
	51*	10	16.50	8.569	.	.
	52*	21	5.67	1.063	.	.
	54*	0
	56*	10	2.40	.581	.	.
	58*	2	1.00	.000	.	.
	66*	0

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 49: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

Test di significatività: restrizione della libertà di movimento (frequenza)

Clinica	Valore test= 12.12					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
03	2.706	156	.008	4.198	1.13	7.26
06*
07*
08*
12*
13	-6.090	48	.000	-6.181	-8.22	-4.14
17*
18*
21*
22*
24	-0.083	69	.934	-.120	-3.02	2.78
28	-87.700	86	.000	-10.695	-10.94	-10.45
30*
32	4.470	36	.000	33.096	18.08	48.11
34*
35	1.105	67	.273	3.365	-2.72	9.45
36*
37	0.143	49	.887	.240	-3.14	3.62
39	-120.026	58	.000	-10.544	-10.72	-10.37
40*
42*
43*
46*
48*
49*
51*
52*
54*
56*
58*
66*

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato la significatività.

Tabella 50: test di significatività: restrizione della libertà di movimento (frequenza) nei fornitori di prestazioni di base e della medicina acuta

A3. Risultato della misurazione (cliniche specializzate)

Valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS

		Residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	5654	.00	.01	-0.026	0.026
	01	665	-.06	.04	-0.140	0.015
	02	394	-.04	.05	-0.135	0.057
	09	71	.61	.13	0.357	0.857
	10	46	-.79	.23	-1.238	-0.346
	15	91	-.02	.11	-0.238	0.202
	19	271	.22	.06	0.101	0.338
	23	488	-.13	.04	-0.220	-0.045
	25	86	.92	.11	0.699	1.145
	27	76	1.53	.07	1.387	1.676
	29	308	-.18	.04	-0.267	-0.097
	33	155	-.10	.06	-0.224	0.024
	38	348	-.14	.06	-0.255	-0.024
	44	312	.36	.05	0.261	0.465
	45	169	-.36	.06	-0.472	-0.251
	47	67	-.14	.09	-0.325	0.042
	50	346	-.15	.06	-0.263	-0.034
	57	468	.12	.04	0.049	0.190
	59	180	-.68	.09	-0.851	-0.510
	60	289	-.07	.05	-0.166	0.033
	61	171	.14	.07	-0.009	0.282
	62	35	-.09	.13	-0.340	0.153
	63	489	.21	.04	0.143	0.287
	65	94	-.46	.09	-0.637	-0.288
	67	35	-.16	.10	-0.363	0.042

Tabella 51: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nelle cliniche specializzate

Test di significatività: (valore differenza HoNOS)

Clinica	Valore test = 0					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
01	-1.570	664	.117	-.06232	-.1935	.0688
02	-.798	393	.425	-.03907	-.2013	.1231
09	4.757	70	.000	.60686	.1687	1.0451
10	-3.481	45	.001	-.79195	-1.5928	.0089
15	-.161	90	.872	-.01808	-.3996	.3635
19	3.639	270	.000	.21956	.0188	.4203
23	-2.973	487	.003	-.13230	-.2797	.0150
25	8.106	85	.000	.92220	.5344	1.3100
27	20.742	75	.000	1.53160	1.2787	1.7845
29	-4.202	307	.000	-.18209	-.3261	-.0381
33	-1.581	154	.116	-.09984	-.3116	.1120
38	-2.366	347	.019	-.13938	-.3349	.0561
44	6.980	311	.000	.36302	.1903	.5358
45	-6.431	168	.000	-.36163	-.5500	-.1733
47	-1.507	66	.137	-.14128	-.4641	.1816
50	-2.543	345	.011	-.14881	-.3430	.0454
57	3.322	467	.001	.11945	.0004	.2385
59	-7.827	179	.000	-.68095	-.9720	-.3899
60	-1.305	288	.193	-.06655	-.2361	.1029
61	1.836	170	.068	.13620	-.1122	.3846
62	-.745	34	.462	-.09366	-.5465	.3592
63	5.826	488	.000	.21481	.0927	.3369
65	-5.186	93	.000	-.46262	-.7658	-.1595
67	-1.551	34	.130	-.16049	-.5330	.2121

Tabella 52: test di significatività: (valore differenza HoNOS) nelle cliniche specializzate

Autovalutazione: valore differenza BSCL

		Residuo standardizzato (valore differenza BSCL)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	3964	.00	.02	-0.031	0.031
	01	580	-.05	.04	-0.126	0.019
	02	261	-.41	.07	-0.548	-0.276
	09	50	.01	.10	-0.194	0.209
	10	46	.07	.13	-0.178	0.317
	15	68	.05	.15	-0.250	0.353
	19	220	.03	.06	-0.084	0.145
	23	354	-.17	.05	-0.279	-0.064
	25	60	.28	.12	0.037	0.518
	27 *	18	.46	.23	.	.
	29	264	-.10	.05	-0.205	-0.003
	33	44	.36	.13	0.117	0.612
	38	303	-.03	.06	-0.152	0.088
	44	271	.06	.06	-0.054	0.171
	45	111	-.06	.12	-0.287	0.171
	47 *	21	.02	.16	.	.
	50	173	.12	.09	-0.046	0.292
	57	282	.04	.06	-0.073	0.156
	59	60	-.01	.17	-0.342	0.322
	60	269	.25	.06	0.135	0.361
	61	100	-.10	.07	-0.244	0.049
	62	30	.28	.16	-0.033	0.597
	63	327	.23	.05	0.121	0.331
	65	41	.04	.14	-0.222	0.312
	67 *	11	-.15	.32	.	.

Tabella 53: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nelle cliniche specializzate

Test di significatività: (valore differenza BSCL)

Clinica	Valore test = 0					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
01	-1.454	579	.147	-.05376	-.1761	.0685
02	-5.948	260	.000	-.41235	-.6431	-.1816
09	.076	49	.940	.00776	-.3519	.3674
10	.550	45	.585	.06960	-.3755	.5147
15	.337	67	.737	.05175	-.4774	.5809
19	.529	219	.598	.03089	-.1640	.2258
23	-3.121	353	.002	-.17144	-.3537	.0108
25	2.259	59	.028	.27720	-.1478	.7022
27 *
29	-2.022	263	.044	-.10386	-.2747	.0670
33	2.888	43	.006	.36476	-.0812	.8107
38	-.519	302	.604	-.03181	-.2355	.1718
44	1.020	270	.309	.05867	-.1327	.2501
45	-.495	110	.622	-.05782	-.4530	.3374
47 *
50	1.423	172	.157	.12271	-.1660	.4114
57	.712	281	.477	.04151	-.1523	.2354
59	-.060	59	.952	-.01019	-.5969	.5765
60	4.310	268	.000	.24827	.0566	.4399
61	-1.300	99	.197	-.09743	-.3516	.1567
62	1.755	29	.090	.28177	-.3059	.8694
63	4.229	326	.000	.22600	.0486	.4034
65	.328	40	.744	.04470	-.4389	.5283
67 *

Tabella 54: test di significatività: (valore differenza BSCL) nelle cliniche specializzate

Misure restrittive della libertà: Quota di casi affetti

		Misure restrittive della libertà – quota di casi affetti					
		Totale	Caso con almeno una misura restrittiva della libertà				
		Numero	Numero	%	Errore standard	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1795	43	2	0.361	1.688	3.103
	33	229	2	1	.	.	.
	44	380	4	1	.	.	.
	50	435	12	3	0.785	1.219	4.298
	63	751	25	3	0.655	2.046	4.612

Tabella 55: misure restrittive della libertà: quota di casi affetti nelle cliniche specializzate

Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti)

Clinica	MRL: Quota di casi affetti	
33	Chi ²	2,269 ^a
	df	1
	Asymp. Sig.	,132
44	Chi ²	2,931 ^b
	df	1
	Asymp. Sig.	,087
50	Chi ²	,245 ^c
	df	1
	Asymp. Sig.	,620
63	Chi ²	2,798 ^d
	df	1
	Asymp. Sig.	,094

- a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 5.5.
 b. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 9.1.
 c. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.4.
 d. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 18.0.

Tabella 56: Test di significatività (MRL: Quota di casi affetti) nelle cliniche specializzate

Misure restrittive della libertà: isolamento (intensità)

		Isolamento (intensità)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	37	75.08	23.264	29.48	120.673
	33*	0
	44*	3	191.58	127.777	.	.
	50*	9	20.27	5.703	.	.
	63*	25	80.82	30.332	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 57: misure restrittive della libertà: isolamento (intensità) nelle cliniche specializzate

Test di significatività: isolamento (intensità)

		Valore test = 75.08				
Clinica	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	
33*
44*
50*
63*

Tabella 58: Test di significatività: isolamento (intensità) nelle cliniche specializzate

Misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità)

		Immobilizzazione (intensità)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	11	21.48	10.384	.	.
	33*	1	16.00	.	.	.
	44*	0
	50*	10	22.03	11.464	.	.
	63*	0

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 59: misure restrittive della libertà: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate

Test di significatività: immobilizzazione (intensità)

		Valore test = 21.48				
		T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza
Clinica					Inferiore	
33*
44*
50*
63*

Tabella 60: Test di significatività: immobilizzazione (intensità) nelle cliniche specializzate

Misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza)

		Medicazione forzata (frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	9	1.56	.294	0.98	2.132
	33*	2	1.00	.000	.	.
	44*	0
	50*	5	1.60	.400	.	.
	63*	2	2.00	1.000	.	.

* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.

Tabella 61: misure restrittive della libertà: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate

Test di significatività: medicazione forzata (frequenza)

		Valore test = 1.56				
		T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza
Clinica					Inferiore	
33*
44*
50*
63*

Tabella 62: Test di significatività: medicazione forzata (frequenza) nelle cliniche specializzate

Misure restrittive della libertà: restrizione della libertà (frequenza)

		Restrizione della libertà (frequenza)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1	42.00	.	.	.
	33*	0
	44*	1	42.00	.	.	.
	50*	0
	63*	0
* Nelle cliniche con un numero inferiore di 30 casi utili (N < 30) non è stato calcolato l'intervallo di confidenza.						

Tabella 63: misure restrittive della libertà: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate

Test di significatività: restrizione della libertà (frequenza)

		Valore test = 12.12					
		T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
Inferiore							
Clinica	33*
	44*
	50*
	63*

Tabella 64: Test di significatività: restrizione della libertà (frequenza) nelle cliniche specializzate

A4. Risultato della misurazione (cliniche per la cura di dipendenze)

Valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS

		Residuo standardizzato (valore differenza HoNOS)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1553	.00	.03	-0.049	0.049
	04	46	.44	.10	0.238	0.635
	05	148	.06	.08	-0.101	0.223
	11	366	-.01	.06	-0.130	0.104
	16	216	-.23	.06	-0.344	-0.115
	20	88	.03	.11	-0.186	0.244
	31	72	.33	.09	0.151	0.510
	53	95	-.05	.08	-0.205	0.108
	55	467	-.08	.04	-0.169	-0.001
	68	55	.78	.12	0.541	1.018

Tabella 65: valutazione da parte di terzi: valore differenza HoNOS nelle cliniche per la cura di dipendenze

Test di significatività: (valore differenza HoNOS)

		Valore test = 0					
		T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
Clinica					Inferiore	Superiore	
	04	4.314	45	.000	.43686	.0804	.7933
	05	.741	147	.460	.06129	-.2165	.3391
	11	-.218	365	.828	-.01300	-.2112	.1852
	16	-3.922	215	.000	-.22906	-.4239	-.0342
	20	.267	87	.790	.02931	-.3442	.4028
	31	3.610	71	.001	.33067	.0162	.6452
	53	-.611	94	.543	-.04869	-.3195	.2221
	55	-1.973	466	.049	-.08475	-.2270	.0575
	68	6.415	54	.000	.77968	.3567	1.2026

Tabella 66: test di significatività: (valore differenza HoNOS) nelle cliniche per la cura di dipendenze

Autovalutazione: valore differenza BSCL

		Residuo standardizzato (valore differenza BSCL)				
		Numero valido	Valore medio	Errore standard del valore medio	IC 95% (limite inferiore)	IC 95% (limite superiore)
Clinica	Totale	1158	.00	.03	-0.057	0.057
	04	31	.07	.17	-0.258	0.398
	05	104	-.03	.09	-0.211	0.142
	11	280	.12	.05	0.017	0.216
	16	141	.04	.08	-0.109	0.187
	20	85	-.28	.15	-0.567	0.002
	31	65	.02	.09	-0.155	0.193
	53	64	.06	.15	-0.225	0.343
	55	335	-.08	.06	-0.190	0.039
	68	53	.15	.09	-0.033	0.323

Tabella 67: valutazione da parte di terzi: valore differenza BSCL nelle cliniche per la cura di dipendenze

Test di significatività: (valore differenza BSCL)

Clinica	Valore test = 0					
	T	df	Sig. (a due lati)	Differenza media	Intervallo di confidenza 99,9% della differenza	
					Inferiore	Superiore
04	.419	30	.678	.07001	-.5395	.6795
05	-.379	103	.706	-.03410	-.3393	.2711
11	2.291	279	.023	.11627	-.0525	.2850
16	.522	140	.603	.03940	-.2143	.2931
20	-1.949	84	.055	-.28287	-.7778	.2120
31	.215	64	.830	.01907	-.2866	.3247
53	.408	63	.684	.05923	-.4414	.5598
55	-1.297	334	.195	-.07586	-.2700	.1183
68	1.598	52	.116	.14512	-.1716	.4618

Tabella 68: test di significatività: (valore differenza BSCL) nelle cliniche per la cura di dipendenze

A5. Qualità dei dati

Qualità dei dati HoNOS totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi)

		Quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
		Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
			Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
Clinica	Totale	100.0%	41.0%	26.8%	23.1%	1.4%	1.7%	6.0%
	01	100.0%	75.5%	17.6%	3.1%	1.1%	.1%	2.5%
	02	100.0%	76.1%	14.5%	2.3%	7.1%	0.0%	0.0%
	03	100.0%	35.0%	32.2%	23.9%	7.9%	1.1%	0.0%
	04	100.0%	27.5%	0.0%	9.6%	8.4%	0.0%	54.5%
	05	100.0%	43.9%	50.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	06	100.0%	63.9%	4.5%	31.0%	.6%	0.0%	0.0%
	07	100.0%	27.1%	20.2%	29.9%	7.1%	2.4%	13.3%
	08	100.0%	27.9%	36.4%	30.5%	0.0%	.2%	5.0%
	09	100.0%	79.0%	8.6%	8.6%	2.5%	1.2%	0.0%
	10	100.0%	56.9%	22.4%	3.4%	0.0%	17.2%	0.0%
	11	100.0%	93.6%	.8%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	12	100.0%	90.7%	3.0%	5.9%	.3%	.1%	0.0%
	13	100.0%	25.4%	46.1%	20.9%	0.0%	.4%	7.2%
	14
	15	100.0%	29.0%	37.0%	31.9%	2.2%	0.0%	0.0%
	16	100.0%	80.6%	1.5%	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	17	100.0%	84.7%	4.7%	10.0%	.1%	0.0%	.5%
	18	100.0%	0.0%	82.1%	11.4%	3.4%	0.0%	3.0%
	19	100.0%	51.4%	42.7%	4.9%	0.0%	1.0%	0.0%
	20	100.0%	0.0%	60.5%	13.6%	4.1%	2.0%	19.7%
	21	100.0%	41.2%	23.5%	22.9%	.9%	1.2%	10.3%
	22	100.0%	28.7%	30.1%	37.4%	1.2%	2.5%	0.0%
	23	100.0%	90.6%	1.5%	6.8%	1.1%	0.0%	0.0%
	24	100.0%	50.6%	15.0%	22.8%	1.4%	.6%	9.6%
	25	100.0%	41.5%	3.1%	3.1%	0.0%	.5%	51.8%
	26	100.0%	0.0%	39.7%	24.8%	.7%	3.8%	31.1%
	27	100.0%	35.0%	19.3%	28.6%	.7%	4.3%	12.1%
	28	100.0%	51.7%	24.4%	23.6%	.2%	0.0%	0.0%
	29	100.0%	78.8%	14.5%	3.6%	.6%	0.0%	2.4%
	30	100.0%	22.5%	38.5%	24.5%	2.9%	4.6%	7.1%
	31	100.0%	81.9%	4.8%	3.6%	8.4%	0.0%	1.2%
	32	100.0%	19.1%	45.8%	22.8%	.4%	.9%	11.0%
	33	100.0%	46.3%	21.4%	16.6%	.9%	0.0%	14.8%
	34	100.0%	39.6%	34.7%	21.5%	.9%	1.3%	2.0%
	35	100.0%	33.9%	36.9%	26.1%	.5%	1.2%	1.5%
	36	100.0%	41.2%	36.1%	22.5%	0.0%	.2%	0.0%
	37	100.0%	33.2%	19.5%	37.0%	0.0%	1.7%	8.5%

	Quota di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
	Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
		Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
38	100.0%	89.9%	5.5%	4.4%	0.0%	0.0%	.3%
39	100.0%	49.0%	23.4%	27.0%	0.0%	.4%	.2%
40	100.0%	73.3%	13.4%	11.8%	.8%	.6%	0.0%
42	100.0%	74.9%	7.9%	15.4%	.1%	1.6%	0.0%
43	100.0%	70.9%	3.1%	21.4%	4.1%	.5%	0.0%
44	100.0%	80.5%	1.6%	17.4%	.3%	0.0%	.3%
45	100.0%	91.7%	1.7%	6.6%	0.0%	0.0%	0.0%
46	100.0%	21.2%	36.7%	19.1%	.1%	2.7%	20.3%
47	100.0%	41.1%	12.9%	11.3%	22.6%	12.1%	0.0%
48	100.0%	24.1%	27.7%	33.4%	1.3%	1.0%	12.4%
49	100.0%	50.8%	12.7%	20.9%	.8%	.3%	14.5%
50	100.0%	62.1%	17.5%	14.9%	5.1%	.5%	0.0%
51	100.0%	50.0%	27.0%	21.9%	.8%	.3%	0.0%
52	100.0%	39.2%	25.2%	32.1%	.4%	3.0%	0.0%
53	100.0%	51.5%	20.1%	21.6%	1.5%	1.5%	3.7%
54	100.0%	25.5%	27.2%	38.4%	4.5%	4.4%	0.0%
55	100.0%	89.8%	5.1%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%
56	100.0%	39.8%	39.8%	19.4%	.4%	.6%	0.0%
57	100.0%	65.6%	30.1%	3.9%	.4%	0.0%	0.0%
58	100.0%	49.2%	25.8%	21.8%	.1%	3.1%	0.0%
59	100.0%	71.8%	12.7%	11.7%	3.3%	.5%	0.0%
60	100.0%	53.4%	35.3%	5.8%	2.5%	.9%	2.1%
61	100.0%	39.4%	55.6%	4.4%	0.0%	0.0%	.6%
62	100.0%	91.9%	2.7%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
63	100.0%	43.3%	22.0%	15.7%	2.3%	2.7%	14.1%
65	100.0%	0.0%	44.8%	5.7%	0.0%	49.5%	0.0%
66	100.0%	0.0%	35.4%	8.1%	.5%	.2%	55.7%
67	100.0%	39.1%	37.0%	4.3%	0.0%	0.0%	19.6%
68	100.0%	96.5%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	0.0%

Tabella 69: qualità dei dati per HoNOS totale (quota di casi)

Qualità dei dati HoNOS totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

		Numero di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
		Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
			Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabili	Insufficiente	Mancante
Clinica	Totale	69066	28344	18478	15947	986	1199	4112
	01	714	539	126	22	8	1	18
	02	435	331	63	10	31	0	0
	03	3082	1078	991	737	242	34	0
	04	167	46	0	16	14	0	91
	05	157	69	79	9	0	0	0
	06	715	457	32	222	4	0	0
	07	963	261	195	288	68	23	128
	08	2738	764	996	836	0	6	136
	09	81	64	7	7	2	1	0
	10	58	33	13	2	0	10	0
	11	389	364	3	22	0	0	0
	12	760	689	23	45	2	1	0
	13	2462	626	1134	515	0	9	178
	14
	15	138	40	51	44	3	0	0
	16	263	212	4	47	0	0	0
	17	1284	1088	60	129	1	0	6
	18	263	0	216	30	9	0	8
	19	288	148	123	14	0	3	0
	20	147	0	89	20	6	3	29
	21	1871	771	440	429	16	22	193
	22	3016	867	908	1129	37	75	0
	23	530	480	8	36	6	0	0
	24	2203	1114	331	502	31	13	212
	25	193	80	6	6	0	1	100
	26	3030	0	1202	750	20	115	943
	27	140	49	27	40	1	6	17
	28	1778	920	434	420	4	0	0
	29	330	260	48	12	2	0	8
	30	2325	522	894	570	67	108	164
	31	83	68	4	3	7	0	1
	32	780	149	357	178	3	7	86
	33	229	106	49	38	2	0	34
	34	1268	502	440	272	12	17	25
	35	2191	742	808	572	11	26	32
	36	609	251	220	137	0	1	0
	37	1898	630	370	703	0	33	162
	38	365	328	20	16	0	0	1
	39	1957	959	458	529	0	8	3
	40	1606	1178	215	190	13	10	0

	Numero di casi analizzabili per calcoli HoNOS						
	Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
		Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
42	973	729	77	150	1	16	0
43	1386	982	43	297	57	7	0
44	380	306	6	66	1	0	1
45	181	166	3	12	0	0	0
46	3913	829	1437	746	3	105	793
47	124	51	16	14	28	15	0
48	1061	256	294	354	14	11	132
49	1727	877	220	361	13	6	250
50	435	270	76	65	22	2	0
51	1301	650	351	285	11	4	0
52	5141	2017	1298	1648	23	155	0
53	134	69	27	29	2	2	5
54	3108	794	846	1193	139	136	0
55	492	442	25	25	0	0	0
56	2467	982	983	478	9	15	0
57	489	321	147	19	2	0	0
58	2010	988	518	438	3	63	0
59	213	153	27	25	7	1	0
60	326	174	115	19	8	3	7
61	180	71	100	8	0	0	1
62	37	34	1	2	0	0	0
63	751	325	165	118	17	20	106
65	210	0	94	12	0	104	0
66	418	0	148	34	2	1	233
67	46	18	17	2	0	0	9
68	57	55	0	0	2	0	0

Tabella 70: qualità dei dati per HoNOS totale (numero di casi)

Qualità dei dati BSCL totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (quota di casi)

		Quota di casi analizzabili per calcoli BSCL						
		Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
			Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
Clinica	Totale	100.0%	18.9%	9.9%	45.2%	13.9%	1.1%	11.0%
	01	100.0%	70.6%	10.6%	8.7%	9.9%	0.0%	.1%
	02	100.0%	57.0%	3.0%	28.5%	11.5%	0.0%	0.0%
	03	100.0%	10.0%	4.6%	52.2%	32.5%	.6%	.0%
	04	100.0%	17.4%	1.2%	22.2%	4.8%	0.0%	54.5%
	05	100.0%	65.6%	.6%	31.8%	1.9%	0.0%	0.0%
	06	100.0%	31.9%	7.3%	53.6%	7.3%	0.0%	0.0%
	07	100.0%	11.7%	17.3%	35.5%	12.9%	1.9%	20.7%
	08	100.0%	7.2%	12.3%	55.8%	13.5%	1.8%	9.5%
	09	100.0%	56.8%	4.9%	28.4%	0.0%	9.9%	0.0%
	10	100.0%	79.3%	0.0%	20.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	11	100.0%	67.4%	4.9%	23.4%	4.1%	.3%	0.0%
	12	100.0%	29.5%	14.1%	20.0%	35.0%	1.4%	0.0%
	13	100.0%	8.2%	10.2%	30.5%	4.7%	0.0%	46.4%
	14
	15	100.0%	44.2%	5.1%	42.8%	8.0%	0.0%	0.0%
	16	100.0%	25.1%	28.5%	38.4%	7.6%	.4%	0.0%
	17	100.0%	57.7%	.9%	25.6%	15.7%	.1%	0.0%
	18	100.0%	0.0%	62.0%	25.1%	9.9%	0.0%	3.0%
	19	100.0%	50.3%	26.0%	17.7%	5.9%	0.0%	0.0%
	20	100.0%	0.0%	57.8%	21.8%	17.0%	.7%	2.7%
	21	100.0%	14.8%	11.2%	53.2%	18.1%	2.0%	.8%
	22	100.0%	15.8%	7.2%	69.2%	7.7%	.1%	0.0%
	23	100.0%	66.8%	0.0%	23.4%	9.8%	0.0%	0.0%
	24	100.0%	24.4%	9.2%	46.0%	9.9%	.3%	10.2%
	25	100.0%	30.6%	.5%	0.0%	0.0%	0.0%	68.9%
	26	100.0%	0.0%	18.3%	43.5%	10.0%	1.5%	26.7%
	27	100.0%	12.1%	.7%	41.4%	5.7%	0.0%	40.0%
	28	100.0%	27.1%	10.7%	50.7%	11.0%	.2%	.4%
	29	100.0%	65.8%	14.2%	5.2%	10.9%	0.0%	3.9%
	30	100.0%	10.8%	9.1%	48.0%	22.6%	.5%	9.0%
	31	100.0%	77.1%	1.2%	21.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	32	100.0%	8.5%	20.8%	48.3%	20.9%	1.0%	.5%
	33	100.0%	12.7%	6.6%	41.9%	12.2%	0.0%	26.6%
	34	100.0%	16.9%	14.5%	47.7%	15.4%	3.2%	2.3%
	35	100.0%	13.4%	13.1%	57.0%	13.4%	1.3%	1.8%
	36	100.0%	15.8%	12.2%	53.4%	18.4%	.3%	0.0%
	37	100.0%	15.1%	.8%	57.5%	8.6%	.2%	17.8%
	38	100.0%	68.5%	14.5%	10.1%	4.9%	1.9%	0.0%
	39	100.0%	27.6%	3.9%	56.9%	11.5%	0.0%	.1%
	40	100.0%	61.3%	.5%	33.9%	4.3%	0.0%	0.0%

	Quota di casi analizzabili per calcoli BSCL						
	Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
		Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
42	100.0%	41.9%	.9%	37.4%	19.7%	0.0%	0.0%
43	100.0%	13.9%	10.0%	43.9%	30.2%	2.0%	0.0%
44	100.0%	56.3%	15.0%	26.8%	1.6%	.3%	0.0%
45	100.0%	18.2%	43.1%	12.2%	17.1%	0.0%	9.4%
46	100.0%	3.0%	9.1%	28.9%	11.4%	2.6%	45.0%
47	100.0%	14.5%	2.4%	27.4%	4.0%	51.6%	0.0%
48	100.0%	3.1%	6.5%	28.7%	7.4%	1.1%	53.2%
49	100.0%	17.3%	9.7%	51.4%	11.7%	.5%	9.4%
50	100.0%	28.7%	11.0%	39.5%	19.3%	1.4%	0.0%
51	100.0%	19.4%	6.5%	58.6%	15.4%	0.0%	0.0%
52	100.0%	8.4%	2.3%	49.2%	18.9%	.0%	21.2%
53	100.0%	22.4%	25.4%	29.1%	21.6%	.7%	.7%
54	100.0%	5.7%	5.8%	75.3%	11.6%	1.7%	0.0%
55	100.0%	57.3%	10.8%	22.8%	8.9%	.2%	0.0%
56	100.0%	17.5%	22.3%	43.1%	17.2%	0.0%	0.0%
57	100.0%	0.0%	57.7%	14.5%	27.0%	.6%	.2%
58	100.0%	21.8%	2.1%	68.4%	7.6%	0.0%	0.0%
59	100.0%	20.7%	7.5%	28.2%	40.4%	3.3%	0.0%
60	100.0%	54.0%	28.5%	7.1%	7.4%	0.0%	3.1%
61	100.0%	21.1%	34.4%	7.2%	36.1%	0.0%	1.1%
62	100.0%	37.8%	43.2%	8.1%	10.8%	0.0%	0.0%
63	100.0%	30.6%	12.9%	34.9%	7.7%	.7%	13.2%
65	100.0%	0.0%	19.5%	4.8%	.5%	75.2%	0.0%
66	100.0%	0.0%	25.4%	9.8%	1.9%	4.1%	58.9%
67	100.0%	13.0%	10.9%	15.2%	60.9%	0.0%	0.0%
68	100.0%	91.2%	1.8%	3.5%	3.5%	0.0%	0.0%

Tabella 71: qualità dei dati per BSCL totale (quota di casi)

Qualità dei dati BSCL totale (comprende ammissione/dimissione e MedStat) (numero di casi)

		Numero di casi analizzabili per calcoli BSCL						
		Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
			Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
Clinica	Totale	69066	13061	6806	31226	9609	767	7597
	01	714	504	76	62	71	0	1
	02	435	248	13	124	50	0	0
	03	3082	308	143	1609	1003	18	1
	04	167	29	2	37	8	0	91
	05	157	103	1	50	3	0	0
	06	715	228	52	383	52	0	0
	07	963	113	167	342	124	18	199
	08	2738	196	336	1529	370	48	259
	09	81	46	4	23	0	8	0
	10	58	46	0	12	0	0	0
	11	389	262	19	91	16	1	0
	12	760	224	107	152	266	11	0
	13	2462	202	251	751	116	0	1142
	14
	15	138	61	7	59	11	0	0
	16	263	66	75	101	20	1	0
	17	1284	741	12	329	201	1	0
	18	263	0	163	66	26	0	8
	19	288	145	75	51	17	0	0
	20	147	0	85	32	25	1	4
	21	1871	276	209	996	338	37	15
	22	3016	477	217	2087	233	2	0
	23	530	354	0	124	52	0	0
	24	2203	538	202	1013	219	7	224
	25	193	59	1	0	0	0	133
	26	3030	0	556	1318	303	45	808
	27	140	17	1	58	8	0	56
	28	1778	482	190	901	195	3	7
	29	330	217	47	17	36	0	13
	30	2325	252	212	1116	525	11	209
	31	83	64	1	18	0	0	0
	32	780	66	162	377	163	8	4
	33	229	29	15	96	28	0	61
	34	1268	214	184	605	195	41	29
	35	2191	294	286	1249	294	29	39
	36	609	96	74	325	112	2	0
	37	1898	286	16	1091	164	3	338
	38	365	250	53	37	18	7	0
	39	1957	541	76	1114	225	0	1
	40	1606	985	8	544	69	0	0

	Numero di casi analizzabili per calcoli BSCL						
	Totale	Analizzabile		Drop-out		Non analizzabile	
		Completo	Incompleto	Non influenzabile	Influenzabile	Insufficiente	Mancante
42	973	408	9	364	192	0	0
43	1386	192	138	609	419	28	0
44	380	214	57	102	6	1	0
45	181	33	78	22	31	0	17
46	3913	117	356	1132	446	100	1762
47	124	18	3	34	5	64	0
48	1061	33	69	304	79	12	564
49	1727	299	168	887	202	8	163
50	435	125	48	172	84	6	0
51	1301	253	84	763	201	0	0
52	5141	431	119	2528	971	2	1090
53	134	30	34	39	29	1	1
54	3108	177	181	2339	359	52	0
55	492	282	53	112	44	1	0
56	2467	431	549	1063	424	0	0
57	489	0	282	71	132	3	1
58	2010	439	43	1375	153	0	0
59	213	44	16	60	86	7	0
60	326	176	93	23	24	0	10
61	180	38	62	13	65	0	2
62	37	14	16	3	4	0	0
63	751	230	97	262	58	5	99
65	210	0	41	10	1	158	0
66	418	0	106	41	8	17	246
67	46	6	5	7	28	0	0
68	57	52	1	2	2	0	0

Tabella 72: qualità dei dati per BSCL totale (numero di casi)

**Qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso
(casi completi, 1.1. - 31.12.2015)**

		Qualità dati - misure restrittive della libertà					
		Totale		Correttamente documentata		Difettoso documentata	
		Numero	%	Numero	%	Numero	%
Clinica	Totale	23426	100.0%	23232	99.2%	194	.8%
	03	3988	100.0%	3892	97.6%	96	2.4%
	06	267	100.0%	267	100.0%	0	0.0%
	07	336	100.0%	335	99.7%	1	.3%
	08	431	100.0%	431	100.0%	0	0.0%
	12	18	100.0%	18	100.0%	0	0.0%
	13	774	100.0%	770	99.5%	4	.5%
	17	136	100.0%	136	100.0%	0	0.0%
	18	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
	21	457	100.0%	457	100.0%	0	0.0%
	22	465	100.0%	465	100.0%	0	0.0%
	24	1312	100.0%	1312	100.0%	0	0.0%
	28	410	100.0%	410	100.0%	0	0.0%
	30	600	100.0%	598	99.7%	2	.3%
	32	2128	100.0%	2128	100.0%	0	0.0%
	33	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
	34	400	100.0%	400	100.0%	0	0.0%
	35	2014	100.0%	2006	99.6%	8	.4%
	36	365	100.0%	365	100.0%	0	0.0%
	37	1172	100.0%	1172	100.0%	0	0.0%
	39	296	100.0%	296	100.0%	0	0.0%
	40	212	100.0%	211	99.5%	1	.5%
	42	371	100.0%	371	100.0%	0	0.0%
	43	160	100.0%	160	100.0%	0	0.0%
	44	57	100.0%	57	100.0%	0	0.0%
	46	331	100.0%	299	90.3%	32	9.7%
	48	1325	100.0%	1325	100.0%	0	0.0%
	49	124	100.0%	109	87.9%	15	12.1%
	50	29	100.0%	29	100.0%	0	0.0%
	51	1041	100.0%	1041	100.0%	0	0.0%
	52	1279	100.0%	1252	97.9%	27	2.1%
	54	2100	100.0%	2100	100.0%	0	0.0%
	56	428	100.0%	427	99.8%	1	.2%
	58	355	100.0%	355	100.0%	0	0.0%
	63	30	100.0%	30	100.0%	0	0.0%
	66	10	100.0%	3	30.0%	7	70.0%

Tabella 73: qualità dei dati delle misure restrittive della libertà nel complesso

A6. Ausili alla lettura





Diagramma a colonne cumulate

Questi diagrammi si trovano al capitolo 4 sulla qualità dei dati: numero di casi analizzabili per HoNOS, BSCL e MRL.

Esempio di lettura: La clinica esempio K20 ha fornito un 45% di casi con una qualità valutabile (verde: fanno parte dell'analisi) e per 4% dei casi dropouts non influenzabili (giallo). Quindi risulta una quota di risposta del 49% che è al di sopra del valore stimato dell'ANQ di 40% (inclusi i casi valutabili ed i dropouts non influenzabili). Nel 1% dei casi della clinica esempio K20 sussiste un dropout (influenzabile) (grigio chiaro). Nel 1% dei casi i dati sono di scarsa qualità (grigio scuro) e nel 49% dei casi almeno una parte manca completamente (nero).




Diagramma a colonne con punti dei dati

Questi diagrammi si trovano al capitolo 4 sulla qualità dei dati: Raffronto annuale per il numero di casi analizzabili per HoNOS, BSCL e MRL.

Esempio di lettura: L'anno precedente, la clinica K03 ha raggiunto un valore medio di 0,19, il che non è stato tuttavia considerato un risultato sopra la media, in quanto l'intervallo di confidenza del 95% della clinica interse-cava quello dell'entità totale. Quest'anno, la clinica ha raggiunto un valore medio di -0,42 (il suo inter-vallo di confidenza del 95% si trova questa volta al di sotto di quello dell'entità totale). Per la clinica K01, non sono disponibili dati per alcuno dei due anni.





Diagramma circolare

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. Luogo di dimora prima dell'ammissione).

Esempio di lettura: Per il 67.7% delle persone nella popolazione - nell'esempio qui illustrato - il luogo di dimora prima dell'ammissione è « a casa propria ».

Quota dei casi per categoria




Leggenda delle categorie

Diagramma a colonne

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. diagnosi principale).

Esempio di lettura: Il 31.0% delle persone nella popolazione - nell'esempio qui illustrato - (20'063 dei casi esaminati) ha la diagnosi principale « disturbi affettivi ».

Asse delle y con il numero di casi misurati nell'intero campione



Leggenda delle categorie

Diagramma a punti


Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 per descrivere l'intero campione (es. gravità media di HoNOS e BSCL all'ammissione).

Esempio di lettura: Per esempio i pazienti della clinica K01 hanno un valore medio HoNOS-ammissione di 19, questo quindi è superiore al valore medio HONOS-ammissione del campione totale che è di 16. Il valore medio del BSCL-ammissione dei pazienti della clinica esempio K01 è di 63 ed è quindi superiore al valore medio BSCL-ammissione del campione totale che è di 62.

Leggenda delle categorie

Asse delle y con i valori medi d'ammissione (mediana):
asse sinistra HoNOS,
asse destra BSCL

Asse delle x con le singole cliniche



Boxplot

Questi diagrammi si trovano nel capitolo 5 e nell'appendice per descrivere l'intero campione (es. durata della degenza, HoNOS e BSCL: gravità media (punteggio complessivo) all'ammissione).

Esempio di lettura: La clinica K01 presenta una durata media della degenza dei suoi pazienti pari a 19 giorni (mediana). Il 25% dei casi ha avuto una permanenza fino a 15 giorni (percentile 25%), il 25% dei casi ha avuto una permanenza di almeno 23 giorni (percentile 75%).

Asse con le caratteristiche dei valori misurati

Riga con il risultato dell'intero campione

Righe con i risultati delle singole cliniche





Diagramma a barre sovrapposte

Questi diagrammi si trovano nell'appendice per descrivere l'intero campione (es. distribuzione dei sessi, età).

Esempio di lettura: la distribuzione dei sessi nella clinica K01 è composta da 34.1% uomini e 65.9% donne.



A7. Glossario

Aggiustamento = vedi → Aggiustamento secondo il rischio

Aggiustamento secondo il rischio = depurazione statistica dei parametri calcolati dall'influenza delle variabili di disturbo sulle quali le cliniche non possono agire, al fine di poter confrontare equamente i dati delle cliniche; è il caso in primo luogo della composizione del collettivo di pazienti in cura (*case-mix*), ossia i rischi distribuiti in maniera diversa tra fornitori di servizi (possibilità di conseguire un buon risultato di misurazione)

Analisi del drop-out = verifica della rappresentatività dei dati della misurazione disponibili per ciascuna clinica e per tutti i casi della relativa clinica

Autovalutazione = registrazione del peso dei sintomi da parte dei pazienti mediante BSCL

Benchmark = processo sistematico continuo di confronto di prodotti, servizi e processi in diverse imprese riguardo a qualità e/o quantità

Box-plot = diagramma per la rappresentazione grafica di dati metrici per un'impressione rapida sulla loro distribuzione

BSCL (Brief Symptom Checklist) = questionario di autovalutazione con cui si può misurare il peso psichico di un paziente mediante scala Likert (5 livelli di possibili risposte); forma abbreviata della Symptom Checklist SCL-90, composta da 53 item che si suddividono in nove scale inferiori, tre valori caratteristici e gli item complementari

Campione complessivo = tutti i pazienti per i quali sono stati rilevati dati

Case-mix = composizione del collettivo di pazienti curati (p.es. riguardo a demografia dei pazienti, distribuzione delle diagnosi, peso dei sintomi al momento dell'ammissione)

Caso concluso = un paziente che ha iniziato e terminato la cura nel periodo di rilevamento (= caso di cura concluso)

Confounder (variabile confondente) = variabili di disturbo, di aggiustamento; fattori che possono influenzare sia le variabili dipendenti sia le variabili indipendenti, e controllati statisticamente mediante aggiustamento del risultato

Confronto tra cliniche = rappresentazione comparativa dei risultati - aggiustati per il *case-mix* - su peso dei sintomi (valutazione da parte di terzi, autovalutazione) e misure restrittive della libertà

Deviazione standard (DS) = unità di misura della dispersione dei valori di una variabile attorno al suo valore medio

Diagramma a barre = diagramma per la rappresentazione grafica di dati mediante barre orizzontali

Diagramma a barre di errore = rappresentazione grafica di dati numerici per la visualizzazione degli scarti, fondati su errori sistematici o statistici, dei valori di misurazione osservati rispetto al valore effettivo della dimensione di misurazione

Diagramma a colonne = diagramma per la rappresentazione grafica della distribuzione della frequenza in più categorie mediante colonne verticali

Diagramma a punti = diagramma per la rappresentazione grafica di determinate caratteristiche mediante punti

Drop-out = mancata risposta, valore mancante, mancata reazione a una domanda; molti *drop-out* possono condurre a una minore rappresentatività del sondaggio

Gravità/punteggio complessivo BSCL = è composto dalla somma dei 53 item e comprende valori che vanno da 0 a 212

Gravità/punteggio totale HoNOS = è composto dalla somma dei 12 item e comprende valori che vanno da 0 a 48

HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) = questionario di documentazione del caso per la valutazione da parte della persona curante della gravità dei sintomi; è composto in totale da 12 item

Intervallo di confidenza del 95% (IC) = l'IC descrive la precisione della stima di un parametro (p.es. valore medio); con un IC 95% il valore medio effettivo è con una probabilità del 95% nell'area indicata

Manuale per i rilevatori = documento dell'ANQ in cui sono descritte le direttive per i processi di rilevamento dei dati

Massimo = il valore più alto raggiunto nella misurazione

Mediana (= percentile 50%) = misura dei valori medi per distribuzioni, dove il 50% dei rispettivi valori misurati sono al di sotto o al di sopra di tale limite

Minimo = il valore più basso raggiunto nella misurazione

Misura restrittiva della libertà (MRL/EFM) = questionario di documentazione del caso riguardante le seguenti misure: isolamento, immobilizzazione e medicazione forzata come pure misure restrittive della libertà di movimento sulla sedia e a letto tipiche della gerontopsichiatria (come tavolino applicato alla sedia, sbarre per il letto...). Questo indicatore rappresenta un fattore di successo critico per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti di libertà dei pazienti e aiuta l'interpretazione quanto ad accuratezza e adeguatezza delle cure psichiatriche

Outcome = risultato della misurazione

Percentile = indice di dispersione che indica quale percentuale di tutte le osservazioni è al di sotto di un determinato valore

Percentile 25% = limite al di sotto del quale si trova il 25% dei valori misurati

Percentile 50% = vedi mediana

Percentile 75% = limite al di sopra del quale si trova il 25% dei valori misurati (il 75% dei valori è al di sotto)

Peso dei sintomi = numero e gravità dei sintomi presenti di un disturbo psichico; la differenza dei valori del peso dei sintomi al momento dell'ammissione e della dimissione consente di trarre conclusioni sull'efficacia della cura; il peso dei sintomi è misurato sia nella valutazione da parte di terzi sia nell'autovalutazione

Predittore = variabile da utilizzare per predire una caratteristica (cfr. *confounder*)

Prova a campione = quantità parziale di un'entità totale (popolazione); nel rilevamento dei dati vengono acquisiti tutti i casi curati in ospedale nel rispettivo arco di tempo, anche se sono entrati prima dell'attuale periodo di rilevamento o se alla fine di questo non erano ancora stati dimessi; per le analisi si considerano però solo i casi entrati a partire dal momento dell'inizio dello studio e dimessi nel periodo del relativo rapporto

Regressione, multipla = procedimento statistico per stimare una o più variabili dipendenti ("criteri") sulla base di una o più variabili indipendenti ("predittori")

Residuo, valore residuo = differenza tra il valore del risultato effettivamente misurato e quello stimato sulla base dei predittori; questo valore è ripulito dall'influenza delle variabili di disturbo, in modo che non vi siano più distorsioni a causa di una differente struttura dei pazienti delle cliniche; valori

residui che si trovano sopra la media sono sinonimo di alta qualità, poiché il risultato è migliore di quello atteso in base alle caratteristiche del caso

Ricovero a fini assistenziali, prima: **privazione della libertà a scopo di assistenza** = internamento di una persona contro la sua volontà in un istituto; di regola viene ordinato dall'autorità tutoria, anche se esistono differenze cantonali

Risultato della misurazione BSCL = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio BSCL all'ammissione e quello alla dimissione

Risultato della misurazione HoNOS = differenza tra il punteggio complessivo del sondaggio HoNOS all'ammissione e quello alla dimissione

Significatività, statistica = le differenze tra le dimensioni di misurazione sono considerate significative se la probabilità che ciò sia dovuto al caso non supera una soglia definita; la probabilità massima di errore ammessa è chiamata livello di significatività α

Statistica medica (MedStat) dati base (UST) = parte del rilevamento dei dati per l'UST, contiene caratteristiche sociodemografiche, indicazioni sull'ospedalizzazione, codici di diagnosi e cura dei pazienti ricoverati in ospedale; la registrazione di diagnosi principali, età e altri dati serve per l'aggiustamento dei confronti tra cliniche riguardo al *case-mix* nella struttura dei pazienti

Statistica medica (MedStat) dati supplementari psichiatria = parte del rilevamento dei dati per l'UST con indicazioni specifiche per la psichiatria

UST = Ufficio federale di statistica

Valore medio = media aritmetica dei valori misurati

Valutazione da parte di terzi = rilevamento del peso dei sintomi da parte del personale curante mediante HoNOS

Variabile = caratteristica statistica che attribuisce caratteristiche alle unità di indagine

Varianza = distribuzione dei valori misurati

A8. Bibliografia

- ANQ - Hochstrasser, B., Ruflin, R., Bernhardsgrütter, R. & Schütz, C. (2011): ANQ Pilotprojekt Psychiatrie. Auswertungsbericht 2. Pilotjahr. Bern: ANQ.
- Brandstätter, E. (1999). Confidence Intervals as an Alternative to Significance Testing. *Methods of Psychological Research Online* 4(2), 33-46.
- Cumming, G. & S. Finch (2005). Inference by Eye: Confidence Intervals and How to Read Pictures of Data. *American Psychologist* 60(2), 170-180. doi: 10.1037/0003-066X.60.2.170
- Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introductory report. *Psychological Medicine*, 13(03), 595-605. doi:10.1017/S0033291700048017
- Farin, E., Glattacker, M., Follert, P., Kuhl, H.C., Klein, K. & Jäckel, W.H. (2005). Einrichtungsvergleiche in der medizinischen Rehabilitation. *Z Ärztl Fortbild Qualitätssich*, 98(8), 655-62.
- IBM Corporation (2013). IBM SPSS Statistics V22.0.
- lezzoni, L.I. (1995). Risk adjustment for medical effectiveness research: an overview of conceptual and methodological considerations. *J Investig Med*, 43(2), 136-50.
- lezzoni, L.I. (2004). Risk adjusting rehabilitation outcomes: an overview of methodologic issues. *Am J Phys Med Rehabil*, 83(4), 316-26.
- Kuhl, H.C., Krneta, D., Warnke, I., Herdt, J., Cassidy, C., von Allmen, U. & Rössler, W. (2008). Freiwilliges Benchmark der Psychiatrischen Unikliniken Basel, Bern und Zürich. Methodisches Vorgehen und Erfahrungsbericht. *Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie und Neurologie* (1), 37-40.
- Martin, V., Bernhardsgrütter, R., Goebel, R. & Steinert, Tilman (2007). The use of mechanical restraint and seclusion in patients with schizophrenia: A comparison of the practice in Germany and Switzerland. In: *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health* 3:1. Article available from: <http://www.cpementalhealth.com/content/3/1/1>.
- Wing, J. K., Beevor, A. S., Curtis, R. H., Park, S. B., Hadden, S., & Burns, A. (1998). Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Research and development. *The British Journal of Psychiatry*, 172(1), 11-18. doi:10.1192/bjp.172.1.11